



33722/B/2 BM(NH) 116

vol 1, part 1

plates in this vol belong to vol 3.







Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b30535876\\_0005](https://archive.org/details/b30535876_0005)







88666  
CAROLIA LINNÆ,

EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL., ACAD. PARIS,  
UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER. LOND. ANGL.

MONSPEL. TOLOS. FLORENT. EDINB. BERN. SOC.

SYSTEMA  
NATURÆ,

PER

REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES, GENERA,  
SPECIES

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,  
SYNONYMIS, LOCIS.

---

T O M U S I.

---

*Editio decima tertia,  
ad Editionem duodecimam reformatam Holmensem.*

---

VINDOBONAE,

TYPIS IOANNIS THOMAE NOB. DE TRATTNERN,  
CAES. REG. AULAE TYPOGR. ET BIBLIOPOLAE.

---

M D C C L X V I I.



# O JEHOVA,

*Quam ampla sunt Tua Opera!*

*Quam sapienter Ea fecisti!*

*Quam plena est Terra possessione Tua!*

DAVID *Psal. CIII. 24.*



SÆ. RÆ. MTIS. SUMMÆ FIDEI

V I R O

CELSISSIMO ILLUSTRISSIMOQUE

C O M M I T T I

D. CAR. G. TESSIN,

*Regis Regnique Sviogothici Senatori,*

*Regiæ Cancellariæ Præsidi, ad Aulam Regiarum Celsitudinum supremo Mareschallo, educationi Seren. Princ.*

*Gustavi Præsecto, Cancellario Academiæ Aboensis, Ordinis Sæ. Ræ. Maj. Seraph. Equiti Aurato & Com-*

*mendatori, Equiti Aurato de Aquila nigra, nec non omnium Sæ. Ræ. Maj. Svecicæ Ordinum Cancellario,*

*Sacrum.*

Cum quivis auctor speret se apud posteros gratiam  
habere & posse secum duratura nomina educere,  
AVCTORI meæ fortunæ Libellum ultimo nunc offero.

ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit;

ILLE mihi Stipendium ab Ordinibus regni expetiit;

ILLE mihi spartam Medici classici procuravit;

ILLE mihi munus, quo fungor, conciliavit;

ILLE mihi Titulum, quo distinguor, paravit;

ILLE me ad Serenissimos Reges introduxit;

ILLE me cuso Numismate posteritati commendavit;

ILLE meas errare boves, ut cernis, & ipsum  
ludere quæ vellem calamo permisit agresti;

quare

*cana prius gelido desint absinthia ponto,  
quam nostro illius labatur pectore vultus.*

T A N T I M A E C E N A T I S

Upsaliæ 1766  
d. 24 Maji.

Cultor devotissimus.  
C. a LINNE.

*Magnus est DEUS noster,  
& magna est potentia Ejus,  
& potentiae Ejus non est numerus.*





# RATIO EDITIONIS.

SYSTEMA NATURÆ iteratis vicibus prodiit :

1. Leydæ 1735. Folio imper. pag. 12. a me per J. F. GRONOVIVM.  
*Conspectus tantum operis & quasi Mappa Geogr.*
2. Holmiæ 1740. Octavo. pag. 80. a me ipso revisum.  
*Auctum Animalium nomenclaturis, characteribus.*
3. Halæ 1740. Quarto oblong. pag. 70. per J. J. LANGEN.  
*Latino-germanice; ceterum idem cum 1.*
4. Parisiis 1740. Octavo. pag. 108. t. 1. per B. JUSSIEVM.  
*Adjecta nomina Gallica; idem cum 2.*
5. Halæ 1747. Octavo. pag. 88. per M. G. AGNETHLER.  
*Nomina Germanica; ceterum idem cum 2.*
6. Holmiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. auctum a me ipso.  
*Characteres essent. Vegetabilium. Species Anim. & Lapid.*
7. Lipsiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. per Typographum.  
*Nomina Germanica; ceterum idem cum 6.*
8. Holmiæ 1753. Octav. p. 136. Vegetabilia per J. J. HAARTMAN.  
At regnum Lapideum Scaræ 8vo per H. MÖLLER.
9. Leydæ 1756. Octavo. pag. 226. per GRONOVIVM.  
*Paucissima de Avibus, Piscibus; idem cum 6.*
10. Holmiæ 1758. Octavo. longe auctius factum a me ipso.
11. Lipsiæ 1762. Octavo. furtim prodiit vitiosa.  
*Nihil additum.*
12. Holmensi hac propria ultima penultimaque editione.  
*Species Animalium omnium mihi cognitorum cum Differentiis,  
Synonymis, Locis, nominibus Trivialibus.  
Methodus Animalium ex novis observatis reformata.  
Piscium imprimis nova methodus cum Auctorum observatis  
radiis pinnarum.  
Plantarum reformati characteres, emendatæ differentiæ variæ.  
Lapidum plures species, observationes, & omnium Nomina  
Trivialia.  
Observationes in Regna Naturæ novæ, cum introductione in  
Naturam.*



COLLECTANEA, quæ obtinere potui, disposui; imprimis adjuvarunt

S. M. ADOLPHI FRIDERICI Regis Museum. T. 1. Holm. 1754. fol.  
Prodromus Tomi 2. Holmiæ 1764. Octavo.

*Utrumque Animalibus exoticis refertum.*

Smæ LOVISÆ ULRICÆ Reginae Museum. Holmiæ 1764. Octav.  
*In Conchiliis & insectis stupendum.*

C. G. TESSIN Museum. Holm. 1753. Fol.  
*In Lapidibus & Conchiliis magnificum.*

C. DE GEER Museum:  
*Amphibiis, Insectis aliisque rarioribus dives.*

UPSALIENSIS Museum Academiae:  
*Ex Animalibus undiquaque conquisitis.*

STOCKHOLMENSIS Museum Academiae Scientiarum:  
*Variis pulchris naturalibus scatens.*

ITINERA varia hujus causa institui.

Iter Lapponicum (1732) *ineditum.*

Iter Dalekarlicum (1734) *ineditum.*

Iter Oelandicum (1741) *Holmiæ 1745. Octav. svec.*

Iter Gotlandicum (1741) *Holm. cum præcedente Oct.*

Iter Westrogothicum (1746) *Holm. 1747. Octav. svec.*

Iter Scanicum (1749) *Holm. 1751. Oct. svec.*

Fauna Svecica. *Holmiæ (1746) duplo auctior illa 1761. Oct.*

Amœnitates academicæ. *Holmiæ 1749-1763. Oct. vol. 6.*

Discipulorum quondam meorum instituta Itinera, mihi, ab exterorum gazophylaciis remoto, proficua:

C. TERNSTROEM in *Asiam* (sed periit in Poulicandor) 1745.

P. KALMII in *Pennsylvaniam & Canadam.* 1747.

*Iter Americ. sept. Holm. 1753-1760. Oct. svec. vol. 3.*

L. MONTINI in *Lapponiam Lulensem.* 1749.

F. HASSELQUIST in *Ægyptum & Palæstinam.* 1749.

*Iter Palæstinum. Holm. 1757. Oct. svec.*

O. TORENII in *Malabariam & Suratte.* 1750.

P. OSBECKII in *Chinam & Javam.* 1750.

*Iter Ind. orient. Holm. 1757. Oct. svec.*

P. LOEFLINGII in *Hispaniam & Americam.* 1751.

*Iter Hispanicum. Holm. 1758. Oct. svec.*

P. J. BERGII in *Gotlandiam insulam.* 1752.

M. KÄHLERI in *Italiam & Apuliam.* 1752.

D. SOLANDRI in *Lapp. Pitensem & Tornensem.* 1753.

D. ROLANDRI in *Surinamum & Eustatium.* 1755.

A. R. MARTIN in *Spitzbergam.* 1758.

C. ALSTROEMER in *Europam australem.* 1760.

J. Falk in *Gotlandiam.* 1760.

**FINEM** Operis obtinuero , si inde

*Peregrinatores* dignoscant notiora antea naturalia.

Curiosi attentiores , *Musea* intrantes , visa intelligant.

Docti nova , nec trita , *actis* suis inserant.

Scientia facilius *augeatur* , sepositis vulgationibus.

*Nomina* magis stabiliantur , imprimis *Trivialia* & *Generica*.

*Oeconomiae* fundamenta sternantur.

*Theologiae* primæ lineæ ducantur.

His utere L. B. donec alii plura præstantioraque fiant.

Upsalæ 1766.

---

Docuisti me DEUS a juventute mea,  
& usque nunc pronunciabo Mirabilia Tua.

---



## INTROITUS.

**H**OMO mundi intraturus theatrum quæritur Quis sit: *Unde ortus?* e stemmate Creationis; *Quo tendat?* ad vitam beatam; *Quid hic?* intueri naturam; *Quo munere?* CURIOSUM esse similemque quidem reliquis animantibus (quæ vorant, ludunt, pruriunt, generant, multiplicantur, dormiunt, commoda stabula quærent, proximis sui generis inserviunt, vitam tuentur, sentiunt, percipiunt,) sed nobiliorem, utpote qui curiosius observat quæ sensibus patent, indeque sapientius ratiocinando rite concludit, adeoque miratur pulchrum sapientis opus Artificis. O quam contempta res est Homo, nisi supra humana se erexit! Quid enim erat cur in numero viventium se positum gauderet? an ut Cibos & Potiones percolaret? ut hoc corpus casurum periturumque sarciret? quæ tanta necessitas in fundum telluris intimæ hominem merfit, ut oblitus dierum, oblitus fortunæ melioris, ab hoc se averteret? puto certe multos ad sapientiam perventuros, nisi superbia magnæ fortunæ inflati, putassent se pervenisse. Sapiens utique est, qui fines respicit.

FINIS CREATIONIS TELLURIS EST GLORIA DEI,  
EX OPERE NATURÆ, PER HOMINEM SOLUM.

Tanto igitur magis nosse Naturam operæ pretium, quo nullum magis est! neque enim quidquam habet in se hujus materiæ tractatio pulchrius, dum multa lateant futura usui, quam quod hominem Magnificentiæ sui detinet, nec mercede, sed Miraculo colitur! Quota enim pars operis Tanti nostris oculis committitur, & quam multa, præter hæc quæ vidimus, in secretum eunt nunquam humanis oculis orientia; neque enim omnia DEUS humanis oculis nota fecit. Multa etenim sunt quæ esse audivimus, qualia autem sint ignoramus! quamque multa hoc primum cognovimus seculo! & quidem multa venientis ævi populus, ignota nobis, sciet! multa seculis tunc futuris, cum memoria nostri exoleverit, reservantur! veniet tem.



tempus, quo ista quæ nunc latent, in lucem dies extrahat & longioris ævi diligentia. Rerum enim Naturâ sacra sua non simul tradit; initiatos nos credimus, in vestibulo ejus hæremus; ejus arcana non promiscue, non omnibus patent! reducta & in interiori sacrario clausa sunt; involuta veritas in alto latet. Si in hoc juvenus sobria, sui Creatoris memor, incumberet (\*), si hoc Majores docerent & hoc Minores addiscerent, vix tamen ad fundum veniretur, in quo veritas posita est, quam nunc in summa Tellure, & levi manu quærimus. Magni omnino res est rerum Naturæ latebras dimovere, nec contentum exteriori ejus conspectu, introspicere & in divina secreta descendere! *Senec.*

Intravi itaque densas umbrosasque Naturæ Silvas, hinc inde horrentes acutissimis & hamatis spinis, evitavi quotquot licuit plurimas, at neminem tam esse circumspectum didici, cujus non diligentia sibi ipsi aliquando excidat, ideoque ringentium Satyrorum cachinnos, meisque humeris infilientium Cercopithecorum exultationes sustinui! incessi viam & quem dederat cursum fortuna peregi.

A 5

IMPE-

---

O J E H O V A !

Quam magnifica sunt Tua Opera!  
Vir insipiens non cognoscit ea,  
stultus non animadvertit ea.

*David.*

---

(\*) Confer. Worm. mus. præfat. I.

# IMPERIUM NATURÆ.

**DEUM** *sempiternum, immensum, omniscium, omnipotentem*, expergefactus a tergo transeuntem vidi & obstupui! legi aliquot *Ejus vestigia* per creata rerum, in quibus omnibus, etiam in minimis ut fere nullis, quæ *Vis!* quanta *Sapientia!* quam inextricabilis *Perfectio!* Observavi *Animalia* inniti vegetabilibus, *Vegetabilia* terrestribus, *Terrestria* telluri; *Tellurem* dein ordine inconcusso volvi circum solem, a quo vitam mutuatur; *Solem* demum circa axin gyrari cum reliquis *Astris*, systemaque *Siderum*, spatium & numero non definiendum, mediante motu in vacuo nihilo suspensum teneri ab incomprehensibili *Movente primo, ENTE ENTITUM* (a), *Caussa caussarum, Custode Rectoreque universi, mundani hujus operis Domino & Artifice. Vis illud FATUM* vocare, non errabis, est ex quo suspensa sunt omnia. *Vis illud NATURAM* vocare, non errabis, est ex quo nata sunt omnia. *Vis illud PROVIDENTIAM* vocare, recte dices, est cujus consilio mundus actus suos explicat (b); *Totus est SENSUS, totus VISUS, totus AUDITUS, totus ANIMÆ, totus ANIMI, totus SUI; Hujus EXTERA* indagare non capit humanæ conjectura mentis (c); *NUMEN* esse credi par est, æternum, immensum, neque genitum neque creatum (d). *Hoc sine quo nihil est, quod totum hoc fundavit & condidit, quodque oculos nostros & implet & effugit, cogitatione tantum visendum est; in sanctiore enim secessu Majestas tanta delituit, nec ulli dat aditum nisi animo* (e).

**MUNDUS** complectitur omnia sub Jove, quæ in notitiam nostram per sensus cadere possunt; sunt hæc *Astra, Elementa, Tellusque* inenarrabili velocitate circumacta; horum inoffensam velocitatem procedere videmus æternæ legis imperio, nec esse temere errantis hunc ordinem, neque quæ temere coiverunt tanta arte pendere, ut terrarum gravissimum pondus sedeat (quasi) immotum & circum se properantis cæli fugam spectet (f).

**ASTRA** sunt remotissima corpora lucida, quæ gyrantur motu perpetuo; sunt hæc aut *SIDERA*, propria luce radiantia, ut *Sol*, remotioresque *Stellæ fixæ*; aut *PLANETÆ*, a sideribus lucem mutant-

---

(a) *Aristoteli.* (b) *Senec. quæst. II. 45. hoc respectu, sed caute, ne effectus sumatur pro caussa.* (c) *Exod. XX. 4.* (d) *Plin. Nat. II. t. 7.* (e) *Senec. VII. 31.* (f) *Senec. I. 1.*



tuantes, quorum primarii Solares: *Saturnus, Jupiter, Mars, Tellus, Venus, Mercurius*; secundarii obsecundantes Planetis, ut *Luna Telluri*, aliique; *nec posse sine Custode tantum opus stare, nec hunc Siderum discursum fortuiti impetus esse, nam quæ casus incitat sæpe turbari & cito arietare debent* (g).

ELEMENTA sunt corpora simplicissima atmosphæram Planetarum constituentia, spatia inter Astra forte replentia:

|       |             |            |          |            |             |
|-------|-------------|------------|----------|------------|-------------|
| IGNIS | lucidus,    | resiliens, | calidus, | evolans,   | vivificans. |
| AER   | pellucidus, | elasticus, | siccus,  | obvolans,  | generans.   |
| AQUA  | diaphana,   | fluida,    | humida,  | transiens, | concupiens. |
| TERRA | opaca,      | fixa,      | frigida, | quiescens, | sterilis.   |

*Sic tota hujus Mundi concordia ex discordibus constat*, (h).

TELLUS est globus planetarius, horis 24 rotatus, circum Solem quotannis in orbem actus, *Elementorum* atmosphæra obvelatus, rerum *Naturalium* stupendo cortice tectus, cujus cognoscendæ superficiei studemus. Globus hic terraqueus est, cujus depressiorem partem Aquæ inundant & *Mare* lente coarctandum; elatiorem vero aquæ fugiunt sensim dilatandam in *Continentem* siccam habitabilem. Hæc Aquarum halitu, vi Aëris in *nubes* actæ, irroratur, ut summi montes perennique nive *Alpini Scaturigines* in *Fluvios* perennes concurrentes, eamque permeantes, potum terrestri cibo addant in alimentum incolarum, dum *Venti* motum excitant *Ignis* calore vivificatis corporibus. *Omnium Elementorum alterni recursus sunt; quidquid alteri perit in alterum transit; alternæ sunt vices rerum* (i).

NATURA lex immutabilis Dei, qua res est id quod est, & agit quod agere iussa est (*Helmont.*); Hæc opifex rerum, sui juris, docta a nullo edocta, saltus non facit; clam operatur; quod commodissimum in omnibus suis operationibus sequitur; nihil frustra nihilque supervacaneum agit; dat singulis singula & omnibus omnia; Consuetudinem solam ardet. *Omnia adjuvabunt Naturam, ut Naturæ opera peragantur* (k).

NATURALIA sunt corpora cuncta Creatoris manu composita, Tellurem constituentia, in REGNA NATURÆ tria divisa, quorum limites concurrunt in Zoophytis.

LAPIDES corpora congesta, nec viva, nec sentientia.

VEGETABILIA corp. organisata & viva, non sentientia.

ANTI-

(g) Senec. (h) Helmontii definitio, (i) Senec. III. 10. (k) Senec. III. 29.



**ANIMALIA** corp. organifata & viva, & ſentientia, ſponteque ſe moventia.

*Non ad unam Natura formam opus ſuum præſtat, ſed in ipſa varietate ſe jaçtat (1). Ideoque ex aliis alias reparat natura figuras, non uno contenta tenore valet, ſed immutatas gaudet habere vires.*

**REGNA** Naturæ, Planetam Telluris conſtituentia, ideoque tria ſunt.

**LAPIDEUM** rude inhabitat interiora; a Salibus in Terris generatur; temere miſcetur; caſu modificatur.

**VEGETABILE** virens ſuperficiem veſtit, Radiculis bibulis terrenas haurit; Foliis obvolitantibus ætherea reſpirat; calida metamorphoſi declaratur in ſeſtivalis Nuptias, generantes diſpergenda intra præſcriptas ſtationes Semina.

**ANIMALE** ſentiens exteriora ornat; voluntarie movetur; reſpirat;; ovagenerat; pellitur irata Fame, læta Venere, mœſtoque Dolo; prædando coerçet Vegetabilia Popularesque, ut omnium proportio perennet.

**HOMO** ſapiens, creatorum operum perfectiſſimum, ultimum & ſummum, in Telluris cortice, Majeſtatis Divinæ ſtupendis indi-  
ciis obteçto, conſtitutus, ſecundum ſenſus judicans artificio, admirans pulchritudinem, veneraturus Authorem. Retrogrediendo per generationes multiplicatas videt Creatorem; Progrediendo per conſervationem multiplicandam videt Naturam; ad utrumque invitant Pulchritudo, Mechanismus, Nexus, Fines, Commoda. Hic omnipotentia Divina nobilitat Terras in Vegetabilia; Vegetabilia in Animalia; hæc demum in Hominem, qui ſapientiæ radios refleçtet verſus majeſtatem radiantem duplicata luce. Sic totus Mundus gloria divina plenus eſt (m), dum omnia creata opera Deum glorificant per hominem (n), qui ex inertis humo, Dei manu vivificata, contemplatur auctoris ſui Majeſtatem ex fine creationis, dignus hoſpes conſtitutus, Summi Entis præco. Hæc contemplatio Naturæ evadit voluptatis cœleſtis veſtibulum, cujus particeps Animus in luce obambulat & tanquam in terreſtri cœlo vitam degit (o): Nec pietas adverſus DEUM, nec quanta huic gratia debeatur, ſine explicatione Naturæ intelligi poteſt; Homo enim ortus eſt ad contemplantum Deum, & Naturæ contemplatio eſt ad Dei admirationem proxima & apertiſſima via (p).

SAPI.

(1) Senec. VII. 27. (m) Eſa. VI. 4. (n) David CXVIII. (o) Aët. Holm. (p) Cicer. At mortuo Marco Aurelio milites creabantur imperatores, qui proprium nomen vix exarare noverant, doçtosque pro pigris habebant, literis reliçtis ſolis.



**SAPIENTIA**, divinæ particula auræ, summum est attributum Hominis Sapientis, hæc juste judicat de iis, quæ sensus sistunt; hi vero sistunt res mere naturales circumstantes; Primus tum Sapientiae gradus est res ipsas nosse. Notitia consistit in vera *Idea* objectorum, qua similia a dissimilibus distinguuntur *Notis* propriis, a Creatore rebus inscriptis; hanc notitiam ut cum aliis communice, *Nomina* propria, non confundenda, singulis diversis imponat; Nomina enim si pereunt, perit & rerum cognitio. Hæc literæ elementaque erunt, quibus destitutus nemo naturam legerit; quum ignorato *genere proprio*, nulla *descriptio*, quamvis accurate tradita, certum demonstret, sed plerumque fallat (q).

**METHODUS**, anima Scientiæ, indigitat, primo intuitu, quodcunque Corpus naturale, ut hoc corpus dicat proprium suum Nomen, & hoc nomen quæcunque de nominato corpore beneficio seculi innotuere, ut sic in summa confusione rerum apparenti; summus conspiciatur Naturæ ordo. Systema apte quinques tantum subdividitur: sic

|                    |                        |                     |                     |                    |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Classis,</i>    | <i>Ordo,</i>           | <i>Genus,</i>       | <i>Species,</i>     | <i>Varietas.</i>   |
| <i>Genus summ.</i> | <i>G. intermedium,</i> | <i>G. proximum,</i> | <i>Species,</i>     | <i>Individuum.</i> |
| <i>Provinciæ,</i>  | <i>Territoria,</i>     | <i>Paræciæ.</i>     | <i>Pagi,</i>        | <i>Domicilium.</i> |
| <i>Legiones,</i>   | <i>Cohortes,</i>       | <i>Manipuli,</i>    | <i>Contubernia,</i> | <i>Miles.</i>      |

*Nisi enim in ordines redigantur & veluti in castrorum acies distribuuntur, tumultu & fluctuatione omnia perturbari necesse est (r).*

**NOMINA** respondeant Methodo Systematicæ; sint itaque Nomina *Classium, Ordinum, Generum, Specierum, Varietatum.* Character *Classium, Ordinum, Generum, Specierum, Varietatumque.* Differentiæ; nam omnia nosse oportet qui rem scire velit, *confusis enim nominibus omnia confundi necesse est (r)* Primi itaque hominis actio, in aurea ista ætate, erat inspectio Creaturarum &, secundum Genera, impositio Nominum Specierum.

**SCIENTIA** Naturæ innititur Cognitioni Naturalium Methodicæ & Nomenclaturæ Systematicæ tanquam filo ariadneo, secundum quod Naturæ mæandros unice tutoque permeare liceat; in his *Classis & Ordo* est Sapientiæ, *Genus & Species* Naturæ opus; omnis vera cognitio est *Specialis*, solida autem *Generalis*.

Ordo

---

Monachis intra sua claustra; hi naturæ contemplationem nauci faciebant, dein ut imperscrutabilem adspernabantur, mox ejus cultores uti magos prosequerantur, a quo tempore verbum Dei naturale & revelatum contraria judicabantur, quo errore etiamnum multi excæcati sancta simplicitate titubant. *Suhm act. n. dr. 1763.*  
 (q) Cæsalpinus. (r) Cæsalpinus.



Ordo alius struentis est, alius est inhabitantis. Creator incepit a simplicissimis elementis Terreis, per Lapides, Vegetabilia, Animalia, in Hominem desit. Homo autem incipiat a se ipso, desinat in Terram. Auctor Systematis a particularibus ad universalia adscendat; Doctor vero contra a generalibus ad specialia descendat. Fontes enim concurrunt in rivos, hi in fluvios; adscendat autem nauta quousque poterit, nec tamen fontium ultimas origines attigerit. Data distincta rerum cognitione, ulterius penetrandum in specialissimas Proprietates, Phænomena, Mysteria, Dotes, Vires, Usus; Naturalis quum Scientiarum regnorum Fundamentum sit omnis Diætæ, Medicinæ, Oeconomiae tam privatae, quam ipsius naturæ. *Felices agricolæ bona si sua norint!*

Omnes res creatæ sunt divinæ sapientiæ & potentiae testes, divitiæ felicitatis humanæ; ex harum usu *bonitas* Creatoris; ex pulchritudine *Sapientia* Domini; ex oeconomia in *Conservatione*, *Proportione*, *Renovatione*, potentia *Majestatis* elucet. Earum itaque indagatio ab hominibus sibi relictis semper æstimata; a vere eruditis & sapientibus semper exculta; male doctis & barbaris semper inimica fuit.

RE-

---

Narrabo mirabilia Tua DOMINE,  
 & virtutem Terribilium Tuorum dicant  
 generationes.  
*David.*

---

## REGNUM ANIMALE.

**ANIMALIA**, organisatione viva, animato Medullari *sentiunt*, Nervis *percipiunt*, seque ex arbitrio movent motu possibili.

**VITA** animalis Machinæ hydraulicæ, perpetui mobilis, e Medulla a primordio continuata flagrat vestalis ignis flammula æthereo-electrica, spiraculis sustentanda, in qua incomprehensibilis arbitraria voluntas motrix residet.

**VIVENTIA** singula, in multiplicatione prodiga Natura, orditur a minimis, generat in fluido, incipit in ovi liquido, cum *omne vivum ex ovo*.

**OVUM** intra *Tunicas*, sæpe includentes *Albumen*, continet *Vitellum*, cujus lateri emergenti insertum *Punctum* saliens, *vegetans* in Embryonem, *caulescentem* Funiculo umbilicali, *radicatum* placenta vitellina.

**MATER** prolifera promit ante generationem vivum compendium *medullare* novi animalis sui que simillimi, carinam malpighianam dictum, tanquam plumulam vegetabilium; hoc ex genitura pollinifera *Cor* adfociat ramificandum in corpus; *Punctum* enim saliens Ovi incubantis Avis ostendit primum *Cor* micans Cerebrumque cum Medulla; corculum hoc, cessans a frigore, excitatur calido halitu, premitque *Bulla* aërea, sensim dilatata, liquores secundum canales fluxiles. *Punctum vitalitatis* itaque in viventibus est tantum a prima creatione continuata medullaris vitæ ramificatio, cum ovum sit gemma medullaris matris a primordio viva, licet non sua ante proprium *Cor* paternum; sic *Generatio Æquivoca nulla*.

**MACHINA** Animalis hydraulica, conformis Vegetabili, sed verticalis & Facultatum *officinis* concamerata, varie in diversis modificata:

**MEDULLARIS** intima, mollusca, e *Bulbo* baseos cerebroso elongata *Caule* simplicissimo, apice per se infinite progressivo, emittens ad totum *fila* nervea simplicissima, sibi homogenea.

**INTERANEA** crusta induranda, priorem vestiens, e *Tubere* craniū elongatum in *Caulem* vertebrarum, articulatam geniculis mobilibus, opposite artubus ramosum, cui insident *Folia* muscularia, determinate sparsa, apice proximo articulo etiam affixa, fibroso-carnosa, contractilia.



CORTICALIS extima, Radicata interiorius vasis lacteis, e *Bulbo* Cordis elongata in *Caulem* vasculosum duplicem paremque, similiter ramosum, infinite ramulosum, e cujus ultima dichotomia *Fructificatio* genitalium.

FACULTATUM cameræ intra machinam animale[m] sunt V.

△ ANIMALIS medullaris, electrico-motoria, suprema, officium *Dei* istius viventis, clam agentis, volentis sentientisque intraque bulbum organisatum ratiocinantis, se pandens, per fila electrica totum gubernat, regit.

△ VITALIS pulmonum, pneumatica, secunda, aëris electricum vitale haurit pro flammula animali.

▽ NATURALIS Vasorum, hydraulica, tertia, e cordis perpetuo mobili, reciproce recipit propellitque per totum succos addendos auferendosve, ne unquam deficient.

▽ ALIMENTARIS intestinorum, digestiva, quarta, præparat intra tubum intestinale[m] succos aptos pro vasis lacteis, deferendos ad vitalem corticem & ultra.

○ GENIALIS spermatica, combinatoria, infima, ex ultimo truncu[m] animalis naturalisque, coadunat. Medullarem cum Corticali ut inde distincta promanet machinula animalis.

ORGANA sensuum machinæ sunt physicæ, insertæ extremitatibus nervi, sensorio cerebri proximi, quibus divina arte percipitur Animal remota.

OCULUS: *Camera obscura*, imaginem proportionem, figuram, colore depingens.

AURIS: *Tympanum* membranæ corda tensæ super cochleam, motu ætheris tremens.

NASUS: *Membrana* latissima, humida, contortuplicata, aëris perreptantis volatilia figens.

LINGUA: *Spongiolæ* bibulæ, sparsæ, humido solutum attrahentes.

TACTUS: *Papillæ* mollusculæ, figuram impressam brevi affigentes.

His gaudent plurima Animalia, sed non omnia. Plura si Creatori addere placuisset, plura percepissent; uti Magnete præsentiam Ferri, Electro electricitatis phænomena. *Antennas* insectis solis concessit, nobis æque ignotas ac illis Aures.

Indicat *Oculus* ex luce, *Auris* ex æthere appropinquantia; percipit *Tactus* ex unione solida præsentia: examinat *Nasus* volatilia nervis, *Lingua* solubilia fibris, assumenda: s. Grata comestibilia salutaria, s. Ingrata vetita noxia.

COGITANS allicit ad *velle* gratum, aut *nolle* ingratum.

GAUDIUM puerile, sanguineum, rubrum, oleosum,  
spongiosum, tepidum, libere pulsans, anhelans,  
ridens, transpirans, promptum. *Vita.*

METUS juvenilis, phlegmatic. pallescens, aquosus,  
laxus, horrens, debile pulsans, dyspnoicus,  
suffocans, cacans, tremens. *Morbus.*

IRA virilis, cholericæ, lutea, spirituosæ,  
stricta, fervens, dure pulsans, althmatica,  
stertens, micturiens, agitans. *Medicina.*

MOEROR senilis, melancholic. ater, acidus,  
rigidus, frigidus, tarde pulsans, orthopnoicus,  
suspīrans, obitipans, quiescens. *Mors.*

Sic *Gaudium* bonis fruitur, *Metus* fuga eripit, *Ira* armis defendit, *Moeror* amissa luget.

POLITIA Naturæ manifestatur ex tribus Naturæ regnis simul: quemadmodum enim Imperantium causa Populi non sunt nati, sed subditorum ordini servando Imperantes constituti, ita Vegetabilium causa Animalia Phytiphaga, phytiphagorum Carnivora, & ex his Majora ob parva, Homo (qua animal) ob maxima & singula, sese vero præcipue, sæva mercede conductæ tyrannidem exercent, ut Proportio cum nitore Reipublicæ naturæ perennet. Vicissim singuli cives conspirant in Majestatem Hominis rationalis imperantis, cujus est summum Reipublicæ auctorem agnoscere. *Amoenit. acad. 6. p. 17.*

RESPUBLICA Naturæ, tanquam Aqua e Fontibus in Rivulos, Amnes, Fluvios ad Mare tranans, e numerosissima Plebe in pauciores Nobiles, paucissimosque Magnates ad Imperantem adscendit, dum Animalia minima, numero vi, potentiaque facile infinita, in usum cedant majoribus inertioribus præstantioribus, cum natura nunquam magis quam in minimis tota sit.

MINISTRI Politicæ, propriis muniis præfixi, tot sunt, quot animalium Species, singuli ad officia proprio commodo allekti, quum ex labore sustentationem suam reportent, ne quidquam deficiat, ubi nihil supervacaneum. Ne autem alter alterius negotiis sese immisceat, simulque lucrum alteri præripiat, sub pœna capitali sancita *Lex veneni*, ipsis sensibus, *Olfactus* imprimis & *Gustus*, inscripta, ne transgressores excusabiles evaderent.



OPERATIONES Naturæ incolarum præcipuæ sunt:

1. *Multiplicare Speciem*, ut negotiis sufficiant.

2. *Æquilibrium* inter Species Animalium & Vegetabilium servare, ut proportio perennet.

*Detondere* quotannis Vegetabilia, ut renovetur annum theatrum.

*Coercere* erronea, ne expellantur legitima.

*Auferre* languida, mortua, immunda, conspurcata, stagnantia, acida & putrida, ut nitor aulæ fulgeat.

3. *Vindicare* se ipsos ab interitu, ne vacet administratio.

OECONOMIA Naturæ versatur circa Rerum *Generationem*, *Conservationem*, *Destructionem*, ut opus Creatoris illibatum persistat, ad quod tota conspirat Natura.

*Generata* calido sanguine, pro educatione, aliorum cura opus habent; cumque Creator non remunerandus primi individuū curam gessit, depositum hoc transeat linea descendenti ad natos, qui id parenti non reddunt.

*Conservatio* quotidiano alimento, sed late disperso, adeoque impigre quærendo; sic Fames dispergit per orbem ea, quæ Venus convocat.

*Destructio* unius fit alterius reparatio, cum deficientibus cadaveribus laborioso venatu sustentabitur vita: Sic Rapina rerum omnium est, quam armis, munimentis, motu diversimodo, halituque eludant vivaciora, dum languida succumbant & vegetiora in motu festinent, ut opus naturæ perenni flore rideat.

IMPULSORES Naturæ etiam præfixi ad munia promte peragenda.

*Venus* blanda ad Multiplicationem convocat irritatque,

*Fames* avara ad Conservationem dispergit sollicitatque,

*Dolor* atrox ad Destructionem concitat repellitque,

neque hi sine Numine.

DIVISIO Naturalis Animalium ab interna structura indicatur :

|                                     |                      |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <i>COR</i> biloculare, biauratum;   | { viviparis          | <i>Mammalibus.</i> |
| <i>Sanguine</i> calido, rubro.      | { oviparis           | <i>Avibus.</i>     |
| <i>COR</i> uniloculare, uniauratum; | { pulmone arbitrario | <i>Amphibiis.</i>  |
| <i>Sanguine</i> frigido, rubro.     | { branchiis externis | <i>Piscibus.</i>   |
| <i>COR</i> uniloculare, inauratum;  | { antennatis         | <i>Insectis.</i>   |
| <i>Sanie</i> frigida, albida.       | { tentaculatis       | <i>Vermibus.</i>   |

## I. MAMMALIA.

*Cor* biloculare, biauratum, sanguine calido, rubro (\*).

*Pulmones* respirantes reciproce.

*Maxillæ* incumbentes, tectæ: *Dentibus* intrusis plerisque,

*Penis* intrans viviparas, lactiferas.

*Sensus*: Lingua, Nares, Oculi, Aures, Papillæ.

*Tegmenta*: Pili, pauci indicis, paucissimi aquaticis.

*Fulcra*: Pedes quatuor, exceptis mere aquaticis, in quibus pedes posteriores in caudæ pinnam compedes. Cauda plerisque.

## II. AVES.

*Cor* biloculare, biauratum; *Sanguine* calido, rubro.

*Pulmones* respirantes reciproce.

*Maxillæ* incumbentes, nudæ, exsertæ, edentulæ.

*Penis* subintrans absque scroto oviparas crusta calcarea.

*Sensus*: Lingua, Nares, Oculi, Aures absque auriculis.

*Tegmenta*: Pennæ incumbentes, imbricatæ.

*Fulcra*: Pedes bini. Alæ binæ. *Uropygium* cordatum.

## III. AMPHIBIA.

*Cor* uniloculare, uniauratum; *Sanguine* frigido, rubro.

*Pulmones* spirantes arbitrarie.

*Maxillæ* incumbentes.

*Penes* bini. Ova plerisque membranacea.

*Sensus*: Lingua, Nares, Oculi, Aures variis.

*Tegmenta* cutacea nuda.

*Fulcra* varia variis, quibusdam nulla.

(\*) In omnibus animalibus, quibus sanguis non calet, ventriculus cordis est unic. Hall. oBerh. I. p. 117. 191. miratus itaque quod 2. ventriculos cordis Crocodilo adscribat Hasselquist itiner. 293.



## IV. PISCES.

*Cor* uniloculare, inauritum; *Sanguine* frigido, rubro.

*Branchiæ* extus comprimendæ.

*Maxillæ* incumbentes.

*Penes* nulli. Ova absque albumine.

*Sensus*: Lingua, Nares? Oculi (non Aures).

*Tegmenta*: Squamæ imbricatæ.

*Fulcra*: Pinnæ Natatoriae.

## V. INSECTA.

*Cor* uniloculare, inauritum; *Sanie* frigida.

*Spiracula*: Pori laterales corporis.

*Maxillæ* laterales.

*Penes* intrantes.

*Sensus*: Lingua, Oculi, Antennæ in capite absque cerebro.  
(non Aures, Nares).

*Tegmenta*: cataphracta cute ossea sustentante.

*Fulcra*: Pedes, quibusdam Alæ.

## VI. VERMES.

*Cor* uniloculare, inauritum; *Sanie* frigida.

*Spiracula* obscura.

*Maxillæ* multifariæ, variæ variis.

*Penes* varii Hermaphroditis Androgynis.

*Sensus*: Tentacula (Caput nullum, vix Oculi, non Aures, Nares).

*Tegmenta* calcarea aut nulla, nisi Spinæ.

*Fulcra* nulli Pedes aut Pinnæ.

\* \* \* \* \*

VIVARIUM Naturæ sic alit VI-plicis formæ Animalia:

*Mammalia* pilosa, in *Terra*, gradiuntur, loquentia.

*Aves* plumosæ, in *Aëre*, volitant, cantantes.

*Amphibia* tunicata, in *Calore*, serpunt, fibilantia.

*Pisces* squamati, in *Aqua*, natant, poppyzantes.

*Insecta* cataphracta, in *Sicco*, exfiliunt, tinnitantia.

*Vermes* excoriati, in *Humido*, panduntur, obmutescentes

C L A S S I S  
M A M M A L I A.

*Balatu Pecorum & crebris Mugitibus amnes  
Arentesque sonant ripæ collesque supini.*

VIRGIL. ILL. 554.

**MAMMALIA** hæc & nulla alia mammata Animalia, ex structura, visceribus, organis homini proxima, pleraque *Quadrupedia*, nobiscum Continentem inhabitant, tanquam inter hostes atrocissimos, dum maxima pauca *Pinnata* intra Pelagum se subducunt.

**VESTITUS** Quadrupedium e *Pilis* flexilibus, mollissimis, distinctis, injuriæ minus obnoxiiis, iisque fertilioribus in frigidis quam æstuantibus terris. Hi vero *Pili* in *Aculeos* coaliti (Erinaceo, Hystricibus), aculei explanati in *Squamas* (Mani), squamæ coadunatæ in *Scutum* (Dasydis); at pilorum vellus sæpe distinctum, *Suturis* (Cani, Equo), quæ elongatæ in *Jubam* (Equo, Sui); Sed *Aquatica nuda* evasere, ne madefierent, nisi in terram exire aliquando necesse habeant. Præterea *Facies* sæpe *Verrucis* setiferis, *Labia Vibrissis*, *Mentum Barba* (Homini, Simiæ, Capræ) & *Pedes Pectusque Callis*, (Equo, Camelo,) non raro notata sunt.

**FULCRA**, motus instrumenta, pro expeditiori fuga in evitando hostem, aut assequendo prædam, **TERRESTRIBUS** sunt *Pedes IV.* quorum anteriores *Palmis* instruuntur, interdum tanquam *Manus* remoto pollice divisæ (Primatibus, Didelphibus); Posteriores autem *Plantis*, ut validius properarent, & hi vel *Palmati* digitis membrana connexis, ut natarent, vel *Fissi* digitis separatis, ut facilius currerent, aut *Talis* innixi, ut firmiter persisterent (Homini, Urso); Ne vero fuga detererentur inter aspera, vel denso vellere manicati (Lepori timido, Vulpi Lagopo, Bradypis), vel **UNGULATI** *ungulis* tanquam calceolo digitum vestientibus (Belluis, Pecoribus), quibus sæpe etiam *Talī succenturiatis* inclusi; at vero ferociora magis **UNGUICULATA** *unguibus* digito superimpositis aristata armatæque, ut prædam apprehenderent, adversarium lacerarent, terramve foderent; his ungues plerisque subulati, arcuati; paucis manuleatis ovals, complanati; at vero rapaciores *Feræ unguibus* armatæ subulatis; sed *Volantia* vel manibus elongatis palmatisque aëra scandunt (Vesper-tilio-



tiliones), vel membrana inter palmas plantasque expandenda velificant (Lemur, Sciurus, Mus). Aliter AQUATICA, unguibus unguisque destituta s. *mutica*, quorum brachia intra latus retracta, & femora postice coadunata plantis in Pinnam horizontalem (Cetis).

ARMA Mammalium præter dictos *Ungues*, nominandosque *Dentes*, imprimis *Cornua* cartilaginea capiti inserta sunt; hæc vel *solida* perennia (Rhinoceroti), vel *ramosa* annua, primumque pilosa apiceque crescentia (Cervis), vel *cava* vaginantia basi-que crescentia (Bobus, Capris, Ovibus), quibus adversarium occurrant, penetrant, verberant; sic eludunt hostem varie vel dimicando, mordendo, lacerando, calcitrando, feriendo, vel currendo, subsiliendo, scandendo, fodiendo, urinando, natando, volitando, vel foetendo, clamando, terrefaciendo.

CIBARIA instrumenta *Dentes* audiunt, qui triplices: *Primores* sæpe compressi Incisores pro evellendo, rodendo, conscindendo; *Laniarii* conici longiores absque antagonista occurrante pro lacerando; *Molares* latiores pro conterendo, & hi obtusi phytiphagis, acutiores carnivoris; at *edentula* solæ Myrmecophagæ & Manes evasere.

UMBRACULUM est *Cauda*, e vertebrais dorso multiplicatis postice elongata, qua turpissimæ absconduntur partes; hæc paucis *nulla* (Homini, Simiis & Muribus nonnullis), *abbreviata* nec femoribus longior (Lepori, Satyro, Talpæ, Erinaceo), *elongata* ad pedum longitudinem & ultra (Canibus, Muribus, &c.); harum singulæ vel *Nudæ* (Muribus), vel *Prehensiles* convolvendæ proque quinta manu inservientes (Simiis, Hystrici, Didelphibus), vel *Comosæ* longis setis (Equis, Bobus), vel *Floccosæ* apice penicilliformi (Leoni mari, Muri Jaculo), vel *Distichæ* utrinque pilosæ (Sciuris, Myrmecophagæ).

CUSTODES Animalium *Sensus* sunt pro conservatione individui: *Auriculæ*, exceptis aquaticis, pro Auditu præstantiore; rotundatæ, ovatæ, acutæ, acuminatæ, fissæ; erectæ, pendulæ.

*Oculi Pupilla* orbiculari diurnis, lineari expandenda vel perpendiculari vel transversali nocturnis. *Membrana nictitans* paucis. *Palpebræ* mobiles omnibus; utræque ciliatæ (Homini Simiisque), superiore tantum ciliata reliquis plerisque.

*Nasus* compressus, simus, resimus, aut bifidus, labiis brevior (Simiis, paulo longior (Feris plerisque), aut elongatus in *Proboscidem* (Elephantum); *Nares* ovatæ aut orbiculatæ.



*Lingua simplex* plerisque, *denticulato-ciliata* (Canibus), *supra aculeata* (Felibus), *filiformis* (Manibus, Myrmecophagis), *bifida* (Phocis). *Labium superius lacunosum* plerisque, *bifidum* (Gliribus).

**GENITALIUM** curiosior indagatio abominabilis displicet, quamvis varia & singularis Clitoride, Nymphis, Scroto, Pene, qui tamen posset ad ordines naturales viam monstrare.

**VENERE** *Vaga* pruriunt pleraque, ubi Mares dimicant inter se, quo valentiores polleant pro sobole vivaciore, ineuntes feminas viviparas foetum intra se excludentes, quem enixum lactant, defendunt, curant in proximas nuptias, adultioremve ætatem. *Polygama* autem nonnullis, ubi Mas gynæceum ex pluribus feminis sibi associatis defendit (Phocæ); paucissimis vero *Monogamia* est, dum Mas & Femina individui socii curam gerunt foetus (Simiæ nonnullæ, Lemur, Vespertiliones, Erinaceus).

**MAMMÆ** lactantes Feminis omnibus, etiam Maribus (excepto Equo) numero determinato pares. *Pectorales* (Primatibus, Cetis); *Abdominales* (Didelphibus, Phocis); *Inguinales* (Pecoribus, Belluis); *Abdominales Pectoralesque* simul (Gliribus pluribus); *longitudinaliter* digestæ (Suibus aliisque), at sæpius binæ pro singulo foetu ordinario.

**Usus:** coluntur varia imprimis Pecora ob *Carnes*, *Lac*, *Corium*, *Vellera*, *Pinguedinem*; ad *Onera* vero Equus, Camelus, Elephantas; instituuntur Feræ variæ pro *venatu*, *muribus*, *serpentibus*; Vivariis asservantur rariora.

**AUCTORES** præcedentis sæculi GESNERUS, ALDROVANDUS, *Jonstonus*, præsentis RAJUS, BRISSON, *Houttinus*; Scientia ex ovo ordianda secundum cujuscunque Mammalis Descriptionem, Diætam, Oeconomiam, ut ex historia fines Creatoris eruantur, vide exempla de Cane domestico, Cervo Taran-do, Mure Porcello, Sive Scrofa, Ove Ariete in *Amoen. Academ. proposita*.

ORDINES imprimis a dentibus desumuntur :

|           |              |   |          |                                      |           |    |
|-----------|--------------|---|----------|--------------------------------------|-----------|----|
| MAMMALIA. | Unguiculata. | { | Primores | <i>nulli utrinque</i>                | BRUTA.    | 2. |
|           |              |   | Primores | <i>incisores 2, Laniarii 0.</i>      | GLIRES.   | 4. |
|           | Dentes       | { | Primores | <i>incisores 4, Laniarii 1.</i>      | PRIMATES. | 1. |
|           |              |   | Primores | <i>conici (6, 2, 10) Laniarii 1.</i> | FERÆ.     | 3. |
|           | Ungulata.    | { | Primores | <i>Superiores &amp; inferiores</i>   | BELLUÆ    | 6. |
|           | Dentes       | { | Primores | <i>Superiores nulli</i>              | PECORA.   | 5. |
|           | Mutica.      |   | Dentes   | <i>varii in variis</i>               | CETE.     | 7. |

## I. PRIMATES.

Dentes primores incisores : superiores *IV paralleli*. Laniarii *solitarii*.

Mammæ *pectorales, binæ*.

Pedes *Manus sunt* ; Ungues *complanati, ovaes*.

Brachia *diducta claviculis, incessu tetrapodo valgo*.

Viçtus *incidendo fructus, scandendo lectos*.

## II. BRUTA.

Dentes primores *nulli superius aut inferius*.

Pedes *unguibus validis*.

Incessus *ineptior*.

Viçtus *comprimendo*.

## III. FERÆ.

Dentes primores *conici utrinque sæpius VI*. Laniarii *longiores*

Molares *cuspidato - conici (non truncati)*.

Pedes *unguiculati Unguibus subulatis*.

Viçtus *lacerando cadavera rapinasque animalium*.

## IV. GLIRES.

Dentes primores incisores *2, superius inferiusque*. Laniarii *nulli*.

Pedes *unguiculati, cursu salientes*.

Viçtus *rodendo cortices, radices, vegetabilia, &c.*

## V. PECORA.

Dentes primores *inferiores incisores plures ; superiores nulli*.

Pedes *ungulati, bisulci*.

Viçtus *evellendo plantas ruminandas*.

Ventriculi *4*. Rumen *macerans, ruminans* ; Reticulum *cancellatum, recipiens* ; Omasus *multiplicatus, consumens* ; Abomasus *fasciatus, acescens Coagulo pro sebo, ut minus alcaliscent*.

## VI. BEL-



## VI. BELLUÆ.

Dentes primores *obtusi*.

Pedes *ungulati*.

Incessus *gravis*.

Victus *extrahendo vegetabilia*.

## VII. CETE.

Pedum loco *Pinnae pectorales*, & *caudæ loco Pedes compedes in*  
*pinnam (plagiura) planam*. Ungues *nulli*.

Dentes *cartilaginei*. Nasus *frontis sæpe fistula*.

Victus *e Molluscis, Piscibus*.

Locus *pelagicus*.

*Hos a Piscibus divulsos jussi Mammalibus associari ob Cor bilocu-*  
*lare calidum, Pulmones respirantes, Palpebras mobiles, Aures ca-*  
*vas, Penem intrantem Feminam Mammis lactantem, idque ex le-*  
*ge naturæ jure meritoque.*

## CHARACTERES MAMMALIUM.

## I. PRIMATES.

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Homo.        | <i>Nosce te ipsum.</i>               |
| 2. Simia.       | <i>Dentes laniarii, hinc remoti.</i> |
| 3. Lemur.       | <i>Dentes primores inferiores 6.</i> |
| 4. Vespertilio. | <i>Manus palmato-volatiles.</i>      |

## II. BRUTA.

- |                  |  |
|------------------|--|
| 5. Elephas.      | <i>Dentes laniarii 3 molares; Nasus proboscide elongatus.</i>                        |
| 6. Trichechus.   | <i>Dentes laniarii superiores; molares ex osse rugoso. Pedes compedes.</i>           |
| 7. Bradypus.     | <i>Dentes molares primo longiore, absque laniariis primoribusve. Corpus pilosum.</i> |
| 8. Myrmecophaga. | <i>Dentes nulli. Corpus pilosum.</i>   |
| 9. Manis.        | <i>Dentes nulli. Corpus squamatum.</i>   |
| 10. Dasypus.     | <i>Molares absque laniariis primoribusve. Corpus cataphractum.</i>                   |

## III. FERÆ.

- |                |   |
|----------------|---|
| 11. Phoca.     | <i>Dentes primores superiores 6; inferiores 4.</i>                              |
| 12. Canis.     | <i>Dentes primores 6, 6: superiores intermedii lobati.</i>                      |
| 13. Felis.     | <i>Dentes primores 6, 6: inferiores æquales. Lingua aculeata.</i>               |
| 14. Viverra.   | <i>Dentes primores 6, 6: inferiores intermedii breviores.</i>                   |
| 15. Mustela.   | <i>Dentes primores 6, 6: inferiores conferti: duobus alternis interioribus.</i> |
| 16. Ursus.     | <i>Dentes primores 6, 6: superiores excavati. Penis osseus flexuoso.</i>        |
| 17. Didelphis. | <i>Dentes primores superiores 10; inferiores 8.</i>                             |
| 18. Talpa.     | <i>Dentes primores superiores 6; inferiores 8.</i>                              |
| 19. Sorex.     | <i>Dentes primores superiores 2; inferiores 4.</i>                              |
| 20. Erinaceus. | <i>Dentes primores superiores 2; inferiores 2.</i>                              |

## IV. GLIRES.

21. *Hystrix.* *Corpus Spinis tectum.*  
 22. *Lepus.* *Dentes primores superiores duplicati.*  
 23. *Castor.* *Dentes primores superiores angulo recto excavati.*  
 24. *Mus.* *Dentes primores superiores subulati.*  
 25. *Sciurus.* *Dentes primores superiores cuneati; inferiores compressi.*  
 26. *Noctilio.* *Dentes primores inferiores bilobi. Manus palmato-*  
*volatiles.*

## V. PECORA.

27. *Camelus.* *Ecornis. Dentes laniarii plures.*  
 28. *Moschus.* *Ecornis. Dentes laniarii solitarii: superiorib. exsertis.*  
 29. *Cervus.* *Cornua solida, ramosa, decidua. Dent. lan. o.*  
 30. *Capra.* *Cornua tubulosa erecta. Dent. lan. o.*  
 31. *Ovis.* *Cornua tubulosa reclinata. Dent. lan. o.*  
 32. *Bos.* *Cornua tubulosa porrecta. Dent. lan. o.*

## VI. BELLUÆ.

33. *Equus.* *Dentes primores superiores 6; inferiores 6.*  
 34. *Hippopotamus.* *Dentes primores superiores 6; inferiores 4.*  
 35. *Sus.* *Dentes primores superiores 4; inferiores 6.*  
 36. *Rhinoceros.* *Dentes primores superiores 2; inferiores 2.*

## VII. CETE.

37. *Monodon.* *Dentes in maxilla superiore 2 protensi.*  
 38. *Balæna.* *Dentes in maxilla superiore, cornei.*  
 39. *Phyfeter.* *Dentes in maxilla tantum inferiore.*  
 40. *Delphinus.* *Dentes in maxilla utraque.*



## I. PRIMATES.

Dentes Primores incisores : superiores  
IV, paralleli.

Mammæ Pectorales II.

## I. HOMO. Nosce te ipsum. (\*)

Sapiens,  
Ferus.

1. H. diurnus; varians cultura, loco.

Tetrapus, mutus, hirsutus.

Juvenis Ursinus Lithuanus. 1661.

Juvenis Lupinus Hessensis. 1544.

Juvenis Ovinus Hibernus. Tulp. obs. IV. 9.

Juvenis Bovinus Bambergensis. Camerar.

Juvenis Hannoveranus. 1724.

Pueri 2. Pyrenaici. 1719.

Puella Transsylvana. 1717.

Puella Campanica. 1731.

Johannes Leodicensis Boerhaav.

2. FU-

(\*) NOSSE SE IPSUM gradus est primus sapientiæ, dictumque Solonis, quondam scriptum litteris aureis supra Dianæ Templum. Mus. ADOLPH. FRID. Præf.

Physiologie: Te contextum Nervis, intertextum Fibris, Machina fragili, sed adolescente in perfectissimam, facultatibus instructam fere omnibus pluribusque, quam reliqua cuncta. Nudum in nuda humo, natali die, abjecit natura ad vagitus statim & ploratum, manibus pedibusque devinciendum, flens Animal ceteris imperaturum; cui scire nihil sine doctrina: non fari, non ingredi, non vesci, non aliud naturæ sponte. Plin. Vides itaque qualem vitam nobis rerum natura promisit, quæ primum nascentium omen fletum esse voluit. Seneca. Sed miseret atque etiam pudet æstimantem, quam sit frivola animalium superbissimi origo. Plin.

Tecum habita!

Diætetice: Te sanitate & tranquillitate, si noveris, felicem, Croeso, Salomone, Alexandroque majorem: Te Moderatis conservandum, Nimiis destruendum, Variatis afficiendum, Insuetis frangendum, Consuetis indurandum; Te polyphagum Culina instructissima, per errores gratissima, igne vinoque horrenda. Parvo fames constat, magno fastidium. Opinio immensum desiderat, Natura exiguum & parabile, ergo ad supervacanea sudatur. Senec. Pro ut vivis ita ibis.

Cura valetudinem!

Pathologie: Te tumidam usque dum crepueris bullam, piloque pendulam in puncto fugientis temporis. Nihil enim homine imbecillius terra alit. Homer. Nulli vita fragilior; nulli tot Morbi, tot Curæ, tot Pericula. Breve universum utique ævi tempus: Pars æqua morti similis exigitur; nec reputantur Infantia anni, qui sensu carent; nec Senectæ in pœnam vivaces; hebescunt Sensus, torpent Membra, præmoriuntur Visus, Auditus, Incessus, Dentes, Ciborum instrumenta. Plin. Sic magna pars mortis jam præteriit,

*Americanus.* α. rufus, cholericus, rectus.

*Pilis* nigris, rectis, crassis; *Naribus* patulis; *Facie* ephelitica; *Mento* subimberbi.

*Pertinax*, contentus, liber.

*Pingit* se lineis dædaleis rubris.

*Regitur* Consuetudine.

*Europæus.* β. albus, sanguineus, torosus.

*Pilis* flavescentibus prolixis. *Oculis* cæruleis.

*Levis*, argutus, inventor.

*Tegitur* Vestimentis arctis.

*Regitur* Ritibus.

*Asiaticus.* γ. luridus, melancholicus, rigidus.

*Pilis* nigricantibus. *Oculis* fuscis,

*Severus*, fastuosus, avarus.

*Tegitur* Indumentis laxis.

*Regitur* Opinionibus.

*Afer.* δ. niger, phlegmaticus, laxus.

*Pilis* atris, contortuplicatis. *Cute* holosericea, *Naso* fimo. *Labiis* tumidis. *Feminis* sinus pudoris; *Mammæ* lactantes prolixæ.

*Vasfer*, segnis, negligens.

*Ungit* se pingui.

*Regitur* Arbitrio.

*Monstro-* ε. solo (a) & arte (b, c,) variat:

*sus.* a. *Alpini* parvi, agiles, timidi.

*Patagonici* magni, segnes.

b. *Monorchides* ut minus fertiles: *Hottentotti*.

*Iuñcæ* puellæ abdomine attenuato: *Europææ*.

c. *Macrocephali* capite conico: *Chinenses*.

*Plagiocephali* capite antice compresso: *Canadenses*.

*Habitat* intra Tropicos *Palmis* *Lotophagus*.

*Hospitatur* extra Tropicos sub novercante *Cerere*, *carnivorus*.

DE-

---

quidquid ætatis retro est Mors tenet. Totum denique hunc, quem vides, populum, quousque cogitas esse; cito natura revocavit & condet; Mors omnes æque vocat; iratis Diis propitiisque moriendum. Senec. II. 59.  
Memento mori!

*Naturaliter*: Te audacis naturæ miraculum, Animalium principem, cujus causa cuncta genuit natura, esse Simium animal flens, ridens, melodum, loquens, docile, judicans, admirans, sapientissimum: sed fragile, nudum, suapte natura inerme, ad omnem fortunæ contumeliam projectum, alienæ opis



**DESCRIPTIO:** CORPUS erectum, nudum, Pilis raris remotissimis adpersum, subsexpedale.

**CAPUT** obovatum: *Pileus* longius pilosus: *Sincipite* obtuso, *Vertice* obtusissimo, *Occipite* gibbofo.

**Facies** nuda: *Frons* planiuscula, quadrata, *Temporibus* compressa, angulis sinu intra *Pileum* adscendens. *Supercilia* prominula pilis extrorsum in suturam imbricatis, interstincta *Glabella* planiuscula. *Palpebra superior* mobilis, *inferior* quiescens: utraque *Ciliis* exstantibus subrecurvatis pectinata. *Oculi* rotundi: *Pupilla* orbiculata absque membrana nictitante. *Genae* gibbae, molliusculae, coloratae. *Male* compressiusculae. *Buccae* laxiores. *Nasus* prominens, labio brevior, compressus, apice altior gibbosiorque: *Naribus* ovatis, intus hirtis, margine crassiusculo. *Labium superius* superpendiculare, *Lacuna* exaratum; *Labium inferius* erectiusculum, magis gibbum. *Mentum* prominens, obtusum, gibbosum. *Os* maribus setis barbatum, imprimis mentum setis fasciculatum. *Dentes* utrinque *Primores* incisores, erecti, paralleli, approximati. *Laniarii* solitarii, paulo longiores, utrinque reliquis approximati; *Molares* quini, obtusiusculi. *Aures* laterales: *Auriculae* rotundato-lunatae, appressiusculae, nudaе, supra margine fornicatae; infra gibbosae, molles.

TRUN-

indigens, anxiae mentis sollicitaeque tutelae, quaerulae vitae, precarii spiritus, pertinacis spei, tardae sapientiae. Temporis annihilati emortui contentorem, praesentis vividi dilapidatorem, futuri dubii aestimatorem in vita volucris, pretiosissima, irrevocabili; sic optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit; alium ad quotidianum opus laboriosa Egestas vocat; alium Luxus incarcerat, altilemque suffocat; alium Ambitio nunquam quiescit; alius Divitiis, quas optaverat, metuit, & voto laborat suo; alium Solitudo, alium semper vestibulum obsidens turba. Hic se habere dolet Liberos, hic se perdidisse; Lachrymae nobis deerunt antequam causae dolendi, quas detergant sola obliviae. Sed quousque nos malos nostrae mala rapuere: circumferre pericula, ruere in ignotos, iratos sine injuria, ferarum more occidere quem non oderimus, secundos optare ventos, quorum felicitas est ad bella perferre: parum videlicet ad mortes nostras terrae late patet. *Senec. cetera animantia congregari contra dissimilia, at Homini plurima ex homine mala! Plin.*

*Innocue vivito, Numen adest!*

**Politice:** Te recti loco tenere errorem publicum factum, qui te vix enixum consuetudinis larva induit, nutrit, educat, alit, regit, secundum quam honestus, fortis, sapiens, moratus, pius existimaris; cum gubernatus Opinione vivas ad Consuetudinem, nec ad Rationem. Te, inter perituros constitutum, cum nulli contigit impune nasci, beneficii loco petere ut

TRUNCUS constans Collo, Thorace, Dorso, Abdomine :

*Collum* teretiuseulum, capite brevius ; *Cervicis Nuchæ* concava ; *Gula* supra concava, medio subtus gibba.

*Thorax* antice posticeque depressiuseulus : *Pectus* planiuseulum, *Jugulo* excavato, *Axillis* concavis barbatis, *Scrobiculo* planiore. *Mammæ* duæ, pectorales, distantes, gibbæ, rotundatæ : *Papilla* cylindrica, obtusa, rugosa, areola cincta.

*Dorsum Tergo* planiuseculo, *Humeris* exstantibus, *Interseapulio* depresso.

*Abdomen* gibbum, laxum : *Umbilico* excavato, *Epigastrio* planiore, *Hypogastrio* gibbosiore, *Hypochondriis* rotundatis, *Inguinibus* planiuseculo-concavis. *Pubis* regio barbata. *Genitalia* exterta : *Pene* cylindrico, *Scroto* subrotundo, rugoso cute laxa, *sutura* longitudinali per *Perinæum* excurrente ; s. *Vulva* gibba, compressiusecula, *clitoride*, *nymphisque* instructa, *Cauda* exterta nulla.

AR-

---

ultimus cervicem præbeas, dum interim, dulci fortuna ebrius ; colligendo in crastinum Lapillos fortunæ certas, latratu in furorem ageris, aliter theoretice pios odio persequeris, quantosque tumultus excitas, non ut servias, sed cui ; nugis irrevocabile tempus consumis ; immortalia æternaque animo volutas, de seris nepotibus pronepotibusque disponis, novas spes oblitus conditionis Tuæ inchoas, immemor sepulchri arces struis, cum interea longa conantem mors opprimit, at in agone oculos aperiens (ἀνδραγαθος) somnium primo observas ; Sic vivimus ut immortales & morimur ut mortales ! Senec.

*Esto antiqua virtute & fide !*

*Moraliter* : Te combinatum Medullari animato volante Justum & Corporeo affectuoso volente Gratum, sub larva Ineptum, Laicivum, Sectatorem, Ambitiosum, Prodigum, Querulum, Astutum, Morosum, Invidum, Malitiosum, Avarum, transformari in Attentum, Castum, Consideratum, Modestum, Sobrium, Tranquillum, Sincerum, Mitem, Beneficum, Gratiolum, suis Contentum. Uni animantium Luctus, Luxuria, Ambitio, Avaritia, Vivendique cupido ; curat atque etiam post se de futuro. Plin.

*Benefac & lætare !*



**ARTUS** ex *Manibus* loco pedum anteriorum & *Pedibus* posterioribus :

*Manuum Armi* divaricati, crassiusculi, teretes. longitudine pedum. *Cubitus* obtuso-prominulus. *Ulna* crassitie armorum, teres, introrsum planior. *Palmae* rotundatae, dilatatae, planae, extus convexae; *Vola* concava; *Digiti* V: *Pollex* remotus, brevior, crassior. *Digitii* 2, 3, 4, 5. approximati, horum 5 minor reliquis, deinde 2, 4, sed 3 paulo longior, medium femoris attingens. *Ungues* omnibus rotundati, obovati, plano-convexi, lunula pallida.

*Pedum Femora* approximata, *Lumbis* musculosis, *Natibus* gibbis, carnosus, *Genubus* antrorsum versis, obtusissimis, poplitibus subtus concavis. *Crura* longitudine femorum, postice musculofo-ventricosa, inferne angustiora, antice macra. *Calcanei Talis* insistentes, prominuli, gibbi: *Malleolis* lateralibus, oppositis, hemisphaericis, duriusculis. *Plantae* oblongae, supra convexiusculae, subtus planae, transverse concavae. *Digitii* V: omnes incurvi, subtus gibbi, approximati. *Pollex* crassior, brevior; 2, 3 subaequales, 4, 5 decrescetes; ultimo minimo. *Ungues* ut in *Manibus* omnes.

*Differt* itaque a reliquis Corpore erecto nudo, at piloso Capite, Superciliis, Ciliisque, maturis Pube, Axillis. *Mammæ* 2 pectorales. Caput Cerebro omnium maximo; Uvula; Facies abdomini parallela, nuda: Naso prominente, compresso, brevior; Mento prominente. Cauda nulla. *Pedes* *Talis* insistentes. *Mares* mento barbato; *Feminæ* imberbi.

2. H.

*Theologice*: Te ultimum finem creationis;

In Telluris globum, Omnipotentis magisterium, introductum; ratione sapiente, secundum sensus concludente, mundi contemplatorem; ut ex opere agnosceres Creatorem omnipotentem, omniscium, immensum & sempiternum DEum, cujus sub imperio quod moraliter vivas, a justissima ejus Nemesis convincaris.

(Cetera revelata a Theologis explicanda.)

Duo namque sunt quæ in cognitionem Dei ducunt, Creatio & Scriptura.  
Augustinus.

DEUS itaque Natura cognoscendus, dein Doctrina recognoscendus.

Tertullian.

Homo solus DEum contemplatur, Naturæ & Revelationis eundem Auctorem, quem Te Deus esse

Jussit, & humana qua parte locatus es in re, disce, Pers. III. 71.

Memento Creatoris Tui!

Troglodytes. 2. H. nocturnus. \* *Amoen. acad. 6. p. 72. t. 76. f. 1.*  
*Homo Sylvestris Orang. Outang. Bont. jav. 84. t. 84.*  
*Kakurlacko. Kæp. itin. c. 86. Dalin. orat. 5.*

*Habitat in Æthiopiæ conterminis (Plin.), in Javæ, Amboinæ, Ternateæ speluncis, in monte Ophir Malaccæ.*

*Corpus album, incessu erectum, nostro dimidio minus. Pili albi, contortuplicati. Oculi orbiculati: iride pupillaque aurea. Palpebræ antice incumbentes cum Membrana nictitante. Visus lateralis, nocturnus. Manuum digiti in erecto attingentes genua. Aetas XXV annorum. Die cæcutit, latet; Noctu videt, exit, furatur. Loquitur sibilo; Cogitat, ratiocinatur, credit sui causa factam tellurem, se aliquando iterum fore imperantem, si unquam fides peregrinatoribus multis. Autoptæ in hac & proximis observent, num femine Clitoride & Nymphis instruantur, quibus Homo a Simiis differt.*

## C

## 2. SI-

(\*) *Genus Troglodytæ ab Homine distinctum, adhibita quamvis omni attentione, obtinere non potui, nisi assumerem notam lubricam, in aliis generibus non constantem. Nec Dentes laniarii, minime a reliquis remoti; nec Nymphæ Caffræ, quibus carent Simiæ, hunc ad Simias reducere admittebant. Inquirant autoptæ in vivo, qua ratione, modo notæ aliquæ existant, ab Hominis Genere separari queat, nam inter simias versantem oportet esse simiam. Apollodor.*

*Speciem Troglodytæ ab Homine sapiente distinctissimam, nec nostri generis illam nec sanguinis esse, statura quamvis simillimam, dubium non est; ne itaque varietatem credas, quam vel sola Membrana nictitans absolute negat, & manuum longitudo.*

*Afri Pilos contortuplicatos, quamvis albos, in hoc miratus sum, collatis imprimis Varietatum causis in Plantis, & Animalium generatione ambigena, nec tamen quidquam de Mauris nigris ex albis statui.*

*Præadamitas nec dixi hos filios tenebræ, quamvis nos ultimum finis Creationis opus.*

*LUCIFER: Homo caudatus, Amoen. acad. 6. p. 70. t. 76. f. 2. Maupert. Epist. 7. Kop. it. 7. Bont. jav. 85. an Gesh. quadr. 859. Aldr. digit. 24? incola orbis antarctici, nobis ignotus, ideoque utrum ad Hominis aut Simiæ genus pertineat, non determino. Mirum quod ignem excitet, carnesque asset, quamvis & crudas voret, testimonio Peregrinantium.*



2. SIMIA. *Dentes Primores* utrinque IV , approximati.

*Laniarii* solitarii , longiores , hinc remoti.

*Molares obtusi.*

\* *Cauda nulla* : *Simiæ veterum.*

Satyrus. 1. *S. ecaudata* ferruginea, lacertorum pilis reversis , natibus tectis. *Amoen. acad.* 6. p. 68. t. 76. f. 4.

*Homo Sylvestris.* *Edw. av.* 5. p. 6. t. 213.

β. *Satyrus indicus.* *Tulp. obs.* 3. c. 56. *Scotia. Lond.* 1738. *tabula.* *Chimp-anzee.*

*Habitat in Oriente. ex dono D:ni Edwards.*

*Corpus bipedale , erectum , undique vestitum , brunneum : pilis rarioribus , rufo-fuscis , longitudine vix: digiti. Pili in lacertis reversi versus cubitum. Nates testæ. Caput rotundum. Frons nuda. Oris margino hirtus. Cilia nigra : superiora longiora densiora. Superciliorum loco series transversa pilorum. Nares brevissimæ , subvillosæ. Palmæ intus glabræ , pollice palma brevior. Plantæ forma pedum , pollice brevissimo ; reliquis digitis longioribus.*

*An β Species distincta , quam vide Amoen. acad. 6. p. 69. t. 76. f. 3. certe β abdomine ventricoso glabro differt ; an sexu?*

Sylvanus. 2. *S. ecaudata*, natibus calvis., capite subrotundo.

*Simia. Gesn. quadr.* 847

*Simia unguibus omnibus planis & rotundis. Briss. quadr.* 188.

*Cercopithecus. Jonst. quadr. t. 59. f. 5.*

*Habitat in Africa. Zeylona. Minatur minis , cachinno blanditur , Caffrorum more salutat. Sorbilia manu haurit. Femina menstruat.*

*Frons ad superciliorum regionem transverse gibba. Pellis ursina. Scrotum tanquam intra vulvam reconditum ; vel penis intra Scroti foramen ; autumnio Testiculi intumescunt. Sedes Feminæ rapi instar extu-*

---

*Simia quam similis turpissima bestia nobis, Ennius : quod Simiæ Mammæ, Uvula, Uterus, Cilia, Musculi loquelæ, Ungues Hominis sunt ; an ullis Rete mirabile, Clitoris, Nymphæ ; Mirum adeo parum differre stultissimam Simiam a sapientissimo Homine, ut iste geodætes naturæ etiamnum quærendus, qui hos limitat.*

*extuberans. Lacertorum pili subtus reversi, uti ♂ verticis.*

Anatome. *E. N. C. d. 2. a. 7. obs. 40.*

Inuus.

3. *S. ecaudata, natibus calvis, capite oblongo.*

*Simia cynocephala. Briss. quadr. 191.*

*Simius cynocephalus alter. Alp. ægypt. 241. t. 16.*

*Habitat in Africa.*

*Simillima S. Sylvano ♂ Cynocephalo, sed rostro productiore, colore pallidior; non miscetur cum Sylvano. Ungues omnes rotundati.*

\* \* Cauda abbreviata : Papiones.

Nemestrina.

4. *S. semicaudata subbarbata grisea, iridibus brunneis, natibus calvis.*

*Simia brevicaudata. Edw. av. 5. p. 8. t. 214.*

*Habitat in Sumatra.*

Apedia.

5. *S. semicaudata, palmarum pollice approximato, unguibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis.*

*Simia cauda abrupta, unguibus compressis: pollice palmarum digitis adhærente. Amoen. acad. 1. p. 278.*

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo ♂ color Sciuri; subgrisea.*

*Pollex manuum anticarum non remotus. Ungues omnes oblongi, compressi, sed pollicum tam anteriorum, quam posteriorum humanis similes. Cauda brevissima, vix pollicis transversa. Os fuscum pilis patulis.*

Sphinx.

6. *S. semicaudata, ore vibrissato, unguibus acuminatis, natibus calvis.*

*Papio s. Baboon. Gesn. quadr. 252. t. 253. Aldr. dig. 260. Jonst. quadr. 145. t. 61. f. 1. Raj. quadr. 158. Briss. quadr. 192.*

*Habitat in Borneo, animal libidinosum, mulieribus facile vim inferens, robustum ♂ ferox.*

*Caput oblongum Canis, sed obtusius. Collum longum. Cauda brevis erecta. Nates sanguinolentæ.*

\* \* \* Cauda elongata : Cercopithecii.

Maimon. 7. *S. caudata subbarbata, genis cæruleis striatis, natibus calvis.*

*Cercopithecus cynocephalus antierius longis pilis, naso violaceo nudo. Briss. quadr. 214.*



Cynocephalus 2. *Jonst. quadr. t. 59. f. 4.*

Cynocephalus. *Gesn. quadr. 93. t. 93. Clus. exot. 370.*

*Habitat in Zeylona. Cl. Astroemer.*

Frons pilis erectis, fastigatis, canis. Rostrum productum, nudum. Nasus sanguineus. Bucca nuda, cærulea, oblique sulcata. Barba alba, brevis. Gula flavescens. Collum supra canum, subtus flavescens. Dorsum griseo-fuscum. Abdomen exalbidum. Lumbi pilo tenuiore perlucens, cute violacea. Nates tuberosæ, nudæ, sanguineæ. Sutura abdominis longitudinalis, nuda, sanguinea. Cauda abbreviata. Ungues acutiusculi: pollicum rotundati. *Georgii*

Hama- 8. *S. caudata cinerea, auribus comosis, unguibus acutius-*  
dryas. *sculis, natibus calvis.*

*Simia ægyptiaca cauda elongata, clunibus tuberosis nudis. Hasselq. it. 189. \**

*Simius cynocephalus ad utramque aurem magna coma Alp. ægypt. 284.*

*Habitat in Africa.*

*Corpus cinereum. Cauda longitudine vix corporis. Aures longa coma utrinque dependente galericuli in modum. Nates calvæ, sanguinolentæ. Vide Edwardi figuram eximiam.*

Veter. 9. *S. caudata barbata alba, barba nigra. Briss. quadr. 207.*

*Simia alba s. incanis pilis, barba nigra promissa. Raj. quadr. 89.*

*Habitat in Zeylona.*

Silenus. 10. *S. caudata barbata nigra, barba nigra proluxa. Simia Callitriches magnitudine cynocephalorum. Alp. ægypt. 242.*

*Cercopithecus barbatus niger, cæsarie proluxa faciem cingente. Briss. quadr. 209.*

*Habitat in Ægypto.*

*Species obscurior, ignotis Pedum unguibus aliisque plurimis attributis.*

Faunus. 11. *S. caudata barbata, cauda apice floccosa.*

*Cercopithecus barbatus 1. Clus. exot. 371. t. 371. Nie- remb. nat. 179. Raj. quadr. 159.*

*Cercopithecus barbatus* infra albus, barba incana mucronata, cauda in floccum. *Briss. quadr.* 209.

*Habitat* - - -

*Corpus nigricans*; *Pectus* ♂ *anteriora abdominis alba*.  
*Barba incana mucronata*. *Ungues humani*.

*Belzebul.* 12. *S. caudata barbata nigra*, cauda prehensili extremo pedibus brunneis.

*Cercopithecus niger*, pedibus fuscis. *Briss. quadr.* 194.

*Cercopithecus Meerkatz.* *Jonst. quadr. t.* 61. *f.* 3.

*Guariba.* *Marcgr. bras.* 226. *Raj. quadr.* 156.

*Habitat in Brasilia*; *Oriente occidenteque sole congregantur plures concionem celebrantes*.

*Corpus magnitudine Vulpis*, nigrum, pilis longis levissimis nitidum. *Barba rotunda, nigra*. *Pedes* ♂  
*Caudæ extremum fusca*.

*Seniculus.* 13. *S. caudata barbata rufa*, cauda prehensili.

*Cercopithecus barbatus saturate spadiceus.* *Briss. quadr.* 206.

*Habitat Carthagenæ in silvis ad fluvium.* *Transeuntes ex arboribus voce ingrata, rauca admodum, simul clamorosa eminusque audienda salutant; vix adspici se sinunt, quin illico clament. Visitant Musæ fructibus.* *D. Jacquin.*

*Corpus mediocre, colore conformi rubro.* *Os hominis instar in anteriore faciei parte mento propendente satis magno ut in homine.*

*iniscus.* 14. *S. caudata imberbis atra*, cauda prehensili, palmis tetradactylis.

*Simia fusca major, palmis tetradactylis, cauda prehensili ad apicem subtus nuda.* *Brown. jam.* 489.

*Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, cauda inferius versus apicem pilis destituta.* *Briss. quadr.* 211.

*Habitat in America meridionali.*

*Corpus atrum, magnitudine Molossi.* *Pedes* ♂ *Cauda dimidia exterior brunnea; Caudæ extremitas hinc nuda, qua, quidquid e terra elevet, prehendit. Digi- ti Pedum 4. 5. Z. Hallman; est vero Pollex reliquis minor, introrsum a ceteris remotus. Unguesque manuum rotundati; pedum oblongiusculi.* *D. Ay- men.* *Facies nuda, rubra. Auriculæ nudæ.*



Cyno-  
molgus.15. *S. caudata imberbis, naribus bifidis elatis, cauda am-  
cuata, natibus calvis.**Cercopithecus cynocephalus, naribus bifidis elatis;  
natibus calvis. Briss. quadr. 213.**Cercopithecus angolensis major. Marcgr. bras. 227.  
Raj. quadr. 155.**Habitat in Africa; vigilias noctu instituit in arboribus.*Cynoce-  
phalus.16. *S. caudata imberbis flavescens, ore producto, cauda  
recta, natibus calvis.**Cercopithecus cynocephalus ex viridescentibus & fi-  
vicantibus pilis. Briss. quadr. 213.**Cercopithecus. Jonst. quadr. t. 59. f. ultima.**Simius cynocephalus alter. Alp. ægypt. t. 16.**Habitat in Africa.**Simillima S. Inuo, sed caudata.*

Diana.

17. *S. caudata barbata, fronte barbaque fastigiata. Lii-  
Act. Stockh. 1754. p. 210. t. 6.**Cercopithecus barbatus guineensis. Marcgr. bras. 21  
t. 228. Raj. quadr. 159.**Cercopithecus barbatus 2. Clus. exot. 371.**Cercopithecus barbatus fuscus punctis albis insperme  
barba alba. Briss. quadr. 207. n. 23. 24.**Habitat in Guinea.**Junior ludibunda dejicit omnia, peregrinos nutrit  
salutat, irata maxillas hiant ore exagitat. Al-  
tior dentibus lanariis elongatis mordax &  
ligna evadit. Cubile purum servat; vocata respon-  
greck.**Magnitudo Felis majoris, nigra punctis albidis. I-  
sum postice ferrugineum. Femora subtus helvola,  
la pectusque alba. Frons pilis erectis, albis,  
stigmatibus linea transversa in formam lunæ crescentis  
Barba fastigiata, nigra, subtus alba longiorque  
fidens tuberi adiposo. Linea alba ab ano ad gen-  
ab exteriori latere femorum ducta. Cauda recta  
ga nigra, uti facies, aures, abdomen, pedes.*

Sabæa.

18. *S. caudata imberbis flavicans, facie atra, cauda  
nerea, natibus calvis.**Cercopithecus ex cinereo flavescens, genis longior-  
lis albis. Briss. quadr. 205.*

*Cercopithecus de jago.* Edw. av. 5. p. 10. t. 215.

*Habitat in Africa, Ægypto, Ins. S. verde.*

*Corpus statura Dianæ s. Aygulæ, magnitudine Catæ, supra cinereo-viridi-flavescent; subtus gula, pectore, abdomine, femoribus album. Facies nuda, atra. Tempora ex albido flavescentia pilis longioribus reversis. Supercilia nigra, setosa. Cauda recta, longitudine corporis, cana. Pedes cinerei. Ungues rotundati, sed in anticis ovati.*

Cephus. 19. *S. caudata, buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea.*

*Cercopithecus barbatus alius guineensis.* Marcgr. bras. 228. Raj. quadr. 156.

*Cercopithecus nigricans, genis & auriculis longis pilis ex albo flavicantibus, ore cærulescente.* Briss. quadr. 206.

β *Simia Æthiops caudata imberbis, capillitio arrecto lunulaque frontis albis.* Syst. nat. 10. p. 28. n. 14. Hasselq. it. 190. Mus. Ad. Fr. 2. p. 4.\*

*Habitat in Guinea.*

*Corpus statura Dianæ, fuscum, subtus cærulescentecandicans. Caput pilis arrectis albidis. Lunula superciliarum alba transversa. Palpebræ superiores albæ. Buccæ pilis patulis. Os cærulescens.*

trepida. 20. *S. caudata imberbis, capillitio arrecto, manibus pedibusque cæruleis, cauda prehensili villosa.*

*Simia cauda comata.* Edw. av. t. 312.

*Habitat in Surinamo.*

*Corpus fuscum; subtus ferrugineum. Pili capitis erecti nigri in capillitium hemisphæricum. Cauda pilosa. Ungues rotundati.*

Aygula. 21. *S. caudata subimberbis grisea, emirentia pilosa verticis reversa longitudinali.* Osb. iter 99.

*Simia nigra magnitudinis mediæ.* Edw. av. 221. t. 311.

*Habitat in India. Osbeck.*

*Corpus griseum lupi coloris, subtus gula, pectore, abdomineque albicans. Cauda corpore longior, cinerea, attenuata. Facies planiuscula, albida, nuda. Na-*



## MAMMALIA. PRIMATES. Simia.

*sus depressus*, *brevissimus*, *ab ore remotus*, *lacunæ labii superioris gemina*. *Bucca subbarbata*, *pilis sursum versis*. *Supercilia frontis gibba*, *setosa*, *prominentia*. *Pedes nigri semipalmati*. *Ungues pollicum rotundati*; *reliqui oblongi*. *Auriculæ acutiusculæ*. *Sutura arcuata ab aure versus oculos deorsum ad basin maxillæ inferioris*. *Sutura alia cubiti longitudinalis*.

*Varietas ? mea Capite rotundiore*; *facie minus nigra*, *Colore corporis minus ferrugineo*; *ligata saltat continuo*.

*Pithecia*, 22. *S. caudata imberbis*, *vellere nigro apice albo*, *cauda nigra villosissima*.

*Cercopithecus pilis nigris apice albo vestitus*, *cauda pilis longissimis*. *Briss. quadr. 195*.

*Habitat in Guiana*.

*Corpus parvum*, *nigrum*, *pilis omnibus apice albis*. *Facies pilis brevissimis*, *albidis*. *Gula* & *Abdomen pilis sordide albicantibus*. *Ungues longi*, *obtusi*.

*nictitans*, 23. *S. caudata imberbis nigra punctis pallidis adspersa*, *naso albo*, *pollice palmarum brevissimo*, *natibus tectis*.

*Habitat in Guinea*, *ludibunda*, *capite continuo nictitans apud Profess. Bot. Burmannum Amstelodami visa*.

*Magnitudo fere Sylvani*, *Os breve*. *Facies pilosa*. *Orbitæ nudæ*. *Irides luteæ*. *Pili corporis nigri annulis aliquot pallidis*. *Labia* & *mentum albida*. *Cauda recta*, *cylindrica*, *corpore longior*. *Pedes* & *cauda nigra*. *Pollex palmarum non longior primo articulo indicis*. *Cl. Alstræmer*.

*Jacchus*, 24. *S. caudata*, *auribus villosis patulis*, *cauda hirsutissima curvata*, *unguibus subulatis*: *pollicum rotundatis*.

*Cercopithecus brasiliensis* 3. *Sagovin. Clus. exot. 372. t. 372. Raj. quadr. 154. 160*.

*Gagui minor. Marcgr. bras. 227. Klein. dub. II. t. I. Afl. angl. 47. p. 146. Edw. av. 5. t. 218*.

*Cercopithecus moschatus*, tenijs fuscis, auriculis pilis albis. *Briss. quadr.* 202.

β *Cercopithecus ex albido flavescens moschum redolens.* *Briss. quadr.* 197.

*Cercopithecus Brasiliensis primus.* *Clus. exot.* 371.

Ca'taja. *Marcgr. bras.* 227. *Raj. av.* 155.

*Habitat in America, agilis, irrequieta, scandens more Sciuri, incurvata, non prehensili cauda; rodit ligna ut Mures, edit insecta, fructus, lactinia, panes triticeos martiosque, Theam, Passeres, indomita, morsitans, felibus infestissima, quibus se sub earum ventre affigit. Sonus stridor sibilans; odor Moschi.*

*Corpus Sciuro minus, griseo-cinerascent. Caput minimum, atrum. Labia & frons alba, sed inter oculos flavescens. Aures antice tegit Barba albo, longitudine totius auriculæ, ne flatus intret. Cauda corpore longior, villosa admodum, alba annulata, subcurvata, non tamen prehensilis. Dentes primores 4. intermedii latiores paralleli; laterales vero acuti, minus apice distantes.*

*Oedipus.* 25. *S. caudata imberbis, capillo dependente, cauda rubra, unguibus subulatis.*

*Cercopithecus minimus mexicanus, capillitio niveo.* *Edw. av.* 195. *t.* 195.

*Cercopithecus pilis canescentibus nigro mixtis, cauda rufa.* *Briss. quadr.* 19.

*Cagui major brasiliensibus.* *Marcgr. bras.* 227. *Raj. quadr.* 154.

*Habitat in America.*

*Corpus parvum, griseum, subtus album. Caput capillitio dependente longo albo, Facies nigra, ultra aures nuda. Cauda longa, nigra, a basi ad medium sanguinea.*

*Rosalia.* 26. *S. caudata imberbis, capite piloso, faciei circumferentia pedibusque rubris, unguibus subulatis.*

*Cercopithecus ex albido flavicans, faciei circumferentia saturate rufa.* *Briss. quadr.* 200.

*Habitat in Brasilia.*



Corpus ex albido flavicans. Pollices omnes unguibus rotundatis. Auriculæ nudæ, sub capitis pilis occultatæ. Briss.

Midas. 27. *S. caudata imberbis*, labio superiore fisso, auribus quadratis nudis, unguibus subulatis, pedibus croceis. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 4.*

*Cercopithecus niger*, pedibus croceis. *Gron. zooph. 200.*

*Cercopithecus niger minimus*, manibus & pedibus croceis. *Edw. av. 196. t. 196.*

Cay. *Raj. quadr. 155.*

*Habitat in America.*

*Manus* ♂ *Pedes crocei.* Corpus atrum. Cauda longissima. Aures nudæ, amplæ, retusæ. Ungues omnes subulati s. ferini, exceptis pollicum plantarum rotundatis s. humanis.

Fatuellus. 28. *S. caudata imberbis*, cauda prehensili, capitis fasciis pilorum duobus corniculorum æmulis. *Briss. quadr. 195. n. 3.*

*Habitat in - - -*

Corpus: *Facies, latera, abdomen, crura anteriora fusca. Vertex, medium dorfi, cauda, pedes, crura posteriora nigra.* Ungues longi obtusiusculi. Cauda spiralis.

Apella. 29. *S. caudata imberbis*, cauda subprehensili, corpore fusco, pedibus nigris, natibus tectis. *Mus. Ad. Fr. 1. t. 1.*

*Habitat in America.*

Undique circumspiciens, Sono pulli *Meleagris famelicæ*. *Faciei peripheria quasi a barbitonsore rasa.*

Capucina. 30. *S. caudata imberbis fusca*, cauda prehensili hirsuta pileo artubusque nigris, natibus tectis. *Mus. Ad. Fr. 2. t. 2.*

*Cercopithecus fuscus*, capitis vertice nigro. *Briss. quadr. 193.*

*Habitat in Surinamo.* *Tarsis incedit; non saltat, misera* ♂ *ejulans semper, clamore horrendo hostes pellit; stridet sæpius uti Cicada; irata latrat more Catuli.*

Cau-

---

Tecto comis arborum intertexto altissimisque columnis innixo obumbrantur terræ æstuant inter tropicos Indiæ, ne adurantur; hoc tectum inhabitant gentes Simiarum cum Psittacis volucribusque aliis.

*Caudam spiralem gerit , circumque collum sapius conjicit.*

Corpus fuscum , at Caput , pedes , Caudaque nigra. Pectus ferrugineum. Facies plerisque nigricans fronte magis incarnata. Ruga varicosa nigra retractilis supra frontem , ante pileum. Nasus versus oculos carinatus. Cauda longa , semper curvata , pilis longioribus villosa. Pedes situ transverso ponit , ut pollicis semper inter anticos collocentur. Variat facie nigra & incarnata. Dentes Laniarii non distant in hac specie a proximis.

Sciurea. 31. *S. caudata imberbis , occipite prominulo , unguibus quatuor plantarum subulatis , natibus tectis. Mus. Ad. Fr. 1. p. 3.*

*Simiolus ceylonicus. Seb. mus. 1. p. 77. t. 48. f. 3.*

*Cercophitecus pilis ex fusco flavicante & candicante variegatis , pedibus ex flavo rufescentibus. Briss. quadr. 197.*

*Habitat in India ; quiescit supra abdomen ; alloquentis inspicit fauces.*

Corpus Sciuri griseo-virens , subtus pallidum. Ulnæ & Tibiæ ferrugineæ. Cauda villosa , apice nigra , corpore duplo longior. Pollicum ungues rotundati. Os fusco-cærulescens. Supercilia setacea. Aures villis raris albidis.

Morta. 32. *S. caudata imberbis spadicea , ore fusco , cauda nuda squamosa. †*

*Cercophitecus americanus minor Monkie dictus. Seb. mus. 1. p. 52. t. 33. f. 1.*

*Cercopithecus caudatus imberbis , ore fusco , cauda nuda squamosa. Gron. zooph. 21.*

*Cercopithecus dorso spadiceo , ventre glabro , cauda murina. Briss. quadr. 201.*

*Habitat in America,*

*Hanc eandem cum Syrichta facit Gronovius ; forte ipsa foetus S. Sciuræ ?*

33. S.

---

Species Simiarum inter Mammalia plurimæ , sed paucissimæ rite descriptæ & cognitæ , plurimæ obscuræ ignorantur.

Simiæ suspectæ , memores , petulantes , imitatores , gesticulatores , indociles , minantur , rident , cibos bucca macerant , pediculos venantur , tactu excellunt , natos ulnis gerunt , menstruant , terrefactæ cacant immundæ , urinæ meatu sæpe distincto a vulva ; utero etiam gerentes libidinosæ ; phytiphagæ.



Syrichta. 33. *S. caudata imberbis*, ore ciliisque vibrissatis.†  
*Cercophitecus luzonicus minimus.* *Pet. gaz.* 21. t.  
 13. f. II.  
*Habitat in Luzonum insulis.*

3. LEMUR. *Dentes Primores superiores IV*: intermediis remotis.

*Inferiores VI*: longiores, porrecti, compressi, paralleli, approximati.

*Laniarii*. solitarii, approximati.

*Molares* plures sublobati: antici longiores acutiores.

tardigra- 1. *L. ecaudatus.* *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 3.

us. *Simia unguibus indicis pedum posteriorum longis incurvis.* *Briss. quadr.* 190. n. 3.

*Simia cynocephala unguibus indicis longis incurvis & acutis.* *Briss. quadr.* 191. n. 2.

*Animal cynocephalum tardigradum.* *Seb. mus.* 1. p. 55. t. 35. f. 1. 2. & t. 47. f. 1.

*Animal elegantissimum Robinsoni.* *Raj. quadr.* 161.

*Habitat in Zeylona, tardigradus, auditu excellens, monogamus.*

*Statura. Sciuri, subferruginea, linea dorsali subfusca; Gula albidior. Linea longitudinalis oculis interjecta alba. Facies tecta. Auriculæ urceolatae, intus bifoliatæ. Pedum palmæ plantæque nude. Ungues rotundati: indicum plantarum vero subulati. Cauda fere nulla Mammæ 2. in pectore; in abdomine versus pectus.*

Mongoz. 2. *L. caudatus griseus, cauda unicolore.*

*Mongooz. Edw. av.* 5. p. 12. t. 216.

*Habitat in Madagascar.*

*Corpus griseum, subtus album. Fascia ocularis fusca.*

*Ungues indices plantarum subulati, longiores.*

Macaco. 3. *L. caudatus niger, collari barbato.*

*Lemur cauda floccosa, corpore fusco.* *Gron. zooph.* 22.

Pro-

*Prosimia fusca*. Briss. quadr. 220.

*Simia-Sciurus lanuginosus fuscus* ex Johannæ insula.  
Pet. gaz t. 17. f. 5.

*Maucauco*. Edw. av. 5. t. 217.

*Habitat in Madagascar*. Cubile purum servat ; radiis solis delectatur ; dormit in loco tenebricoso ; respuit ova, carnes, pisces.

*Plantarum ungues indicis fere subulati.*

Catta.

4. *L. caudatus*, cauda albo nigroque annulata Mus.

Ad. Fr. 2. p. 5.

*Simia-Sciurus madagascariensis*, sive *Maucauco*. Edw.  
av. 197. t. 197.

*Prosimia cinerea*, cauda cincta annulis albis & nigris.  
Briss. quadr. 222.

*Habitat in Madagascar*, mitissima, scandit omnibus pedibus, ut *Simia*.

*Vicētitat* fructibus, oleribus, radicibus ; cibos tenet manibus ; tardiuscula, placida & tranquilla murmurat ut *Felis*.

*Oculus dexter diurnus pupilla lineari perpendiculari ; Sinister nocturnus pupilla orbiculata magna in meā erat ; an sic natura vel fato ? Ungues Indicis palmarum non longiores aut subulati.*

Volans.

*L. caudatus*, membrana ambiente volitans †.

*Cato-Simius volans camelli*. Pet. gaz. 14. t. 9. f. 8.

Aët. angl. 277. n. 1065.

*Vespertilio admirabilis*. Bont. jav. 68. t. 69.

*Felis volans ternatea*. Seb. mus. 1. p. 93. t. 58. f. 2. 3.

*Habitat in Asia ; vicētitans fructibus arborum.*

*Membrana more Sciuri volantis* s. *Muris volantis* a capite ad manus, a manibus per latera ad plantas, a plantis ad apicem caudæ expansa. Ungues acuti. Mammæ duæ pectorales. Edit fructus arborum. Ex mammis videtur *Lemuribus* s. *Simis* proximum Animalculum, sed nobis non visum. Hujus descriptio & Genericæ notæ etiamnum deficiunt.



4. VESPERTILIO. *Dentes* omnes erecti, acuminati, approximati: primores 4 æquales.

*Manus* palmatæ volitantes  
membrana corpus cingente.

Vampyrus

1. *V. ecaudatus*, naso simplici, membrana inter femora divisa.

*Canis volans ternatanus orientalis*. *Seb. mus.* 1. p. 91. t. 57. f. 1. 2.

*Vespertilio ingens*. *Clus. exot.* 94. *Edw. av.* 180. t. 180. f. 2. 4.

*Vespertilio volitans*. *Bont. jav.* 68. t. 69.

*Habitat in Asia*. Noctu haurit sanguinem dormientium *Servorum*, *cristas Gallorum* & *lacrymas Palmarum phlebotomus felicissimus in Pleuritide*.

*Dentes* Primores utrinque 4, erecti, obtusiusculi. *Laniarii Superiores solitarii*, antice ab inferiore dente sulcati. *Inferiores bini*, cum dente primore parvo obtuso inter utrosque. *Molares obtusiusculi*, plures. *Nares vix divisæ*. *Corpus magnitudine Sciuri*, latum, facie nigra. *Manuum* *Digitus primus sepositus*, *unguiculatus*; *secundus membranæ affixus*. *Plantæ fissæ*, *unguiculatæ*, *calcaneis postice exeuntibus* in subulatam cartilaginem membranæ annexam. *Cauda nulla*. *Membrana noctitans in cantho oculi majore*.

Specimen.

2. *V. ecaudatus*, naso infundibuliformi lanceolato.

*Canis volans maxima aurita*. *Seb. mus.* 1. p. 92. 85. f. 1.

*Habitat in America australi*. *Rolander*.

*Nares antice infundibulum referentes*, *superne ascendentes in folium lanceolatum*. *Aures ova æ*, *interiores lacinia subulata membranacea*, *longitudine Auriculæ*.

*Dentes Primores 4*. *Laniarii solitarii*, *magni*, *approximati reliquis*. *Molares anteriores breviores*, *obtusiores*. *Alarum digiti 4*, *quorum 1. annexus 2o*.

*Pollex brevis ungue arcuato*. *Pedes digitis 5 æqualibus*, *unguibus arcuatis*. *Calcaneus exserit tendinam subu-*

*Vespertilionum* genus nocturnum volitat *Palmis* *expansis palmatis membranisque laterali*, uti *Noctilio*, *Phalænis* *imprimis victitans*.

*subulatum secundum marginem membranæ inter pedes posticos, non coeuntem cum opposito. Cauda nulla.*

perspicillatus 3. *V. ecaudatus, naso foliato plano acuminato. Syst. nat. 7. Mus. Ad. Fr. 1. p. 7.*

*Vespertilio americanus vulgaris. Seb. mus. 1. p. 90. t. 55. f. 2. Edw. av. 201. t. 201. f. 1. Briss. quadr. 228.*

*Vespertilio rostro appendice auriculæ forma donato. Sloan. jam. 2. p. 330.*

*Habitat in America.*

*An hæc femina sequentis? Palmæ huic & sequenti digitis quinque.*

Spasma. 4. *V. ecaudatus, naso foliato obcordato.*

*Vespertilio major ternatanus. Briss. quadr. 226.*

*Glis volans ternatanus. Seb. mus. 1. p. 90. t. 56. f. 1. Habitat in Asia.*

auritus. 5. *V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite majoribus. Fn. svec. 3.*

*Vespertilio auribus majoribus Frisch. av. t. 103. Edw. av. t. 210. f. 3. Olear. mus. t. 15. f. 1.*

*Vespertilio auriculis inappendiculatis. Gron. zooph. 23.*

*Vespertilio minor. Briss. quadr. 226.*

*Habitat in Europa.*

*Distincta species auriculis, nisi solo sexu cum sequenti conveniat.*

murinus. 6. *V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus. Faun. svec. 2.*

*Vespertilio. Bell. av. 147. Gesn. av. 694. Aldr. ornith. 1. p. 571. Jonst. av. 53. t. 20. Alb. av. 3. p. 95. t. 101. Raj. quadr. 543. Edw. av. t. 201. f. 2.*

*Vespertilio major. Briss. quadr. 224.*

*Vespertilio auribus minoribus. Frisch. av. t. 102.*

*Habitat in Europa.*

*Noctu volat; victitat imprimis Phalænis; prædatur a Strigibus; capitur Arctii Lappæ calycibus candefactis; de terra non evolat; venenatus; Hybernatur mortuus, reviviscit superatis noctibus plumbeis initio Florescentiæ.*

*Anatome. E. N. C. d. 2. a. 1. obs. 48.*

II. BRU



## II. B R U T A.

*Dentes Primores nulli utrinque.*

5. ELEPHAS. *Dentes Primores nulli utrinque.*

*Laniarii superiores elongati.*

*Proboscis longissimus, prehensilis.*

*Corpus nudiusculum.*

maximus. I. ELEPHAS. *Raj. quadr. 131. Seb. mus. 1. t. 111. f.*

*1. Briss. quadr. 45.*

*Elephantus. Gesn. quadr. 377. Aldr. quadr. l. 1. c. 92.*

*Jonst. quadr. 30. t. 7. 8. 9. Edw. av. t. 221. f. 1.*

*Habitat in Zeylonæ, Africæ paludosis ad Amnes; edit*

*Ramos, Cocos, Guliandinae semina, Frumentum. Do-*

*cilis, prudens, Proboscidem longissimum, extensilem,*

*acute odorantem loco manus habet; eo cibum potum-*

*que haurit, hostemque pellit; eo præciso occiditur;*

*Murem metuit sub somno, ob trachææ insertionem.*

*Retro coit & mingit. Portat domos, rectore collo-*

*insidente; in bello armatur falcibus; vulnuscule inter-*

*axin & atlantem furiosus occiditur.*

*Maximum quadrupes. Corpus brunneum pilis raris. Pro-*

*boscis subius planus, apice truncatus cum acumine.*

*Oculi parvi. Dentes laniarii superiores sursum exser-*

*ti (Ebur) fibris crispis. Aures amplissimæ, pendulæ,*

*dentatæ; act. angl. 277. p. 1051. Cutis crassissima,*

*callosa. Mammæ 2. juxta pectus. Ungues supra*

*apices quinque loborum pedum. Genua flexilia. Col-*

*lum breve.*

*Petri G. C. Elephantographia, Lips. 1723. 4.*

*Anatome in Bibliotheca medica, Duplin. 1681.*

*Pedes vestiuntur corio calloso, quod integrum detrahi*

*potest instar ungulæ Equi, & inde sub Belluis non*

*inepte militaret; cum vero Pedes appareant tanquam*

*unguibus, 5 in anterioribus & 4 in postero-*

*ribus,*

---

*Paxwax, Ligamentum album, ad caput elevandum & collum sustinendum, commune est quadrupedibus; at deest Homini & Simiis, cum erecti plerumque sedeant & incedant, nec eo indigeant. Rajus.*

*ribus , superimpositis , aptius judicavi ei locum heic concedere , præprimis cum mammas in axillis brachiorum gerat.*

6. **TRICHECHUS.** *Dentes Primores nulli utrinque*  
*Laniarii superiores*  
*solitarii.*  
*Molares ex osse rugoso utrinque ; inferius duo*  
*Labia geminata.*  
*Pedes posteriores compedes*  
*coadunati in pinnam.*

Rosmarus. 1. *T. dentibus laniariis superioribus exsertis.* *Syst. nat.* 6. n. 8. *Houtt. natte.* 2. p. 7. t. 11. f. 1.  
 Odobenus. *Syst. nat.* 10. p. 38. *Briss. quadr.* 48.  
 Rosmarus. *Jonston. pisc.* t. 44. *Worm. mus.* 289.  
*Olear. mus.* 38. t. 23. f. 3. *Bonann. mus.* 269. f. 27.  
*Gesn aqu.* 211.  
 Equus marinus f. Hippopotamus falso dictus. *Raj. quadr.* 191. *Ellis huds.* t. 6. f. 3.  
 Mors f. Moris , Rosmarus. *Gesn. aqu.* 211.  
 Wall-ross. *Martens. spitsb.* 78. t. 1. f. B.  
*Habitat intra polum arcticum Europæ , Asiæ , Americæ.*  
*Grunnit ut Sus. Skeleton rejeetum in arenam Mammothacost. Magnitudo Tauri. Dentes Ebur fibris intertextis.*

Manatus. 2. *T. dentibus laniariis inclusis.* *Art. gen.* 79. *syn.* 107.  
 Manatus. *Rond. Pisc.* 490. *Gesn. Pisc.* 213. *Hern. mex.* 323. *Briss. quadr.* 49.  
 Manati. *Clus. exot.* 133. *Aldr. pisc.* 728.  
 Manati f. Vacca marina. *Raj. quadr.* 193.  
*Habitat in Mari Americano , Asiatico , ad ostia fluviorum. Mansvescit sæpe sylvestribus americanis , muscicaque delectatur , veterum Delphinus ; vorat indesinenter Fucos Ulvasque & vegetabilia reliqua. Sociati Mas femina adultus & proles. Monogami ,*



vere coeunt : femina , variis gyris primum fugiente , resupinata. Dorsum inter pascendum ex aquis eminet , avibus eorum pediculos venantibus.

Corpus canum , adpersum pilis raris remotis , 12 pedale , saepius 100. lib. Pedes. antici s. Pinnae pectorales fere Testudinum marinarum , palmati , in quorum medio genu cum ungue. Postici coadunati in caudam horizontalem. Auriculæ nullæ. Nares 2. distantes , regulares. Labium superius muricatum Vibrissis rigidis incurvis. Mammae 2 , pectorales. Vide Derham & Act. Petropol. 1749. v. 2. Affinis Cetis.

## 7. BRADYPUS. Dentes Primores nulli utrinque.

Laniarii obtusi , solitarii , molaribus longiores , occurrentes.

Molares utrinque V , obtusi.

Corpus pilis tectum

tridactylus 1. B. pedibus tridactylis , cauda brevi. Amoen. acad. 1. p. 487. \* Mus. Ad. Fr. 4.

Arctopithæcus. Gesn. quadr. 869. t. 870.

Ai s. Ignavus. Marcgr. bras. 221. Clus. exot. 110. t. 373

Seb. mus. 1. p. 53. t. 33. f. 2. Olear. mus. 7. t. 6. f. 2.

Raj. quadr. 245.

Sloth. Edw. av. t. 220.

Tardigradus. Briss. quadr. 34.

Habitat in Americæ meridionalis arboribus. Victitat foliis teneris , imprimis Cecropiæ ; non bibit ; imbres metuit. Facile scandit , tardissime & ægre incedit , vix uno die 50 passus ; attonitus quasi caput flectit ; sonus senarius adscendens ; clamor horrendus , lacrymæ miseræ.

Corpus pilosissimum , griseum ; Facies nuda ; Gula flava. Auriculæ nullæ. Cauda subovata. Dentes primores nulli , nisi laniarii , sed occurrentes , antice remotissimi , longiores , truncati. Molares laniariis approximati , breviores. Pedes anteriores longiores posterioribus , divaricatis : digiti combinati , in singulis pedibus tres.

Ungues

*Ungues compressi, validissimi, totidem. Mammæ 2, pectorales.*

didactylus. 2. B. manibus didactylis, cauda nulla. *Mus. Ad. Fr. 4.*

*Tardigradus ceilanicus. Seb. mus. 1. p. 54. t. 34. f. 1.*

*♂ t. 33. f. 4.*

*Habitat in Zeylona.*

*Corpus pilis ferrugineis undulatis. Caput rotundatum. Auriculæ magnæ. Ungues in palmis 2, in plantis 3. Mammæ 2 pectorales.*

### 8. MYRMECOPHAGA. Dentes nulli.

*Lingua teres, extensilis.*

*Os angustatum in rostrum.*

*Corpus pilis tectum.*

didactyla. I. M. palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villosa. *Syst. nat. 8. Mus. Ad. Fr. 1. p. 8. \**

*Myrmecophaga rostro brevi, pedibus anticis didactylis; posticis tetradactylis. Briss. quadr. 98. Gron. zooph. 1.*

*Tamandua f. Coati americana alba. Seb. mus. 1. p. 60. t. 37. f. 3. Edw. av. t. 220.*

*Habitat in America australi. Viſitat Formicis. Talis lente incedit.*

*Corpus flavescens, reliquis minus. Rostrum reliquis brevius.*

tridactyla. 2. M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villosa. *Syst. nat. 8.*

*Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tridactylis, posticis pentadactylis, auriculis longis flaccidis. Briss. quadr. 27.*

*Tamandua - guacu. Seb. mus. 1. p. 60. t. 37. f. 1. ♂ t. 40. f. 1. Bont. jav. 320.*

*Habitat in India orientali; viſitat Formicis, insectis, quorum nidos unguæ secatur. Lente currit; cauda lata instar muscarii se tegit; arbores etiam scandit.*

*Mammæ pectorales 2, abdominales 6. Plaga lateralis nigra. Dorsum longitudinaliter jubatum. Cauda compressa, subtus nigra, pilis longioribus; supra pilis longioribus apice albis.*



jubata. 3. *M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda jubata.*

*Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda longissima pilis vestita. Briss. quadr. 24.*

*Tamandua - guacu. Marcgr. bras. 225. t. 225. Pis. bras. 320. Jonst. quadr. t. 62. Raj. quadr. 241.*

*Habitat in Brasilia, Cap. b. spei; interdiu dormit, ut reliquæ, capite inter brachia.*

*Plaga pectoralis lateralis nigra. Cauda villosissima: pilis longis planis, nec teretibus.*

tetrada. 4. *M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda calva.*

*Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda fere nuda.*

*Briss. quadr. 26. Gron. zooph. 2.*

*Tamandua - i. Marcgr. bras. 226. Raj. quadr. 242.*

*Seb. mus. 2. t. 47. f. 2. Bont. jav. 321.*

*Habitat in America meridionali. Noctu exit; die dormit capite sub brachiis recondito; irata baculum prehendit, stertit posterioribus pedibus insidens.*

*Caudæ extremitas calva, qua se ex ramis arborum suspendere potest, quod non in præcedentibus. Plaga pectoralis lateralis nigra, ut in *M. jubata*.*

## 9. MANIS. Dentes nulli.

*Lingua teres, extensilis.*

*Os. angustatum in rostrum.*

*Corpus squamis tectum.*

pentada- 1. *M. pedibus pentadactylis. Afl. Stockh. 1749. p. 20.*  
ctyla. *t. 6. f. 3. Mus. Ad. Fr. 2. p. 7. \**

*Armadillus squamatus major ceylanicus. Seb. mus. p. 88. t. 54. f. 1 & t. 53. f. 5.*

*Lacertus squamosus. Bont. jav. 60. Olear. mus. 8. t. f. 1. Pet. gaz. 32. t. 20. f. 2.*

*Myrmecophagus squamatus f. Dæmon thebaicus. Her. mus. 295.*

*Philodotus pedibus 5-dactylis, squamis subrotundis. Briss. quadr. 29.*

*Habitat in India orientali. Viçtitat Formicis, Vermibus Lacertis; irata Squamas erigit horrende, territa in gremium se contrahit capite caudaque ventrem versus adducendo ut nil conspici queat nisi squamosus globus. Cauda hinc hinc spinis, epulis expetita.*

Corpus supra squamis basi striatis setisque interstinctis vestitum ut Strobilus ; subtus hirtum est. Sed Cauda utrinque squamosa, etiam subtus imbricata. Auriculæ nudæ rotundatæ. Ungues primores mediî majores, quibus contraetis incedit. Myrmecophagis adeo affinis, ut solo vestimento differat.

tetrada- 2. M. pedibus tetradactylis.

ctyla. Philodotus pedibus. 4dactylis, squamis mucronatis, cauda longissima. *Briss. quadr.* 31.

Lacertus squamosus peregrinus. *Clus. exot.* 374. *Besl. mus. t.* 11. *Act. paris.* 1703. p. 39. *Dod. act.* 3. p. 82. *Raj. quadr.* 274.

Lacerta indica yvanæ congener. *Aldr. ovip. dig.* 668. t. 667.

Habitat in America australi.

Præcedenti nimis affinis.

10. DASYPUS. Dentes molares plures, absque primoribus, absque laniariis  
Corpus cataphractum testa ossea-  
zonis intersecta.

unicinctus. 1. D. tegmine tripartito, pedibus pentadactylis. *Syst. nat.* 6. *Houtt. nat.* 2. p. 279. t. 16. f. 1.

Tatu f. Armadillo africanus. *Seb. mus.* 1. p. 47. t. 30. f. 3, 4.

Cataphractus scutis duobus, cingulis 12. *Briss. quadr.* 43.

β. Dasypus cingulo simplici. *Syst. nat.* 6.

Tatu mustelinus. *Raj. quadr.* 235. *Grew. mus.* 19. t. 1.

Cataphractus scuto unico, cingulis 18. *Briss. quadr.* 37.  
Habitat in Africa.

Lorica unica, quasi ex 16 cingulis composita, in 3 partes æquales divisa.

tricinctus. 2. D. cingulis tribus, pedibus pentadactylis. *Houtt. nat.* 2. p. 280. t. 16. f. 2.

Tatou f. Armadillo. *Red. exper.* 91. t. 92.

Tatu f. Armadillo orientalis. *Seb. mus.* 1. p. 62. t. 38. f. 2, 3.



Tatu apara. *Marcgr. bras. 232. Pis. bras. 100. Raj. quadr. 234.*

Armadillo f. Tatou genus alterum. *Clus. exot. 109.*

Armadillo. *Grew. mus. 17. Olear. mus. 8. t. 6. f. 4.*

*Habitat in India orientali ; vicitat Melonibus , Batatis , Gallinis.*

*Loricæ cingulum intermedium est angustissimum*

quadricin- 3. D. cingulis quatuor.

ctus. *Cheloniscus. Column. aquat. 2. p. 15. t. 16.*

*Habitat. . . .*

sexcin- 4. D. cingulis senis , pedibus pentadactylis. *Mus. Ad.*

ctus- *Fr. 7.*

Tatu f. Armadillo primus. *Raj. quadr. 233,*

Tatu. f. Tatu-peba *Marcgr. bras. 231.*

Armadillo f. Tatou *Clus. exot. 330.*

*Habitat in America Meridionali.*

*Loricæ cingula 8 numerat Briffon.*

septem- 5. D. cingulis septenis , palmis tetradactylis , plantis pen-  
cinctus. tadactylis. *Amæn. acad. 1. p. 281.*

Tatus quadrupes peregrina. *Gesn. quadr. 103.*

*Habitat in Indiis.*

*An sufficienter a sequente distinctus ?*

novem- 6. D. cingulis novem , palmis tetradactylis plantis pen-  
cinctus. tadactylis. *Mus. Ad. Fr. 6. Houtt. nat. 2. p. 284. t. 16. f. 3.*

Tatu f. Armadillus americanus. *Seb. mus. 1. p. 45. t. 29. f. 1. & t. 53. f. 6.*

Tatu ete Brasiliensibus. *Marcgr. bras. 231. Raj. quadr. 233.*

Cataphractus scutis duobus ; cingulis novem. *Briff. quadr. 42. Gron. zooph. 5.*

*Habitat in America Meridionali.*

### III. FE-

*Vicitant Dasypi Radicibus , Melonibus , Baccis , Carnibus , Piscibus , In-  
festis , Lumbricis.*

## III. FERÆ.

*Dentes Primores superiores sex , acutiusculi.  
Canini solitarii.*

II. PHOCA. *Dentes Primores superiores VI paralleli : exteriores majores. Inferiores IV , paralleli, distincti , æquales , obtusiusculi.*

*Laniarii. I: superiores ab incisforibus , inferiores a molaribus remoti.*

*Molares V. f. VI , tricuspidati.*

*Auriculæ nullæ*

*Pedes postici coaliti.*

ursina 1. P. capite auriculato.

*Ursus marinus. Aët. petropol. 2. ann. 1749.*

*Habitat in Camtschatcæ maritimis inter Asiam & Americam proximam , primario in insula Beringii.*

*Impetuosissime natant , mares poligami gregatim degunt cum uxoribus , filiis , filiabus ad 120 ; coeunt in litore resupinata femina ; vix metuunt Hominem ; mordent projectum lapidem ; senes elumbes quiescunt pingues ; proprium lapidem pro lecto habent , quem non deserunt , bella instituunt propter uxores , lectum , æquum & justum ; succumbente uno occurrit alter opem laturus , mox alteri alius , ne duo contra unum , usque dum omnes prelio involuti ; moesti lacrymas fundunt copiosissimas. Steller.*

leonina. 2. P. capite antice cristato.

*Leo marinus. Auson. itin. 100. t. 100. Ellis. huds. 1. 6. f. 4.*

D 4.

Ha-

*Phocæ genus natat sub aqua , vix incedit ob pedes anticos retractos , posticos unitos : victitat piscibus ; pingue.*



*Habitat ad polum Antarcticum. Tuberculo ad rostri basin piloso, quod inflat in vesicam, frontem tegit, dum eludat baculi ictus. Natant gregatim; pugnant pro feminis; excubias agunt.*

*Mas labio s. fronte cristata. Dentes 2 inferioris maxillæ subexserti. Oculi magni. Vibrissæ albæ, rubro annulatæ. Digiti omnes palmati digitis 5 - 5, unguibus pone apicem enatis; Postici compedes, interjecta cauda duos pollices longa, in pinnam horizontalem, digito extimo crassiore.*

*vitulina. 3. P. capite lævi inauriculato. Fn. svec. 11.*

*Phoca s. Vitulus marinus. Gesn. aqu. 702. Aldr. pisc. 722. Jonst. pisc. 44. Dodart. act. 191. t. 191. Raj. quadr 189.*

*Habitat in mari Europæo. Dormiunt in lapide ex aqua eminente; pariunt in glacie, per quam adscendunt halitu, non descendunt. Mammas retrahunt duas abdominis; inter Halecum catervas saginantur; a Laris provocatæ exspuunt pisces; ictu supra nasum facillime occiduntur.*

*Vibrissæ undulatæ. Oculi membrana nictitante instructi, humore crystallino globoso. Lingua bifida. Foramen ovale fertur apertum esse.*

*Anatome. E. N. C. d. 1. a. 9. obs. 98. G. d. 3. a. 7. app. 15.*

**12. CANIS.** *Dentes Primores superiores VI: laterales longiores distantes: intermedii lobati.*

*Inferiores VI: laterales lobati.*

*Laniarii solitarii, incurvati.*

*Molares. VI. s. VII. (pluresve quam in reliquis).*

*familiaris. 1. C. cauda (sinistrorsum) recurvata. Faun. svec. 5. Amoen. acad. 4. p. 43. t. 1. f. 1.*

*Canis. Gesn. quadr. 91. Aldr. digit. 482. Jonst. quadr. 122. Raj. quadr. 176.*

« auri-

- domesticus*. α. auriculis erectis, cauda subtus lanata.  
*sagax*. β. auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas.  
*grajus*. γ. magnitudine Lupi, trunco curvato, rostro attenuato.  
*Canis scoticus venaticus*. Gesn. quadr. 249. Aldr. 545.  
*Molossus*. δ. magnitudine Lupi, labiis ad latera pendulis, corpore toroso *Canis sagax sanguinarius*. Gesn. quadr. 251.  
*aquaticus*. ε. pilo crispo longo, instar ovis.  
*meliteus*. ζ. magnitudine Sciuri.  
*fricator*. η. naso resimo, auribus pendulis, Corpore quadrato.  
*vertagus*. θ. pedibus curvatis, trunco longo sæpius variegato.  
*avicular*. ι. caudā truncata. *Canis pantherinus* Aldr. digit. 555.  
*extrarius*. κ. auriculis longis lanatis pendulis. Aldr. digit. 561.  
*egyptius*. λ. nudus absque pilis.

*Habitat sæpius cum Homine passim, etiam spontaneus evasit.*

*Edit carnes, cadavera, vegetabilia, farinosa, non olera.*

*Digerit ossa; Vomitu a gramine purgatur; cacat supra lapidem: Album græcum, septicum summum. Potat lambendo: mingit ad latus, cum hospite sæpe centies; odorat anum alterius; odoratu excellit naso humido; oblique currit; incedit supra digitos; vix sudat; calidus linguam exserit; cubitum iturus circumit locum; dormit auditu acutiore, somniat. Procis rixantibus crudelis; menstruens catullit cum variis; mordet illa illos; cohæret copula junctus; gravida 63 diebus; parit sæpe 4 ad 8, masculis patri similibus, femineis matri. Fidissimus omnium; Hominibus cohabitatur; blanditur ad Domini accessum; ejus inflictum non fert; præcurrit in itinere, in bivio respicit; docilis, amissa inquit, vigilias noctu instituit, advenas indicat, ad merces vigilat, Pecora ab agris arcet, Tarandos coercet, Boves Ovesque a feris custodit, Leones detinet, Feras agitat, anatibus adstat, repit affiliens ad rete, occisa a venatore adportat, e rapina desistens; veru trahit in Gallia, rhedam in Sibiria. Mendicat ad mensam; furatus timet cauda incurvata; invidus edit; inter suos dominus domi; mendicorum hostis; ignotos sine injuria laceffit. Lambendo vulnera, Podagram, Carcinomata curat: ululat ad musicam; mordet projectum lapidem; instante tempestate foetet agrotans; Tania laborat; Rabiem disseminat;*

D 5

demum

---

*Canis genus vorax, morsu lacerans, arbores non scandit; Penis nodosus est*



demum cæcutit & se ipsum rodit ; ab oleo empyreumatico caudæ clauditur ; americanus latrare obliviscitur , sæpe gonorrhœa infectus ; a Mahometanis expellitur. Anatomicorum victima in sanguinis circulatione, transfusione, vasis lacteis, nervo resecto &c.

Caput vertice carinatum. Labium inferius lateribus dentatis nudis occultatum. Mystaces ordinibus 5 s. 6. Nares extrorsum recurvato sinu lunares. Auriculæ margine baseos superiore reflexo ; posteriore duplicato ; antico trilobo. Verrucæ faciei pilosæ 7. Suturæ velleris 8 : collares, sterneæ, cubitales, abdominales, oculares, lumbares, auriculares, anales. Mammarum 10 : harum quatuor in pectore. Pedes subpalmati.

**Lupus. 2.** C. cauda incurvata. Faun. svec. 6.

Lupus Gesn. quadr. 634. Aldr. dig. 144. Jonst. quadr. 89. Raj. quadr. 173.

Habitat in Europæ sylvis, etiam frigidioribus. Catervatim incedit, Pecora, Equos, Sues, Canes occidit ; in sylvis suspiciosissimus vix audet ; tractum funiculum metuit, portam non subit, sed sepimentum supersilit ; sonitum tubæ stentoriæ non fert ; summa fame & frigore laceffit in propriam speciem & Hominem sævit ; inedia diu tolerat ; unguibus retractis incedit ; collum facile flectit ; noctu ululat ; Lichene vulpino occiditur. Fn. svec. 1129.

Stræm sondm. 391.

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 2. obs. 71. & cent. 10. app. 450.

**Hyæna. 3.** C. cauda recta annulata, pilis cervicis erectis, auriculis nudis, palmis tetradactylis.

Lupus marinus. Bellon. aquat. 33. t. 34. Jonst. quadr. t. 57. Gesn. quadr. 674.

Taxus porcinus s. Hyæna veterum. Kæmph. amæn. 411. t. 407. f. 4.

Hyæna. Briss. quadr. 233.

Habitat in India, Africa. Excavat terram degitque in antris ; diutius sine cibo vivit ; in humana cadavera sævit, quæ e tumulis effodit, cæmeteriis infesta ; quidquid irritatus ore prehendit mordicus tenet, nec vivus dimittit pertinacissimus, inde venatoribus facilius cedit.

Magni-

Magnitudo Suis, facies Apri. Pili dorſi ſubſpithamei, erecti, apicibus nigris. Oculi roſtro propinguioreſ. Auriculæ nude. Cauda annulis nigris verticillata; crura annulis nigris variegata. Striæ corporis fuſcæ & nigrae, tranſverſales, a dorſo ad ventrem ductæ.

Vulpes. 4. C. Cauda recta: apice albo. *Fn. ſvec. 7.*  
 Vulpes. *Gefn. quadr. 966. Aldr. dig. 195. Jonſt. quadr. 82. Raj. quadr. 177.*

*Habitat in Europa, Aſia, Africa, antra fodiens, animal aſtutiſſimum; ſævit in Agnos; Anſereſ, Gallinaſ, Aviculaſ, non Accipitreſ foetidioresque; edit ſtercora animalium; pingueſcit uviſ; non rapit facile in prædio, quod inhabitat; pruriens noctu clamat; bombardæ exploſas odoremque pulveriſ pyrii fugit; pellitur fumo.*

*Corpus fulvum. Auriculæ erectæ. Labia alba, Pedes antici nigri. Ambroſiaco fragrat odore ſupra caudæ baſin.*

Alopex. 5. C. cauda recta; apice nigro.  
 Vulpes campeſtriſ vulgo.  
*Habitat in Europa, Aſia.*  
*Similiſ præcedenti excepto caudæ apice.*

Lagopus. 6. C. cauda recta: apice concolore. *Fn. ſvec. 8.*

α. Vulpes alba. *Kalm. bahuſ. 236.*  
*Iſatiſ. Aſt. petrop. 1760. v. 5. p. 358.*

β. Vulpes cæruleſcens. *Faun. ſvec. 14.*  
*Habitat in alpibuſ Lapponiciſ, Sibiria.*  
*Pedes denſiſſime piloſi, ut in Lepore.*

aureus. 7. C. *Lupus aureuſ dictuſ. †.*

*Lupuſ aureuſ. Kæmpf. amoen. 413. t. 407. f. 3. Raj. quadr. 174.*

*Vulpeſ indiæ orientaliſ. Valent. muſ. 452. t. 452.*  
*Adill. Bell. itin. 160.*

*Habitat in oriente.*

*Nocturnuſ catervatim incedit, furto dedituſ; uno clamante clamant remoti alii, ambulante ſono nocturno; ululatuſ execrabilis, quaſi ejulatuſ latratu inter-*



terceptus ; latratu exagitat feras , hoc audientes reliquæ in exercitum concurrunt , prosequuntur miserum Cervum , dum Leo Tigrisve ex insidiis fugientem prosternit prædamque vorat , circumfidente venatorum corona usque dum Rex satiatu discesserit. Moschum olet. Descriptio genuina etiamnum deficit.

mexicana- 8. C. cauda deflexa lævi corpore cinereo fasciis fuscis  
nus. maculisque fulvis variegato.

Canis cinereus maculis fulvis variegatus. Briss. quadr. 237.

Felis montana americana. Seb. mus. 1. t. 42. f. 2.

Xoloitzcuintli. Hern. mex. 479.

Habitat in Mexico.

Corpus. cinereum fasciis fuscis. Maculæ fulvæ in fronte , collo , pectore , ventre , cauda.

Thous. 9. C. cauda deflexa lævi, corpore subgriseo subtus albo.  
Habitat in Surinamo.

Corpus griseum , subtus totum album , magnitudine majoris Cati. Aures concolores , erectæ. Verruca supra oculos , in buccis , sub gula. Lingva lateribus ciliata. Pedes 5-4.

### 13. FELIS. Dentes Primores æquales. Molares terni.

Lingua retrorsum aculeata.

Ungues retractiles.

Leo. 1. F. cauda elongata , corpore helvolo.

Felis cauda elongata floccosa , thorace jubato. Syst. nat. 6. p. 4. n. 1.

Leo. Gesn. quadr. 572. Aldr. dig. 2. Jonst. quadr. 72. Dodart. aët. 1. t. 1. & 7. t. 7. Raj. quadr. 162.

Habitat in Africa. Segnis, esuriens prædatur de Equis & majoribus quadrupedibus , nec nisi famelicus Homine

---

Felis genus sobrium , scandit facile arbores , noctu potissimum speculatur , casu delabitur in pedes contusioni vix obnoxium ; glans penis ipsi muricatus retrorsum ; retractis unguibus acutissimis incedit , iisque sævit , inhiando sanguinem haurit ; visa præda caudam movet.

mine ; fugatur accensa flamma ; Canibus coërcetur. Retromingit ♂ coit ? Rugitus horrendus a tracheæ annulis integris imbricatis ; dormit in aprico , esurit tertio die , sagax.

Color luteo rufus. Frons quadrata. Cor maximum.

Maris Thorax hirsutus Caudaque floccosa.

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 6. Barth. act. 1671. n. 17.

**Tigris.** 2. F. cauda elongata corpore , maculis omnibus virgatis.

Tigris. Gesn. quadr. 936. Aldr. dig. 101. Jonst. quadr. 84. Bont. jav. 52. t. 53. Raj. quadr. 165.

Habitat in Asia. Animal tremendæ velocitatis , Homini pessimum , desolat indos ; Mas occidit proprios filios. Visus qui occidit Leonem. Saltu ex insidiis prædam adoritur.

Pulcherrimus quadrupedum maculis virgatis transversis , magnitudine fere Leonis.

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 7. ♂ a. 9. obs. 194.

**Pardus.** 3. F. cauda elongata , corpore maculis superioribus orbiculatis ; inferioribus virgatis.

Panthera, Pardalis, pardus, Leopardus. Gesn. quadr. 824.

Pardus mas , Panthera femina. Alp. ægypt. 237. t. 15. f. 2.

Pardalis Raj. quadr. 166.

Tigris mexicana. Hern. mex. 498. t. 498.

Pinuum Dasypus. Nieremb. nat. 153. t. 153.

Habitat in Indiis. Ex insidiis tribus saltibus prædam rapit ; Equo insilit supra humeros ; se triplo majorem aufert ; gustato humano sanguine non desistit , capit primo æthiopem , tum europæum , ultimo americanum.

**Onca.** 4. F. cauda mediocri , corpore flavescente ocellis nigris rotundato - angulatis medio flavis.

Pardus f. Lynx brasiliensis. Raj. quadr. 168.

Jaguara. Marcgr. bras. 235.

Habitat in America Meridionali.

Corpus lutescens maculis ocellaribus nigris sæpe pupilla nigra una alterave instructis. Abdomen album maculis atris , ut in pedibus , ubi minores. Cauda corpore dimidio brevior , maculis nigris longis.



**Pardalis. 5. F.** cauda elongata, corpore maculis superioribus virgatis; inferioribus orbiculatis.

*Cato-Pardus mexicanus. Hern. mex. 512. t. 512.*

*Catus Pardus f. Catus americanorum. Raj. quadr. 169.*

*Habitat in America. Viso Cane arbores adscendit; Simias eludit.*

*Magnitudo Melis; supra fuscus, subtus albicans; Lineæ punctaque nigra per totum corpus longitudinaliter sparsa, sed pedes & abdomen tantum punctis; Latera lineis latioribus albis & fuscis pinguntur. Aures breves, margine bifidæ absque penicillis. Pedes 5-4. Cauda verticillato-variegata proportionē Cati. Mystaces 4 ordinum: in singulo ordine setæ 3 s. 5, albæ, basi nigræ, longitudine capitis.*

**Catus. 6. F.** cauda elongata fusco annulata, corpore fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudinalibus tribus; lateralibus spiralibus. *Fn. svec. 9.*

*Felis cauda elongata, auribus æqualibus Faun. svec. 3. Syst. nat. 4. n. 6.*

*Felis vulgo Catus. Gesn. quadr. 98. Raj. quadr. 170.*

*Felis. Aldr. dig. 564. Jonst. quadr. 180. t. 72.*

*β. Felis angorensis. Briss. quadr. 266.*

*Habitat in Europæ australis sylvis, Austria. Moribus congenerum, tranquilla ore molat, caudam erigit; excitata agilissima; scandit, irata fremit odore ambrosiaco, oculi noctu lucent. Pupilla interdiu perpendiculari oblonga, noctu tereti ampliata; unguibus complicatis incedit; parce bibit; urina maris corrosiva; ructus foetidissimus; stercus sepelit; clamando rixandoque misere amat; cum pullis repentibusque ludit; in prædam intenta caudam movet; Marum Leo; pacata in comessantibus; pullos convocat; carnes piscesque edit, calida, salsa vegetabiliaque respuit; os instante tempestate manu lavat; dorsum in tenebris electrificat; in altum acta decedit in pedes. Pulices non habet. Delectatur Maro, Nepeta, Valeriana.*

**Lynx. 7. F.** cauda abbreviata: apice atra, auriculis apice barbatis. *Fn. svec. 10.*

*Felis cauda truncata, colore rufescente maculato.*

*Faun. svec. 1. n. 4. It. wogth. 222.*

*Lynx cervarius. Gesn. quadr. 677. Tourn. it. 2. pag. 185.*

*Lynx.*

*Lynx.* Aldr. dig. 90. Jonst. quadr. 82. t. 71. Raj. quadr. 166.

*Habitat in Europæ & Canadæ sylvis & desertis ; arbores inhabitat ; Martes venatur , victitat Leporibus , Capris , Ovibus ; adspiciendo Canem globo perfoditur.*

*Cauda femoribus paulo brevior , apice atra. Palpebra inferior albicans , ut & superior versus canthum majorem. Macula linearis fusca pone oculos. Auricularum apices nigri. Palpebræ albæ. Manus amplissimæ.*

#### 14. VIVERRA. Dentes Primores VI : intermediis brevioribus.

*Molares plures quam tres.*

*Lingua retrorsum sæpe aculeata*

*Ungues exserti.*

Ichneu-  
mon.

1. V. cauda e basi incrassata sensim attenuata , pollicibus remotiusculis.

*Meles digitis mediis longioribus : lateralibus æqualibus unguibus subuniformibus. Hasselqv. itin. 191.*

*Mus pharaonis. Alpin. ægypt. 14. t. 3.*

*Ichneumon. Bellon. itin. 96. pisc. 44. Gesn. quadr. 568. Aldr. quadr. 300. t. 301.*

β. *Mustela glauca. Syst. nat. 5. Amoen. acad. 2. p. 109.*

*Mustela s. Viverra indis Mangutia. Kämpf. amoen. 574. t. 567.*

*Quil. s. Quirpele. Garc. arom. 162.*

*Serpenticida s. Muncos. Rumpf. herb. 7. p. 69. t. 28. f. 2. 3.*

*Ichneumon indicus. Edw. av. 199. t. 199.*

*Ichneumon s. Vulpecula zeilanica. Seb. mus. 1. p. 66. t. 41. f. 1.*

*Habitat in Ægypto ad ripas Nili , & in India primario. Mansvescit ; more Canis sequitur. Victitat Amphibiis , Serpentibus , Lacertis , ovis Crocodili , Ranis , Gallinis , Muribus. Serpantum hostis , morsus a Serpente Ophiorhizam assumit ; repit & proslit ad prædam ; a vento reformidat ; mundum animal ; Catum sæpe trucidat.*

*Frons plana. Labium superius prominens. Auriculæ rotundatæ. Mystaces simplici serie in omnibus labiis*



biis lateralibus ad marginem. Lingua scabra. Pollex a reliquis distinctus. Cauda basi crassa, sensim attenuata, longitudine corporis. Folliculus ante aperturam ani, sub æstu apertus. Pili albido & griseo nigrescente verticillati. Magnitudo Cati; calcaneis incedit.

Mungo. *β. simillima minor, glauca; an specie diversa?*

### Nasua.

2. *V. rufa, cauda albo-annulata.*

Ursus naso producto & mobili. *Briss. quadr. 263.*

Taxus suillus *Aldr. digit. 267.*

Coati. *Marcgr. bras. 228.*

Coati-mondi. *Dod. act. 181. t. 181. Raj. quadr. 180. Houtt. nat. 1:2. p. 238. t. 15. f. 2.*

Habitat in America; egregie fodit quæsiturus Lumbricos; victitat etiam Muribus, Pomis, panis; dum irascitur pessime foetet.

Corpus magnitudine Cati, statura Ursi Lotoris, rufum ut Vulpes pilis in dorso rigidulis. Macula albidæ supra, infra, poneque oculum. Auriculæ parvæ supra nigræ. Verruca supra palpebram superiorem, sub oculo, in bucca, sub gula. Gula flavescens. Nasus eductus in proboscidem nigrum, longissimum, undique mobilem, apice introrsum truncatum, absque lacuna subtus. Dentes primores Superiores 6 distincti: lateralibus majoribus. Inferiores 6: mediis convergentibus. Laniarii solitarii. Molares plures. Lingua fissuris lobata ut querci folium. Cauda erecta, corpore longior, fusca annulis 10 pallidis, pilis parvulis depressa, apice compressa. Pedes calcaneis incedentes tardo gressu, etiam scandentes. Digiti singulis 5 pollice non remoto. Ungues acuti, compressi. Calcanea cristata in mea non aderant.

### Narica.

3. *V. subfusca, cauda concolore.*

Ursus naso producto & mobili, cauda unicolore. *Briss. quadr. 262.*

Habitat in America.

### Putorius.

4. *V. fusca lineis quatuor dorsalibus parallelis albidis.*

Putorius americanus. striatus. *Catesb. carol. 2. p. 62. t. 62.*

Polcat, Skunk, Fiskatta. *Kalm. itin. 2. p. 378.*

Yzquic-

Yzquiepatl *Hern. mex.* 332. *Raj. quadr.* 181. *Seb. mus.* 1. p. 68. t. 24. f. 1.

*Meles surinamensis. Briss. quadr.* 255.

*Habitat in America septentrionali. Colore variat. Irritatus (cum urina forte) halitum explodit, quo nihil fetidius; incessu tardus, nec homines nec Feras metuens; vestes fœtore inquinatæ purgantur sepeliendo per diem. A. Khun.*

*Magnitudo Martis. Color supra varius, (varians colore) subtus ex albo ♂ nigro variegatus. Pedes talis incedentes. Ungues 5-5: anteriores compressi, longi; posteriores breviores, subtus excavati. Dentes Primores superiores in meo nulli; Primores inferiores 6, æquales, quorum 2 interiores; Laniarii supra ♂ infra utrinque approximati.*

*Zibetha. 5. V. cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatim striato.*

*Civetta. Clus. cur.* 57. *Briss. quadr.* 256.

*Felis Zibethi. Gesn. quadr.* 948.

*Animal Zibethicum. Aldr. dig.* 340. t. 343. *Raj. quadr.* 178. *Dodart. act.* 155. *Hern. mex.* 538. 580. 581. *Olear. mus.* 7. t. 6. f. 3.

*Hyæna veteribus, nunc Civetta. Bellon. it.* 94.

*Habitat in Indiis, China, Mexico; fera indomita, irata pilos dorsi erigit.*

*Corpus oblongum. Rostrum obtusum. Dentes Primores superiores 6, paralleli: intermedii paulo minores; inferiores paralleli: medii paulo breviores: alternis interioribus. Laniarii solitarii, utrinque distantes. Molares acuti, denticulati. Aures testæ, breves. Corporis pilæ secundum dorsum longiores, cinereo nigroque undati, rigidiusculi. Pedes subtus nudi. Ungues 5-5, canini. Cauda felis annulata. Guttur Pedes Venter nigra. Folliculus Zibethi inter anum ♂ vulvam in utroque sexu 1, propria apertura folliculi, distincta ab ano ♂ vulva, prominens, ambrosiaca.*

*Anatome. Barthol. cent.* 4. n. 1. ♂ cent. 5. n. 49.

*Castellus P. Hyæna odorifera. Francof.* 1698. 8.

*Genetta. 6. V. cauda annulata, corpore fulvo-nigricante maculato. †*

*Genetta s. Ginetta. Bellon. it.* 76. *Gesn. quadr.* 550.

*Aldr. digit.* 337. t. 339. *Jonst. quadr.* t. 72. *Raj. quadr.* 201. *Briss. quadr.* 252.

*Habitat in Oriente juxta rivos, Hispania, mansuescit ut Felis; olet Moschum.*



Caudæ annuli 8 nigri; totidemque albicantes. Corpus croceo nigricans, maculis nigris ordine dispositis; excepto Capite & Pedibus. Rostrum acutissimum.

15. MUSTELA. Dentes Primores superiores VI, erecti, acutiores, distincti. Inferiores VI obtusiores conferti: duo interiores.

Lingua lævis.

Lutris. 1. M. plantis palmatis pilosis, cauda corpore quadruplo brevior.

Lutra marina. Act. petropol. 1749. p. 267.

Lutra brasiliensis. Raj. quadr. 187.

Habitat in Asia & America septentrionali.

Caput depressum. Auriculæ minimæ, villosæ, subrotundæ. Os obtusissimum. Mystaces copiosæ, rigidulæ: supra supercilia; pone oculos; pone sinum oris; ad latera labii inferioris; sub gula. Dentes primores superiores 6 æquales; inferiores 6: duobus alternis interioribus & duobus bilobis lateralibus. Pedes 5-5, palmati omnes. Cauda depressa, corpore paulo brevior.

Lutra. 2. M. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio brevior. Fn. Svec. 12.

Lutra digitis æqualibus. Faun. Svec. I. n. 10.

Lutra. Bell. aquat. 31. t. 32. Gesn. aquat. 515. Aldr. quadr. 294. Dodart. act. 147. t. 147. Raj. quadr. 187.

Habitat in Europæ aquis dulcibus, fluviis, stagnis, piscinis, non in mari. Viſtitat Piscibus, Ranis, Cancri; piscinas devastat. Nidus sub terra, supra aquæ superficiem, aditu sub aqua; coit februario; advocat feminam sono lento susurrando; parit majo pullos 3 s. 4; Nymphas habet & clitoridem. (An Lutra, Lutris, Lutreola sint Viverræ speciēs, hæreo.)

Anatome E. N. C. d. I. a. 3. obs. 195. & d. 2. a. 10. obs. 112. & cent. 10. app. 468.

Lutreola. 3. M. plantis palmatis hirsutis, digitis æqualibus, ore albo. Fn. Svec. 13. \*

Ha.

*Habitat in Finlandiæ aquosis, victitans Piscibus, Ranis.*

Barbara. 4. *M. pedibus fissis, atra, collo subtus macula alba triloba.*

*Galera. Brown. jam. 485. t. 49. f. 1?*

*Habitat in Brasilia.*

*Corpus statura Martis, nigrum pilis rigidioribus. Auriculæ rotundæ, villosæ. Area cinerascens ante oculos. Macula sub medio collo, non sub gula, albida. Mammarum 4, pone umbilicum.*

Gulo. 5. *M. pedibus fissis, corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro Faun. svec. 14. Houtt. nat. 2. p. 189. t. 14 f. 4.*

*Gulo. Ol. Magn. Scheff. lapp. 339. Racz. polon. 339.*

*Habitat in alpibus Lapponiæ, Russiæ, Sibiriae, sylvis vastissimis. Coit januario, parit majo pullos 2 f. 3. Victitat Leporibus, Avibus, Rangiferis, cadaveribus; admittit Vulpem; voracior Urso; Pellis præstantissima, pretiosissima; fætor horrendus; vix excoriandus.*

*Dentes primores superiores 6: horum 4 æquales, utroque latere quasi lobati; extimi vero longiores, altero latere lobati. Inferiores 6 obtusissimi: horum 2, alterni interiores. Laniarii superiores 1, antice remoti, extus rugosi; inferiores 1, utrinque approximati. Molares superiores 5; inferiores 6: omnes lobati primo ultimoque minuto.*

*Cum fata mihi denegarint præmissas species intueri vivas, videant alii numne ad Viverras referri debeant; hoc svadet Lutræ statura; hoc Gulonis fætor, scansura arborum, summa laniena.*

*Anatome. Barth. cent. 4. obs. 30.*

Martes. 6. *M. pedibus fissis, corpore fulvo-nigricante, gula pallida. Fn. svec. 15.*

*Martes. Gesn. quadr. 151. Jonst. quadr. t. 64. Raj. quadr. 200.*

*Habitat in sylvis Europæ antiquis. Victitat Sciuris, Muribus, Avibus.*

*Varietas duplex rusticis: Fagorum gutture albo; Abietum gutture flavo.*

Putorius. 7. *M. pedibus fissis, corpore flavo nigricante, ore auriculisque albis. Fn. svec. 16. Pennat. britann. t. 1.*



*Mustela flavescente-nigricans*, ore albo, collari flavo.

*Syst. nat.* 6. p. 5 n. 3.

*Putorius*. *Gesn. quadr.* 767. *Aldr. ungv.* 330. *Jonst. quadr. t.* 64. *Raj. quadr.* 199. *Briss. quadr.* 249.

*Habitat* inter Europæ rupes & lapidum acervos; noctu prædatur *Cuniculos*, *Gallinas*, *Aviculas*, *Ova* rapit; ano halitu fætidissima.

*Mas subflavus* ore albido. *Femina* albido-subflava. *Briss.*

*Furo.* 8. *M. pedibus fissis*, oculis rubicundis. †

*Mustela sylvestris*. *Aldr. digit.* 325. t. 327.

*Mustela sylvestris Viverra dicta*. *Raj. quadr.* 199.

*Viverra*, *Furo*, *Ictis*. *Gesn. quadr.* 262.

*Habitat* in Africa.

*Putorio minor*; *Auriculæ arrectæ patulæ breves*; *Oculi rubicundi*. *Raj.* Forte idem cum præcedente, ut *Brissono*.

*Zibellina.* 9. *M. pedibus fissis*, corpore obscure fulvo, fronte exalbida, gutture cinereo. †

*Mustela Sobella*. *Gesn. quadr.* 868.

*Mustela Sibellina*. *Aldr. digit.* 335. *Raj. quadr.* 201. *Acl. petrop.* 1760. v. 5. p. 330. t. 6. *Briss. quadr.* 248.

*Habitat* in Asia septentrionali, Tataria, Sibiria.

*Color fulvo-obscurus* gutture cinereo; anterior pars capitis & auriculæ ex albido-cinereæ. *Raj.* *Vibrissæ* ad supercilia, nares, os longissimæ.

*Erminea* 10. *M. pedibus fissis*, caudæ apice atro. *Fn. svec.* 17.

*Houtt. nat.* 3. p. 206. t. 14. f. 5.

*Mustela vulgaris*. *Gesn. quadr.* 149. *Aldr. ungv.* 307. *Jonst. quadr. t.* 74. *Raj. quadr.* 195.

β. *Mustela candida* f. *Ermineum*. *Raj. quadr.* 198.

*Mustela alpina candida*. *Wagn. helvet.* 180.

*Habitat* in Europa & Asia frigidiore; edit *Pisces*, *carnes*, *Mures*, *ova*, *Fungos*, non vegetabilia; avarissima, fætida, immunda, siticulosa, noctu prædatur, *Muribus* pessima, quos totos relictis solis dentibus consumit, eorum foramina intrat; a *Fele* non facile occiditur; recurrens accurrensque continuo prospicit; *terrefacta epilepsia* convellitur.

Con-

---

*Mustelæ* genus corpore elongato pedibusque brevibus est, currit trunco incurvato, scandit arbores, salit ex arbore in arborem.

*Confer. Mustela javanica* Seb. *mus.* 1. p. 77. t. 48. f. 4.  
*Cauda dimidia extrorsum nigra; Corpus hyeme album*  
*excepta cauda, æstate rufum excepto abdomine, pe-*  
*lore, gula. Pellis pretiosa hodie Feminis nostratibus*  
*nobilioribus.*

*nivalis.* 11. *M. pedibus fissis, corpore albo, caudæ apice vix pi-*  
*lis ullis nigris.* *Fn. svec.* 18.

*Habitat in Westrobothnia. Snómus.*

*Simillima Ermineo, sed dimidio minor, Caudæ apico pilo*  
*vix uno alterove albo.*

16. URSUS. *Dentes Primores superiores VI, intus*  
*excavati alterni.*

*Inferiores VI: laterales 2*  
*longiores lobati; secunda-*  
*rii basi interiores.*

*Laniarii solitarii, conici.*

*Molares V.f. VI: primo lania-*  
*riis approximato.*

*Lingua lævis.*

*Membrana nictitans. Nasus promi-*  
*nens.*

*Penis scatens osse curvato.*

*Arctos.* 1. *U. cauda abrupta. Faun. svec.* 19.

*Urfus. Gesn. quadr.* 14. *Aldr. digit.* 117. *Jonst. quadr.*  
*t. 55. Dodart. act.* 67. t. 67. *Raj. quadr.* 171.

*Habitat in Europæ frigidaë uliginosis sylvaticis; victi-*  
*tat Baccis, Insectis, alvearibus Apum, Cudaveribus*  
*Et laniena Pecorum Equorumque; prædam mox in-*  
*flat, relictam in paludibus defodit; escam lubenter*  
*lavat; manus cubans continuo lambit; coit fine octo-*  
*bris, uterum gerit 112 diebus; hybernatur abstemius*  
*a medio novembris in initium regelationis; obambu-*  
*lat plerumque, segnis nisi laceffetur, tum agilissime*  
*erectus ambabus pugnat; sine injuria Hominem non*  
*adoritur; ante pugnam pullos ascendere arbores co-*



git, descendit præeunte cauda, quam valde metuit; pediculis caret.

*Hispidus*, membrana niētitante torvus. Pollex digitis angustior. *Mammæ* 4. Cranium, non cerebrum, Leonis minus. *Tendines* præstantissimæ pro filis Lapporum; *Fel* amarissimum pro epilepticis; pingvedo pro cosmeticis.

*Ursus maritimus albus major*, arcticus. *Martens*. *Spitzb.* 73. t. O. f. C. forte distincta species est, nobis non visa, capite longiore, collo angustiore.

*Meles.* 2. U. cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra. *Fn. svec.* 20.

*Meles* unguibus anticis longissimis. *Syst. nat.* 6. p. 6.

*Meles.* *Gesn. quadr.* 686.

*Taxus.* *Aldr. digit.* 264. *Jonst. quadr. t.* 64. *Raj. quadr.* 185. *Briss. quadr.* 252.

*Habitat* in Europa inter rimas rupium & lapidum in Sylvis; viētitat *Insectis*, *Ovis*, foliis *Secales* *Lathyrigue*, quibus corrasis hybernat, admodum pinguescit; nocturnus venatur *Cuniculos*, antra fodit inhabitatque; *stercus* in distincto & determinato loco deponunt inhabitantes extra antrum singuli; die latet; folliculum putorium supra anum haurit hybernans.

Corpus supra albidum, subtus nigrum; *Membrana niētitans* ampla totum oculum tegens.

*Anatome E. N. C. d.* 2. a. 5. *obs.* 32. & d. 3. a. 3. *obs.* 163.

*Lotor.* 3. U. cauda annulata, fascia per oculos transversali nigra.

*Ursus cauda elongata.* *L. Act. stockh.* 1747. t. 9. f. 1. *Houtt. nat.* 2. p. 237. t. 15. f. 1.

*Mus indicus* alius. *Gesn. quadr.* 741.

*Vulpi affinis americana.* *Raj. quadr.* 179.

*Raccoon.* *Kalm. it.* 2. p. 228. 327. & 3. p. 24.

*Coati.* *Worm. mus.* 319. *Major. mosch.* 30. *Raj. quadr.* 179. *Briss. quadr.* 261.

*Felis montana americana.* *Seb. mus.* 1. p. 68. t. 42. f. 1.

*Mapach.* *Nieremb. nat.* 175.

Ha-

*Ursi* genus scandit interdum arbores, at non salit, sed descendit posterioribus præeuntibus. Talis communiter incedit. Penis osse curvato scatet.

*Habitat in Americæ maritimis. Edit lubenter Ova, Gallinas, Conchas; cibum lavat, manibus ori admovet; odoratu tactuque excellit; mentis tenacissimus; dormit a 12 noctis in 12. diei; pellitur setis porcinis. Penis osse incurvato scatet. Lubenter scandit.*

*Corpus cinereum, pilis erectis, ferrugineis apice nigris, unde inspectus umbra nigra cingitur. Caput fuscum; Frons alba. Fascia nigra trans oculos, in medio interrupta cum linea nigra perpendiculari interjecta. Cauda pilis nigris annulata.*

Luscus. 4. U. cauda elongata, corpore ferrugineo, rostro fusco, fronte plagaque laterali corporis.

Ursulus lupi affinis. Edw. av. 103. t. 103.

Ursus freti hudsonis. Briss. quadr. 240.

Quickhatch. Anson. it. 1. t. 58. Ellis. huds. t. 3. f. 2.

*Habitat ad sinum Hudsonis.*

17. DIDELPHIS. Dentes Primores Superiores X.  
Inferiores VIII: inter-  
mediis 2 brevissimis.

Laniarii longi.

Molares denticulati.

Lingua subciliata.

Folliculus abdominalis mamma-  
rum.

Marsupia. 1. D. mammis 8 intra abdomen. Amoen. acad. 1. p. 279. Mus. Ad. Fr. 10.

Philander. Seb. mus. 1. p. 64. t. 39.

Opossum. Tyson. act. 290. p. 1565.

Carigue. Laët. amer. 551.

Carigueya brasiliensibus. Marcgr. bras. 222. Pis. bras. 323. Jonst. quadr. 136. t. 63.

Maritacaca. Raj. quadr. 182.

Tlaquatzin. Hernand. mex. 330.

*Habitat in America; visitat Gallinis, Sacchari cul-  
mis; arbores scandit, prosecutus a Canibus se mor-  
tui*

E 4

Didelphides pollice plantarum, uti Primates, distincto s. remoto gaudent, sed mutico.



*tui instar contrahit, Canibus non esculenta; terrefacta pullos lactantes intra alvum recipit.*

Corpus *Melis*, magnitudine *Felis* majoris. Rostrum conicum, longum Suis instar, carinatum, rictu longissimo *Vulpis*. Nares perpendiculares, lunares. Vibrissæ 5. ordinum, longæ; setæ pone oris rictum 8 sub gula. 5 Auriculæ rotundatæ, atræ apicibus albis. Dentes molares lobati: anteriores simplices: primi minimi; reliqui ut in charactere. Tibiæ nigrae, laeves pilis brevibus. Cauda nuda, longitudine corporis quasi segmentis ex rugis, prehensilis. Manus pentadactylæ, fissæ. Digiti teretes, nudi, æquales. Ungues compressi, arcuati. Plantæ ut in palmis: Pollex omnino muticus.

Philander.

2. D. cauda basi pilosa, auriculis pendulis, mammis quaternis.

Tlaquazin f. Tai-ibi brasiliensibus. *Seb. mus.* 1. p. 57. t. 36. f. 4.

*Habitat in America.*

*Figura Sebae aliena rostro rotundiore, fascia fusca trans oculos, pollice postico unguiculato, quod non in nostro. Ubra duo: mammis in singulis 2.*

Opossum.

3. D. cauda semipilosa, superciliarum regione pallidior, mammis binis.

Philander, Opossum f. Carigueya. *Seb. mus.* 1. p. 56. t. 36. f. 1. 2.

*Habitat in America.*

*Abdomen circa mammas contrahitur in marsupium; pollices postici mutici.*

murina.

4. D. cauda semipilosa, mammis senis. *Amæn. acad.* 1. p. 279. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 8. \*

*Mus sylvestris americanus.* *Seb. mus.* 1. p. 48. t. 31. f. 1. 2. 3. 6.

*Habitat in Asia, America.*

*Ungues digitis omnibus acuti, exceptis pollicibus posticis. An pullus præcedentis?*

dorsifera.

5. D. cauda basi pilosa corpore longiore, digitis manuum muticis. †

*Mus sylvestris americana.* *Seb. mus.* 1. p. 49. t. 31. f. 5. 4. *♂* 2. p. 90. t. 84. f. 4. *Merian. surin.* 66. t. 66.

*Habitat in America. Pullos in dorso gerit caudis  
cirrhi instar convolutis.*

18. TALPA. Dentes Primores superiores VI; inferiores VIII.

*Laniarii major I; minores IV.*

europæa. 1. T. caudata, pedibus pentadactylis. Faun. suec. 23.

Talpa caudata. It. scan. 332. \*

Talpa. Gesn. quadr. 931. Aldr. dig. 45. Raj. quadr. 236. Seb. mus. 1. t. 41. f. 1. 4.

*Habitat in Europæ apricis humosis, evertens prata hortosque, viſſitans Lumbricis, nec Plantis; expellitur Ricino; hybernatur, pellis delicatula.*

*Penis omnium longissimus.*

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 51. & d. 2. a. 1. obs. 130.

Paulinus C. F. Talpa. Francof. 1689.

asiatica. 2. T. ecaudata, palmis tridactylis. †

Talpa sibirica versicolor. Seb. mus. 1. t. 32. f. 4. 5.

*Habitat in Sibiria.*

19. SOREX. Dentes Primores superiores II bifidi.  
Inferiores IV: intermediis brevioribus.

*Laniarii utrinque plures.*

cristatus. 1. S. naribus carunculatis, cauda brevior.

*Habitat in Pennsylvania.*

*Corpus facie Talpæ, atrum, palmis niveis. Rostrum elongatum. Dentes Primores superiores 2, inferiores 4. Laniarii utrinque 4. Nares singulæ Caruncula stellato-palmata radiis. 10. f. 15. subulatis nudis, ut in Erinaceo. Cauda subnuda, concolor, corpore dimidio minor.*

minutus. 2. S. rostro longissimo, cauda nulla.

*Habitat in Sibiria, locis humidiusculis sub arborum radicibus, nido e Lichenibus confecto; colligit semi-*



*mina ; fodit ; cito currit ; sonus Vespertilionis. Er. Laxman.*

Corpus Mammalium omnium facile minimum, drach. ponderis, pilis tenerrimis nitidum, griseum, subtus albicans. Caput magnitudine fere corporis : Rostrum attenuato, subtus exarato. Dentes . . . Mystaces oculos attingentes. Oculi parvi, retracti. Auriculæ dilatatæ, breves, nude. Pedes 5 - 5. Cauda nulla.

aquaticus. 3. S. plantis palmatis, palmis caudaque brevioribus albis. Talpa virginianus niger. Seb. mus. 1. p. 51. t. 32. f. 3.

*Habitat in America septentrionali. P. Kalm.*

Corpus cinereum s. fuscum, statura S. cristati. Dentes primores superiores 2; inferiores 4: intermediis brevissimis. Laniarii utrinque plures, discreti. Palmarum albæ. Cauda alba, corpore  $\frac{1}{4}$  brevior.

murinus. 4 S. cauda mediocri, corpore fusco, pedibus caudaque cinereis.

*Habitat in Java.*

Corpus magnitudine Muris Musculi. Rostrum elongatum, subtus canaliculatum, cinereum Vibrissis longis. Auriculæ rotundatæ nudiusculæ. Dentes Primores 2, acuti, paralleli. Pedes pentadactyli unguiculati. Cauda corpore paulo brevior, minus pilosa.

Araneus. 5. S. cauda mediocri, corpore subtus albido. Fn. svec. 24. \*

Mus araneus. Gesn. quadr. 471. Aldr. digit. 441. t. 442. Jonst. quadr. t. 66. Raj. quadr. 239. Briss. quadr. 178.

*Habitat in Europæ cryptis sylvis, teter venenumque olens; occiditur a Felibus, sed non editur.*

1. **ERINACEUS.** *Dentes Primores superiores II*  
*distantes ; inferiores*  
*II minus distantes.*  
*Laniarii utrinque 2,*  
*recumbentes.*

Europæ us. 1. *E. auriculis rotundatis, naribus cristatis. Faun. suec.*  
 22. *It. gotl. 264. \**

*Echinus s. Erinaceus terrestris. Gesn. quadr. 368. Aldr.*  
*digit. 459. Jonst. quadr. t. 68. Raj. quadr. 231.*  
*Seb. mus. 1. t. 49. f. 1. 8.*

*Habitat in Europa, nidificans e Musco in fruticibus ;*  
*hybernans ; nocturnus ; victitans Bufonibus, Vermi-*  
*bus, Coleopteris, Conchis, Fruñibus, Aviculis, Ca-*  
*daveribus ; muscos fodit ; natat facile ; monogamus*  
*incedit ; meticulous iratusque in globum decussatis*  
*spinis se contrahit ; compressus pedibus ejulat ; am-*  
*brosiacus.*

*Præputium propendens. Nares singulæ caruncula cri-*  
*statae.*

Auris. 2. *E. auriculis nullis. † Briss. quadr. 184.*  
*Erinaceus americanus albus. Seb. mus. 1. p. 78. t.*  
*49. f. 3.*

*Habitat in America ; modo non varietas prioris.*

Malaccensis. 3. *E. auriculis pendulis. † Briss. quadr. 183.*  
*Hystrix brachyura, Syst. nat. 10. p. 57.*  
*Porcus aculeatus s. Hystrix malaccensis. Seb. mus. 1.*  
*p. 81. t. 51. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

*Facies cum Brissonio svadent Erinacei speciem.*



## IV. GLIRES.

*Dentes Primores bini supra & infra  
proximati, a molaribus remanentibus  
Laniarii nulli.*

21. HYSTRIX. *Dentes Primores II. oblique  
fi. (Raj.)  
Molares octo.  
Corpus spinis tectum.*

cristata. 1. *H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite  
cristato, cauda abbreviata.*

*Hystrix capite cristato. Briss. quadr. 125.*

*Hystrix. Gesn. quadr. 563. Aldrov. digit. 471. Jonst.  
quadr. 119. t. 68. Bodart. aët. 233. Raj. quadr. 208.*

*Hystrix orientalis cristata. Seb. mus. 1. p. 79. t. 52.  
f. 1.*

*Habitat in Asia, Africa; contracta in globum ne Leontem metuit.*

*Nucha aculeis setisque rigidis tenuissimis flexilibus locis  
gissimis.*

rehensilis. 2. *H. pedibus tetradactylis, cauda elongata prehensili  
minuda.*

*Hystrix. Bont. jav. 54.*

*Cuandu brasiliensibus. Marcgr. bras. 233. Pis. amer.  
99. Jonst. quadr. t. 60. Raj. quadr. 208.*

*Hoitztlacuatzin. Hern. mex. 322.*

*Habitat in Asia, America meridionali; noctu vagatur  
prædatur Gallinis &c. caudam ramis circumvolvitur  
ne labatur; voce est Gruis; Spinas in hostem ejaculare  
valet, non extrahendas; quæ applicantur locis  
hirudinum.*

dorsata. 3. *H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda  
mediocri, dorso solo spinoso.*

*Hystrix canadensis. Edw. av. 52. t. 52. Ellis. huds.  
t. 3. Anson. it. 1. p. 56. t. 58.*

*Habitat in Canada*

*Corpus ferrugineum , Cauda apice subtus alba. Aculei inter pilos occultati.*

rou- 4. H. pedibus pentadactylis, cauda longissima : aculeis  
ra. clavatis.

Porcus aculeatus f. *Hystrix orientalis*. *Seb. mus. i. p.*  
84. t. 52. f. i.

*Habitat in Asia.*

## LEPUS. *Dentes Primores II: superiores duplicati: interioribus minoribus.*

cus. 1. L. cauda abbreviata, auriculis apice nigris. *Faun.*  
*svec. 25.*

*Lepus. Gesn. quadr. 69. Aldr. dig. 247. Jonst. quadr.*  
*t. 65. Raj. quadr. 204.*

β. *Lepus caudatus plane candidus. Briss. quadr. 139.*

*Habitat in Europa; victitat ramulis fruticum, cortice arborum, radicibus. Hyeme in frigidis niveus, exceptis auribus nigris. Cauda etiam æstate alba. Aures longæ. Oculi exstantes membrana nictitante, somno aperti. Femora postica crassa Pedibus lanatis 5-4, ♂ dorsum constituunt præstantissimam partem. Nares humidi, motitantes. Inermis cursu valet, timidus, currit gyros sensim breviores, retro deviat exfiliendo; a Canibus, Felibus, Accipitribus, Strigibus venatur; projecto sub venatu in altum pileo sese occultat sub proximo frutice metu Accipitris (Ström.) Cavitas utrinque e regione pubis; mordet truncum transcendendum; delectatur tympano; cervice fragili; immensus parturitione; urina fætida, non in cubile; Pulicibus obnoxius. Lagographia Waldungii W. Amberg. 1679. 4. ♂ Paullini C. F. Wienn. 1691. 4.*

*Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 251. ♂ a. 3. obs. 93. ♂ d. 3. a. 5. obs. 225. Barthol. act. 1671. n. 136.*

cu- 2. L. cauda abbreviata, auriculis nudatis. *Fn. svec. 26.*

s. Cuniculus. *Gesn. quadr. 72. Aldr. digit. 382. Jonst. quadr. t. 65. Raj. quadr. 205.*

Lepus

cornutus, si non hybridus, certe fabulosus sit.



*Lepus caudatus* pilis tenuissimis & longissimis toto corpore vestitus. *Briss. quadr.* 141.

*Habitat in Europa australi, hic gaudet in effossis habitare Cuniculus antris arenosis. Prædatur Falconibus Mele, Putorio.*

*Species facilius dignoscitur, quam differentia specierum determinatur; Auriculæ capite breviores, nec longiores uti præcedentis.*

*Anatome. Parv. obs.* 10.

capensis. 3. *L. cauda longitudine capitis, pedibus rubris. Habitat ad Cap. b. Spei. Fodiens. J. Burmannus.*

brasiliensis. 4. *L. cauda nulla. Syst. nat. 9. n. 1. Cuniculus Brasiliensis Tapeti. Marcgr. bras.* 223. *bras.* 102. *Raj. quadr.* 205. *Habitat in America meridionali.*

23. CASTOR. *Dentes Primores Superiores truncati, angulo transverse excavati; inferiores angulo transverse transversi. Cauda depressa.*

Fiber.

1. *C. cauda ovata plana. Faun. svec.* 27. *Castor. Gesn. pisc.* 185. *Rond. pisc.* 236. *Jonst.* t. 68. *Dodart. act.* 131. *Raj. quadr.* 209. *quadr.* 706.

*Fiber. Bellon. aqu.* 30.

*Habitat in Europæ, Asiæ, Americæ borealibus ad ripas fluviorum lacuumque, vitans corticibus Salicis, potissimum Populi, unde Castoreum præparatur; vix Pisces edit. Ventriculo superius innatum est corpus crassum cavernosum Humore fætido.*

*Castoreum e folliculis putoriis, utriusque sexus, elaboratur; præstantius europæum quam canadense; in superiore cavitate liquidum ut Axungia.*

*Architectura in construendo domos ad ripas superiorum omnium animalium, excepta Hominis, de qua Aët. stockh.* 1756. p. 207.

*Marius J. Castorologia. Wienn.* 1685.

*Anatome L. N. C. d. 1. a. 2. obs.* 251.

- moscha- 2. *C. cauda longa compresso-lanceolata, pedibus palma-*  
tus. *Faun. svec. 28.*  
*Mus aquaticus exoticus. Clus. exot. 375. Aldr. di-*  
*git. 448. Jonst. quadr. t. 73. Worm. mus. 334.*  
*Raj. quadr. 217. Act. petropol. 1758. v. 4. p. 373.*  
*Habitat in Russiæ aquosis, victitat Acoro, habitat*  
*more Talparum e terra & ligno, introitu sub ipsa*  
*aqua.*  
*Pedes, ut in antecedente, palmati. Auriculæ nullæ.*
- zibethi- 3. *C. cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fissis.*  
cus. *Castor cauda verticaliter plana, digitis omnibus a se*  
*invicem separatis. Briss. quadr. 136.*  
*Castor moschatus, pedibus fissis, pilis albis ciliatis.*  
*Kalm. it. 3 p. 29.*  
*Rattus moschatus. Act. parif. 1725. p. 323. t. II.*  
*Habitat in Canada, victitans Acoro.*  
*Auriculæ brevissimæ.*  
*Folliculi & Cauda tam hujus quam sequentis ambro-*  
*siaci, Zibethi instar, quod pellit Acaros Tineasque;*  
*unde Russi simbriatis vestimentis insuunt, ut tuti a*  
*contagiosis sint.*

## 24. MUS. Dentes Primores inferiores subulati.

- Porcel- 1. *M. cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridacty-*  
lus. *lis. It. wgoth. 224. Amoen. acad. 4. p. 190. t. 2. \**  
*Cuniculus indicus. Gesn. quadr. 367. Aldr. digit. 391.*  
*393.*  
*Porcellus indicus f. Cuniculus indicus. Jonst. quadr.*  
*161. t. 63. f. 6. Edw. av. t. 294. f. 2.*  
*Mus f. Cuniculus americanus guineensis porcelli pilis*  
*& voce. Raj. quadr. 223.*  
*Cavia Cobaya. Marcg. bras. 224. Pis. bras. 102.*  
*Habitat in Brasilia. Pipientes, loquaces, inquieti,*  
*sequaces, calcitrantes, attenti, comantes, mastican-*  
*tes, edunt vegetabilia variata; potant lympham pu-*  
*ram, calorem amant; femina mammis duabus, pa-*  
*rit pullos perfectissimos, mox coit; mas bombylans*  
*junio-*

---

*Pedes Muribus communiter palmis 4daçtylis, plantis 5daçtylis; at Plantæ*  
*3daçtylæ Porcello, Aguti, Leporino, Jaculo. Sed omnes 5daçtylæ*  
*Lemmo, Paca, amphibio.*



*juniores masculos mordet paraplecticos. Color varius, etiam spontaneis.*

*Historia hujus habetur in Amoen. acad. l. c. inserta.*

- Aguti. 2. *M. cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis, abdomine flavescente.*  
*Cuniculus caudatus auritus, pilis ex rufo & fusco mixtis rigidis. Briss. quadr. 143.*  
*Mus sylvestris americanus, porcelli pilis & voce. Raj. quadr. 226.*  
*Aguti l. Acuti. Marcgr. bras. 224. Pis. bras. 102. Jonst. quadr. t. 63.*  
*Habitat in Brasilia, Surinamo, Guiana.*  
*Corpus Pilis rigidis rufo - fuscescentibus, Abdomine flavescente.*
- Leporinus. 3. *M. cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis, abdomine albo.*  
*Lepus javensis. Catesb. carol. 3. p. 18. t. 18.*  
*Habitat in Java, Sumatra.*  
*Aures subrotundæ, Color rufus, abdomine albo.*
- Citellus. 4. *M. cauda abbreviata, corpore cinereo, auriculis nullis.*  
*Mus Citellus. Gesn. quadr. 835. Aldr. quadr. 436. Raj. quadr. 220.*  
*Habitat in Austria, Bohemia, Polonia, sub terra.*
- Lemmus. 5. *M. cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, corpore fulvo nigro-vario. Fn. svec. 29.*  
*Mus cauda abrupta, corpore fulvo nigroque vario. Aët. stockh. 1740. p. 326. t. 6. f. 45.*  
*Mus montanus. Scheff. lapp. 346.*  
*Lemming. Olear. mus. 21. t. 12. f. 6.*  
*Lemmus. Ol. Magn. sept. 18. 20.*  
*Mus norvagicus. Worm. mus. 322. t. 325. monogr. 65. Raj. quadr. 227.*  
*Habitat in alpibus Lapponicis sub tuberibus terræ.*  
*Gregatim fugiunt quibusdam annis ex alpibus, recta via iter instituentes; edunt Lichenem rangiferinum, amara Betulæ nanæ, non carnes; prædantur a Canibus Lagopodibus.*  
*Wormii Historia animalis e Norvagia. Hassn. 1652. quart. hunc sistit.*  
*Anatome. Bartholin. cent. 2. p. 301.*

Paca. 6. *M. cauda abbreviata*, pedibus pentadactylis, lateribus flavescenti-lineatis.

*Mus brasiliensis*, porcelli pilis & voce. *Raj. quadr.* 226.

*Cuniculus caudatus auritus* pilis obscure fuscis rigidis, lineis ex albo flavescentibus ad latera. *Briss. quadr.* 144.

Paca. *Marcgr. bras.* 224. *Pis. bras.* 101. *Jonst. quadr.* t. 63.

*Habitat in Brasilia, Guiania.*

*Corpus supra fuscum lineis tribus albo-flavescentibus. Auriculæ ovatæ tectæ, minus acutæ. Verruca superciliorum, temporum, gulæ. Dentes primores superiores simplices.*

Marmota. 7. *M. cauda abbreviata subpilosa*, auriculis rotundatis, buccis gibbis.

*Mus cauda elongata nuda*, corpore rufo. *Syst. nat.* 6. p. 10. n. 11.

*Mus montanus.* *Matth. diosc.* 2. c. 63.

*Mus alpinus.* *Raj. quadr.* 221. *Wagn. helv.* 179. *Doddart. mem.* 3. p. 31. t. 31. *Gesn. quadr.* 743. *Aldr. digit.* 445.

*Habitat in alpibus Helveticis, Tridentinis. Profunde & celerrime fodit; hybernatur alto somno, ut vix excitetur vel in frustra dissectus; manibus cibum ori admovet; sæpe erecta incedit; facilius in planitie, quam sub terra assequitur; mansvescit; rebus cibariis, domesticis, vestimentis nocet.*

*Dentes primores inferiores apice divergentes. Mystaces utrinque serie sextuplici. Aures parvæ, vestitæ. Bucca utrinque: admodum gibba. Cauda palmaris, nigra. Verruca supra oculos setis 6; sub oculis setis 7. Dorsum cinereum. Inguina & pedes cinereo-flavescentia. Sutura a gula ad anum. Pedes 4-5. D. Z. Hallman.*

Monax. 8. *M. cauda mediocri pilosa*, corpore cinereo, auriculis subrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. *Monax s. Marmota americana.* *Edw. av.* 104. 104.

*Habitat in America septentrionali.*

*Auriculæ subrotundæ; Corpus Cuniculo paulo majus.*

*Palmæ 4dactylæ: cum rudimento quinti mutici. Plantæ 5dactylæ: postico brevior. Cauda longitudine pedum, subtus nuda. Claud. Alstræmer.*



**Cricetus.** 9. *M. cauda mediocri, auriculis rotundatis, corpore subtus nigro, lateribus rufescentibus maculis tribus albis. Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque longitudinaliter vario. Syst. nat. 6. p. 10. n. 10.*

*Cricetus Raj. quadr. 221. E. N. C. d. 2. a. 5. obs. 186. Gesn. quadr. 738.*

• *Hamster. Mayer. thier. (Norib. 1748. fol.) t. 81, 82. Habitat in Germania.*

*Cavernas fodit sub terra pluribus concamerationibus, duplici foramine: altero aliquo aditu, altero perpendiculari specula. Colligit Frumentum, Pisa, Fabas, fructus, in distinctis cameris servanda, adportat ea in bucca; parit bis in anno sex pullos, itidem in propria camera servandos, uti etiam sterquilinum in distincta.*

*Venatur ob carnes, pelles, frumentum collectum; occiditur pulvere Veratri, farina & melle in panes coctis.*

*Numerus digitorum pedum in hac nobis ignotus. Cuniculo minor, cauda pedibus fere brevior. Bucca utrinque saccata.*

**terrestris.** 10. *M. cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere brevioribus. Faun. svec. 31. \**

*Mus cauda longissima pilosa, auribus subrotundis vellere brevioribus. Syst. nat. 6. p. 10. n. 5.*

*Mus agrestis, capite grandi, brachyuros. Raj. quadr. 218.*

*Habitat in Europæ terra & aqua.*

*Corpus fuscum subtus pallidum, at non albicans. Caput crassius ore gibbo. Cauda magis pilosa, quam in Ratto, sed corpore dimidio brevior; at pedibus fere longior.*

*Hortos Talpæ instar misere effodit, palmis licet parvis; natat in fossis, & urinatur, plantis licet fissis; Radices arborum decorticat, plantarum consumit. aufert; Pullos anatum in piscinis occidit.*

**amphibius.** 11. *M. cauda elongata pilosa, plantis palmatis. Faun. svec. 32. †*

*Mus major aquaticus s. Rattus aquaticus Raj. quadr. 217.*

*Mus aquaticus. Bell. aquat. 35. t. 36.*

*Habitat in Europæ, Africæ fossis, ripis, piscinis, hortis. Fodit ad fossas & radices arborum, natat, urinatur, consumit radices, Hortis & Satis infestus; capitur Nassis e virgulis confectis sub aqua demersis. Species a me non propius inspecta, an a priori vere distincta?*

Rattus. 12. *M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. Faun. svec. 33. \**

*Mus cauda elongata subnuda, corpore fusco cinerasciente.*

*Mus domesticus major. Gesn. quadr. 109. Aldr. digit. 417. Raj. quadr. 217.*

*Glis. Jonst. quadr. t. 66.*

*Habitat in domibus Europæ, domibus pessimum cautumque animal, utensilibus infestum omnibus; Prædatur a Fele, Bubone, aliisque Strigibus. Ex America navi quadam Antwerpiana primum in Europam pervenisse refert Poppin. orb. illustr. 196.*

Muscu. 13. *M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis; lus. plantis pentadactylis: pollice mutico. Fn. svec. 34.*

*Mus cauda nudiuscula, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbesciente. Faun. svec. t. n. 31.*

*Mus. Gesn. quadr. 714. Aldr. digit. 417. Jonst. quadr. t. 66.*

*Mus domesticus vulgaris f. minor. Raj. quadr. 218.*

*Habitat in domibus Europæ; polyphagus consumit cibaria, cerealia, carnes, cadavera; vix incarcerationis; delectatur Musica; Prædatur a Fele, Mustela, Erinaceo, Strige; in horreis pellitur Ebulo.*

*Unguis pollicaris palmarum nullus, quo a Ratto differt. Varietas alba rarius in Westrobothnia occurrit.*

avellana- 14. *M. cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula al- rius. bicante, pollicibus posticis muticis. Fn. svec. 35.*

*Mus avellanarum minor. Raj. quadr. 220. Aldr. digit. 440. Edw. av. 119. t. 266.*

*Glis supra rufus, subtus albicans. Briss. quadr. 162.*

*Habitat in Europæ sylvis. Colligit nuces, glandes; superfluas defodit. Hybernatur.*

*Pedes digitis 4-5.*



- quercinus. 15. *M. cauda elongata pilosa, macula nigra sub oculis.*  
*Mus avellanarum. Gesn. quadr. 833. Jonst. quadr. t. 66.*  
*Mus avellanarum major. Aldr. digit. 439. Raj. quadr. 219.*  
*Glis supra obscure cinereus, infra ex albo cinerascens, macula ad oculos nigra Briss. quadr. 161.*  
*Sorex plinii. Gesn. quadr. ic. 115.*  
*Habitat in Europa australi.*  
*Corpus supra obscure, subtus pallide cinereum. Macula nigra circa oculos & alia infra auriculas. Pedes 4-5.*
- gregarius. 16. *M. cauda corpore triplo brevior subpilosa, corpore griseo subtus pedibusque albis.*  
*Habitat in Germania, Svecia. Fodit & sub terra degit; sedens edit.*  
*Corpus M. Musculo paulo majus, supra griseum: pilis basi atris, medio ferrugineis, apice nigris. Gula, abdomen & Pedes albicantia. Caput ovatum. Rostrum obtuso, Rictu parvo. Mystaces nigrae. Auriculæ nudæ, subrotundæ, ex vellere prominentes. Cauda, albido-pilosa, apice nigro-cinerea. Pedes 4-5 digitis, omnibus unguiculatis. Schreber.*
- sylvaticus. 17. *M. cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido. Faun. svec. 36.*  
*Mus domesticus medius. Raj. quadr. 218.*  
*Habitat in Hortis & sylvis Europæ. Asseres durissimos sæpe uno die perforat.*
- striatus. 18. *M. cauda mediocri subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corporis striis punctatis.*  
*Mus cauda longa, striis corporis longitudinalibus & punctis albis. Mus. Ad. Fr. 10. \**  
*Mus orientalis. Seb. mus. 2. p. 22. t. 21. f. 2.*  
*Habitat in India.*
- longipes. 19. *M. cauda elongata vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis.*  
*Mus cauda longa vestita, pedibus posticis longitudine corporis flavi. Mus. ad. F. 1. p. 9. \**  
*Habitat in torridis regionibus.*  
*Corpus magnitudine M. Musculi, flavum, subtus albicans. Collum vix ullum.*

Jaculus. 20. M. cauda elongata floccosa, palmis subpentadactylis, femoribus longissimis, brachiis brevissimis.

*Mus. Ad. Fr. 2. p. 9. \**

Mus jaculus. pedibus posticis longissimis, cauda extremo villosa. *Hasselq. itin. 198. Act. stockh. 1752. p. 123. t. 4. f. 1.*

Mus ægyptius. *Hasselq. act. ups. 1750. p. 17.*

Mus montanus. *Moncon. ægypt. 288.*

Cuniculus pumilio saliens, cauda longissima. *Act. petrop. 1760. v. 5. p. 351. t. 9. f. 1.*

Cuniculus minor caudatus dauricus. *Mus. petrop. 1. p. 344. n. 123.*

Cuniculus s. Lepus indicus Utias dictus. *Aldr. quadr. 395. fig. bon.*

Lepus cauda elongata. *Syst. nat. 9. n. 4.*

Jerbua. *Shaw. it. 218, 249. Haimy. thes. 124, 125. Edw. av. t. 219.*

Gerbo. *Le Brun. it. 287. t. 210.*

*Habitat in Arabia, Calmukia; Ægypto; plantis tantum incedit, ♂ quiescit; palmis brevissimis cibum ori admovet; longissimos saltus facit.*

*Palmæ subpentadactylæ pollice oblitterato mutico. Plantæ tridactylæ sub medio plantæ verruca conica.*

*Mammæ 8. remotissimæ. Pedes anteriores adeo breves, ut iis non incedat; posteriores longitudine totius corporis, femoribus, ut in Grallis, denudatis.*

Volans. 21. M. cauda elongata villosa, palmis tetradaactylis, plantis pentadactylis, hypochondriis extensis volitans.

*Mus. Ad. Fr. 2. p. 10. \**

Sciurus americanus volans. *Raj. quadr. 215. Seb. mus. 1. p. 72. t. 44. f. 3. Edw. av. 191. t. 191.*

*Habitat in Virginia, Mexico; sub dio quiescit mordacissimus inter pares.*

*Cutis ab auribus ad brachia ♂ femora ♂ caudam extensa margine plicato nigro. Cauda teres. Corpus griseo-fuscum, Sciuro minus. Vibrissæ 5. ordinum. Verruca setis 5 supra canthum oculi anteriorem.*



25. SCIURUS. *Dentes Primores II*: Superiores cuneati ;  
Inferiores compressi.

vulgaris. 1. *S. auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis* *Fn. svec. 37.*

*Sciurus palmis. solis saliens. Syst. nat. 6. p. 9. n. 1.*

*Sciurus Gesn. quadr. 13. Aldr. digit. 328. Jonst. quadr. t. 66.*

*Sciurus vulgaris Raj. quadr. 214.*

*Habitat in Europæ arboribus.*

*Æstate ruber abdomine albo, hyeme cærulescenti-cine-reus. Viſitat nucibus, ſtrobilis, baccis &c. manu cibos ori admovet. Superfluum cibum defodit; propagabili natura; Cortice interdum navigat. Nidus globosus e muscis. Sedens se obumbrat cauda; a Marte præda-tur.*

*Varietas cauda pedibus hypochondriisque albis ad Calix Westrobothniæ non infrequens.*

*Anatome. E. N. C. cent. 10. app. 442.*

niger. 2. *S. niger. Catesb. carol. 2. p. 73. t. 73.*

*Sciurus mexicanus. Hern. mex. 582.*

*Habitat in America meridionali, Mexico.*

cinereus. 3. *S. virginianus cinereus major. Raj. quadr. 215. Catesb. car. 2. p. 74. t. 74. Kalm. itin. 2. p. 409.*

*Sciurus cinereus, auriculis ex albo flavicantibus* *Briss. quadr. 153.*

*Habitat in America septentrionali, ubi Zeam imprimis destruit, ideoque cum præmio occidendus.*

*Magnitudo tripla aut quadrupla Sc. vulgaris.*

flavus. 4. *S. auriculis subrotundis, pedibus pentadactylis, corpore luteo.*

*Sciurus cauda tereti, pilis brevibus, auriculis subrotundis. Amoen. acad. 1. p. 281.*

*Habitat in America; Carthagenæ.*

*Magnitudine dimidio minor Sc. vulgari, luteus, apicibus pilorum albis. Pollex anticus solo fere ungue constat.*

palma-  
rum. 5. *S. subgriseus striis tribus flavicantibus, caudaque albo nigroque lineata.*

Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, lineis in dorso flavicantibus. *Briss. quadr. 156.*

Mustela africana. *Clus. exot. 112. Raj. quadr. 216.*

*Habitat in America, Asia, Africa.*

Cauda disticha, erecta, non obumbrans. Pedes 4-5. Auriculæ rotundæ.

getulus. 6. S. fuscus, striis quatuor albidis longitudinalibus. Sciurus getulus. *Gesn. quadr. 112. Aldr. dig. 406. Jonst. quadr. t. 67. Raj. quadr. 216. Edw. av. 198. t. 198. Seb. mus. 1. p. 76. t. 47. f. 3. Briss. quadr. 157.*

*Habitat in Africa.*

striatus. 7. S. flavus striis quinque fuscis longitudinalibus. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 8. \**

Sciurus minor virgatus. *Aët. petrop. 1760. v. 5. p. 344. t. 9. f. 1.*

Sciurus striatus. *Catesb. carol. 2. p. 75. t. 75. Edw. av. 181. t. 181.*

*Röesselvissla. Kalm. itin. 2. p. 419.*

*Habitat in America septentrionali, Sibiria, sub terra, concamerationibus plurimis distinctis pro singula messe.*

Magnitudine Muris Musculi vel paulo major. Palmæ tetradactylæ, plantæ pentadactylæ. Corpus striis utrinque duabus, præter dorsalem

Glis. 8. S. canus, subtus albidus.

Glis. *Gesn. quadr. 619. Dodart. aët. 3. p. 40. t. 7. Raj. quadr. 229.*

Mus cauda pilosa, corpore supra obscure cinereo, subtus exalbido. *Briss. quadr. 160.*

*Habitat in Europa australi; Visitat glandibus, nucibus, seminibus pomorum; nidificat in cavis arborum pullis 9-12; interdum latet; autumnis pinguescit; octobri gregatim migrat in latebras subterraneas, ibique hybernatur in finem Maji; Pelles venduntur; carnes avide eduntur. D. Scopoli.*

Corpus statura Muris volantis, canum, subtus albidum.

Cauda Sciuri vulgaris valde hirsuta, cana. Genæ albæ. Mystaces longiores ipso capite. Pedes 4-5.



æfluans. 9. *S. griseus*, subtus flaves cens.

*Habitat in Surinamo.*

*Magnitudo Muris volantis. Auriculæ subrotundæ. Pedes 4 - 5. Cauda longitudine corporis.*

volans. 10. *S. hypochondriis prolixis volitans*, cauda rotundata.  
*Faun. svec. 38.*

*Sciurus volans. Seb. mus. 1. p. 67. t. 41. f. 3. Act. angl. 1733. p. 35. t. 1. Catesb. ear. 2. p. 76. ♀ 77. Briss. quadr. 157. n. 12, 13.*

*Mus ponticus s. scythicus. Gesn. quadr. 743.*

*Quadrupes volatile russiæ. Act. petrop. 5. p. 218.*

*Habitat in horealibus Europæ, Asiæ, Americæ. Extensa cute inter brachia & femora volitat, non sursum s. horizontaliter, sed oblique deorsum.*

Sagitta. 11. *S. hypochondriis prolixis volitans*, cauda plano-pin-nata lanceolata.

*Habitat in Java. Nordgren.*

*Tota statura Sciuri vulgaris, palmum longus præter caudam, supra ferrugineo-fuscus, subtus ferrugineo-palidus. Caput ovatum. Auriculæ ovatæ, obtusæ, vestitæ. Mystaces longitudine capitis. Seta una in mala. Labium superius fissum; inferius breve. Dent-tes fusci, obtusiusculi. Pedes 4 - 5. Manuum cal-car setaceus cartilagineus, longitudine ipsius ulnæ intra cutem. Cutis extensa a capite ad carpum; a car-po ad genu in membranam testam, concolorem, ci-liatam. Femora postice ciliata pilis. Pedes subte-stacei: digiti omnes ultimo geniculo supra prominu-li. Ungues compressi. Scrotum ovatum, magnum, vestitum. Præputium elongatum, vestitum. Cauda longitudine corporis, valde depressa & pilis lanceo-lata, obtusa.*

26. NOCTILIO. *Dentes Primores II: Superiores acuti; Inferiores bilobi. Nares prominulæ, cylindricæ, approximatae.*

america- 1. *N. labio inferiore varicoso.*

nus. *Vespertilio leporinus, labio superiore bifido. Syst. nat. 10. p. 32. n. 5. Mus. Ad. Fr. 1. p. 7. \**

Vespertilio, cato similis, americanus. *Seb. mus. 1. p.*  
*89. t. 55. f. 1.*

Vespertilio americanus rufus. *Briss. quadr. 227.*

*Habitat in America, victitans fructibus arborum.*

*Simillimus Vespertilionibus, similiter pedibus alatus,*  
*sed Dentes primores utrinque 2 approximati, abs-*  
*que laniariis, spatio remoti, Labiumque superius*  
*fissum removent. Labium inferius varicosum in*  
*tres lacunas.*



## V. P E C O R A.

*Dentes Primores superiores nulli.*

*Inferiores VI aut VIII, a  
molaribus remotissimi.*

*Pedes ungulati.*

*Mammæ inguinales.*

27. CAMELUS. *Cornua nulla.*

*Dentes Primores inferiores VI,  
spatiformes.*

*Laniarii distantes : supe-  
riores III, inferiores II.*

*Labium superius fissum.*

Drome- 1. C. topho dorsi unico. *Syst. nat. 6. p. 13. n. 1. Briss.  
darius. quadr. 55.*

Camelus unico in dorso gibbo. *Raj. quadr. 143.*

Camelus. *Jonst. quadr. t. 41. Gesn. quadr. 159. ic.  
23. Aldr. bis. 908.*

Dromedarius. *Aldr. bisulc. 909. t. 908. Alpin. ægypt.  
2. p. 223. t. 12.*

*Habitat in Africæ desertis arenosis siticulosis.*

*Callos in pedibus anterioribus 4, in posterioribus 2, in  
sterno 1 gerit. Ventriculus secundus cellulosus pro  
aqua pura diutius asservanda per siticulosa deserta.*

*Onera portat, lente festinat, lassus jacet super pectus.*

*Anatome Aët. petropol.*

baëtria- 2. C. tophis dorsi duobus. *Syst. nat. 6. p. 13. n. 2.  
nus. Briss. quadr. 53.*

Dromedarius. *Jonst. quadr. t. 44. f. 1.*

Camelus. *Gesn. quadr. 151. ic. 22. Aldr. bis. 907.*

*Alp ægypt. 2. p. 223. t. 13.*

*Habitat in Africa.*

*Cursu antecedente celerior, pro magnatibus, rarior.*

*Tophus posterior longe major, alias præcedenti idem.*

- Glama. 3. *C. corpore lævi, topho pectorali.*  
*Camelus pilis brevissimis. Briss. quadr. 56.*  
*Camelus peruvianus Glama dictus. Raj. quadr. 145.*  
*Pelon ichiatl oquitli. Hern. mex. 660.*  
*Habitat in America meridionali. Frigoris impatiens.*  
*Cicuratur, onera portat, fatigata succumbit, obstinata compressis testiculis compellitur; vomitu hostem pellit, sepe Catocho obnoxia.*  
*Corpus absque lana pilis brevibus tectum, Topho solo pectoris, secernente liquorem.*
- Pacos. 4. *C. tophis nullis, corpore lanato.*  
*Camelus peruvianus laniger Pacos dictus. Raj. quadr. 147.*  
*Camelus pilis prolixis toto corpore vestitus. Briss. quadr. 57.*  
*Ovis peruana. Hern. mex. 663. Marcgr. bras. 244.*  
*Ovis chilensis. Jonst. quadr. t. 23.*  
*Habitat in America meridionali.*  
*Totus sanguineus, subtus albus; Pedes didactyli. Prior minime, hic maxime lanatus lana præstanti, nec oneribus portandis par.*

## 28. MOSCHUS. Cornua nulla.

*Dentes Laniarii superiores solitarii exserti.*

- moschiferus. 1. *M. folliculo umbilicali.*  
*Animal moschiferum. Raj. quadr. 124. Calceol. mus. 661. t. 666, Act. petrop. 1758. v. 4. p. 393.*  
*Capreolus moschi. Gesn. quadr. 695.*  
*Capra moschus. Aldr. bisulc. 743. Jonst. quadr. 55. t. 39.*  
*Moschus. Schröck. monogr. t. 44. Brun. it. 121. t. 121.*  
*Habitat in Tartaria versus Chinam.*  
*Moschus substantia unctuosâ ambrosiaca e folliculo prope umbilicum. Feminae mammae 2. Cauda manifesta nulla.*  
*Schrockii Historia Moschi. Wien. 1682. quart.*

2. M.

*Pecoribus ventriculi 4: Rumen, Reticulum, Omasum, Abomasum; ideoque Ruminantia phytiphaga & Sebifera; ungulata etiam sunt, uti Sues ungulibus calceiformibus propriis, geminis, præter posticas 2 succenturiatas.*



Grimmia. 2. *M. capite fasciculo tophoso.*

*Capra capite fasciculo tophoso, cavitate infra oculum.*  
*Syst. nat. 10. p. 70.*

*Capra sylvestris Africana grimmii. Raj. quadr. 83.*  
*Habitat in Africa.*

*Cornua huic nulla nota, ideo referenda ad Moschum.*  
*Briss. 97.*

Pygmæus. 3. *M. pedibus humano digito angustioribus.*

*Capra cornibus teretibus conicis obtusis curvis, la-*  
*re anteriore rugoso. Syst. nat. 10. p. 69.*

*Capra pedibus digito humano angustioribus. Syst. nat.*  
*prior.*

*Cervus pusillus guineensis. Seb. mus. 1. p. 10. t. 44.*  
*f. 1, 2, 3.*

*Habitat in Asia, Guinea.*

*Cornua, quæ pro hujus venditantur, si erronea, for-*  
*species Moschi erit secundum Brissonum.*

29. CERVUS. *Cornua solida, tenera, corio hirtu-*  
*tecta apiceque crescentia*  
*denudata, annua.*

*Dentes Primores inferiores VIII*  
*Laniarii nulli (interdum*  
*solitarii superius.)*

Camelo- 1. *C. cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis*  
*pardalis. Camelo-pardalis. Bellon. itin. 119. Aldr. bisulda*

*927. t. 931. Raj. quadr. 90. Hasselqv. act. upp.*  
*1750. p. 15. itin. 203.*

*Giraffa Briss. quadr. 61.*

*Habitat in Æthiopia & Sennar. Pronus cubat moris*  
*Cameli; Gramen depascitur divaricatis pedibus anti-*  
*cis, sed arborum imprimis vescitur foliis.*

*Animal etiamnum obscurum, adpersum maculis albis,*  
*ut Cervi juniores.*

Alces. 2. *C. cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali*  
*Fn. svec. 39.*

Alce.

*Ægagropila his frequens a pilis deglutitis. Horum dentata dentibus la-*  
*niariis carent cornibus, & cornuta carent laniariis, at mihi cranium Ca-*  
*preoli corruptum cum laniariis.*

Alce. Gesn. quadr. 1, 3, 4. Aldr. bisulc. 836. Jonst. quadr. t. 30. Bonann. mus. t. 295. Olear. mus. t. 9. f. 2. Raj. quadr. 86.

Habitat in borealibus Europæ, Americæ, Asiæque Populetis.

Ungula ferit; 50 milliaria de die percurrit; corium globum plumbeum fere eludit.

Leopold J. F. Dissert. de Alce. Basel. 1700. 4.

laphus. 3. Cornibus ramosis totis teretibus recurvatis. Faun. svec. 40.

Cervus. Gesn. quadr. 1, 3, 4. Aldr. bisulc. 744. Jonst. quadr. t. 31. Raj. quadr. 84.

Habitat in Europa, Asia.

Ætas Bovis tantum; fabula est longævitatæ Cervi, Cystide fellea caret Cervi genus.

Anatome. E. N. C. cent. 10. app. 448.

Graba Eleographia. Jen. 1668. 8. Agricola J. G. Cervi natura. Amberg. 1617. 4.

aran- 4. C. cornibus ramosis recurvatis teretibus: summitatibus  
dus. palmatis. Faun. svec. 41. Amoen. acad. 4. p. 144.  
t. . \*\*\*

Rangifer. Gesn. quadr. 141. Olear. mus. 16. t. 10. f. 3. Raj. quadr. 88.

Tarandus. Aldr. bisulc. 859. t. 861.

Capra groenlandica. Raj. quadr. 90. Edw. av. 1. t. 51.

Habitat in Alpibus Europæ, Asiæ, Americæ, maxime septentrionalibus; victitat Lichene rangiferino. Uterque sexus cornutus est, ut in Camelopardale, ramo infimo etiam palmato; castratus quotannis cornua deponit. Culex pipiens, Oestrus Tarandi, Tabanus Tarandi ad alpes cogunt, crepitantibus ungulis. Pecora Lapponum caseosa ruminantia absque domo. Ætas XVI annorum; Cervi longævitas itaque falsa.

Corpus magnitudine Dammæ, fusco-canescens, at album subtus, uti cauda ♂ perineum. Pili in corpore maxime approximati. Mammæ 6, quarum duæ possicæ spuria.

Anatome. Bartholin. act. 1671. n. 135.

ama. 5. C. cornibus ramosis recurvatis compressis: summitate palmata. Fn. svec. 42.

Dama

Cervi pedibus anterioribus calcitrant; sylvis delectantur.



Dama. *Bell. itin.* 57. *Gesn. quadr.* 84. *Aldr. bisulc.* 741. *Jonst. quadr.* 82.

Cervus platyceros. *Raj. quadr.* 85.

*Habitat in Europa.*

*Arcetur filo horizontali. It. gotl.* 335.

Capreolus. 6. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifidis. *Fn. svec.* 43.

Capra, Capreolus, Dorcas, *Gesn. quadr.* 64. *Jonst. quadr.* 33. t. 33.

Capra plinii, Capreolus. *Aldr. bisulc.* 738. *Raj. quadr.* 89.

*Habitat in Europa, Asia.*

*Confr. Mazame. Hernand. mex.* 324. *Cuguacu - es.*

*Marcgr. bras.* 235.

guineensis. 7. C. griseus subtus nigricans. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 1. *Habitat in Guinea.*

*Cornua non vidi, tamen hujus generis videtur habitu.*

30. CAPRA. Cornua concava, sursum versa, emissa scabra.

*Dentes Primores inferiores VIII.*

*Laniarii nulli.*

Hircus. 1. C. cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Faun. svec.* 44.

Capra *Gesn. quadr.* 242. *Aldr. bisulc.* 635. *Jonst. quadr.* 47. *Raj. quadr.* 77.

β. Capra Angorensis. *Tournef. it.* 2. p. 185. t. 1. *Briss. quadr.* 64. *Hasselq. iter.* 206. *Olear. m.* t. 10. f. 2.

*Habitat in Oriente in montosis Hircus & Capra comestibiles. Hedo, visitans ramulis variis frondibusque arborum, Lichenibus; hospitatur in Europa.*

*Pecus insiduum, bellicosum, saliens, salax, hircum olenum decorticans; corio tenaci indutum, lana caprina testudinis arunco barbata, caseosum; Pedum castratio singularis. Edit etiam Cicutam.*

C. Ant.

Angorensia animalia: Capra, Ovis, Felis, Lepus, cur lanata pilis magis grioribus, tenerioribus, mollioribus?

*C. Angorensis* Lana ad pedes usque dependet nivea, sericum provocante camelina dicta. Cornua torta, ad latera protracta, ut *Oves hispanicae*. Auriculæ planæ lanceolatae declinatae, nec erectæ canaliculatae.

Ibex. 2. *C. cornibus supra nodosis in dorsum reclinatis; gula barbata.*

Ibex. *Gesn. quadr. 331. t. 1099. Aldr. bisulc. 732. Jonst. quadr. t. 28. Olear. mus. t. 10. f. 1. Raj. quadr. 77. Wagn. helv. 176.*

*Hircus ferus. Bell. obs. 20.*

*Habitat in Wallefiæ præruptis inaccessis; in Creta. Cornibus vastis reclinatis, corpore fulvo, arunco nigro.*

mambri- 3. *C. cornibus reclinatis, auribus pendulis, gula barbata.*  
ca. *Capra mambriana f. syriaca. Gesn. quadr. 153. Alp. ægypt. 229. Raj. quadr. 81. Rujel. alepp. 52. t. 52. bona.*

*Habitat in India.*

*Cornua vix collo longiora.*

Rupi- 4. *C. cornibus erectis uncinatis.*

capra. *Rupicapra. Bell. itin. 57. 126. Olear. mus. t. 9. f. 3. Gesn. quadr. 140. Aldr. bisulc. 727. Dodart. act. 225. Scheuchz. alp. 155. Wagn. helv. 183. Raj. quadr. 78.*

*Habitat in alpibus Helveticis summis inaccessis.*

*Corpus rufo-fuscum, sed album fronte, vertice, gula, auribus intus. Cauda etiam subtus nigricans. Labium superius subfissum.*

*Ægagropila hujus a radice Athamantæ Mei. Kram. austr. 320.*

depressa. 5. *C. cornibus depressis incurvis minimis cranio incumbentibus, gula barbata.*

*Habitat in America.*

*Magnitudo hædi Hirci. Pili longi, penduli. Cornua lunata, crassa, vix digitum longa, cranio adpressa, ut fere cutem perforent.*

reversa. 6. *C. cornibus erectis apice recurvis.*

*Habitat in America.*

Magni-

---

*Capræ cornibus digladiant, montosa amant.*



Magnitudo hœdi *Hirci* unius anni. Pili breves, cervini. Cornua vix digitum longa, antrorsum recurvata apice. Hæc cum præcedenti coibat & pullum non diu superslitem in vivario Cliffortiano producebat. Facies utriusque adeo aliena, ut vix speciem eandem, sed diversissimam, argueret.

Gazella. 7. *C. cornibus teretibus rectissimis longissimis: basi annulatis.* *Syst. nat.* 6. p. 14. n. 8. *Houtt. nat.* 3. p. 197. t. 24. f. 1. *Briss. quadr.* 67.

*Gazella indica*, cornibus rectis longissimis nigris, prope caput tantum annulatis. *Raj. quadr.* 79.

*Gazella. Alp. ægypt.* 232. t. 14. f. 1.

*Elan. Kolb. cap.* 3. p. 32. f. 34.

*Habitat in India.*

Cervica- 8. *C. cornibus teretibus dimidiato-annulatis flexuosis contortis.* *Syst. nat.* 6. p. 14. n. 7. *Houtt. nat.* 3. p. 206. t. 24. f. 2. *Briss. quadr.* 68. n. 8.

*Gazella. Dodart. act.* 3. p. 1. p. 95. t. 11. bona.

*Strepsiceros. Gesn. quadr.* 323. *Aldr. bisulc.* 740.

*Jonst. quadr.* t. 24. *Raj. quadr.* 79.

*Habitat in India.*

*Pili circum cornua longiores.*

bezoarti- 9. *C. cornibus teretibus arcuatis totis annulatis, gula ca.* barbata.

*Hircus cornibus teretibus arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis.* *Briss. quadr.* 69. n. 10.

*Hircus bezoarticus. Aldr. bisulc.* 756. *Raj. quadr.* 80.

*Capri-Cerva. Kämpf. amoen.* 398. t. 407. f. 2.

*Habitat in Persia. Profert sæpe in ventriculo abomasso Bezoar orientale.*

Dorcas. 10. *C. cornibus teretibus perfectè annulatis recurvatis contortis.* *Syst. nat.* 6. p. 14. n. 9. *Houtt. nat.* 3. p. 213. t. 24. f. 3.

*Gazella africana*, cornibus brevioribus, ab imo ad summum fere annulatis, & circa medium inflexis.

*Raj. quadr.* 80.

*Algazel ex Africa. Hern. mex.* 893.

*Habitat. in Africa, Mexico.*

*Cornua e fronte inter oculos, apice arcuata.*

tatarica. 11. *C. cornibus teretibus rectiusculis perfecte annulatis apice diaphanis, gula imberbi.*

*Ibex imberbis. Act. petrop. 5. p. 345. ♂ 7. p. 39. t. 19.*

*Habitat in summa Asia.*

*Femina incornis.*

Ammon. 12. *C. cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palearibus laxis pilosis, gula imberbi.*

*Rupicapra cornibus arietis. Act. petrop. 1758. v. 4. p. 388. t. 8. f. 2, 3.*

*Capra Ammon. Gmel. it. 368.*

*Tragelaphus & Musimon. Gesn. quadr. 155. Bell. it. 57.*

*Habitat in Sibiria. Gmelin.*

*Corpus statura ♂ magnitudine Arietis, pilis fulvis longioribus. Albida sunt cornua, os, abdomen, sub cauda; Nigra sunt cauda, nares. Collum & thorax barbata. Briss. 71.*

31. **OVIS.** *Cornua concava, retrorsum versa, intorta, rugosa.*

*Dentes Primores inferiores VIII.*

*Laniarii nulli.*

Aries. 1. *O. cornibus compressis lunatis. Fn. svec. 45, Amœn. acad. 4. p. 269. \* \* \**

*Ovis Gesn. quadr. 138. Aldr. bisulc. 370. Jonst. quadr. t. 22. f. 1. 2, 3. Raj. quadr. 73.*

*rustica. α. cornuta.*

*anglica. β. mutica, cauda serotoque ad genua usque pendulis.*

*hispanica. γ. cornuta cornuum spira extrorsum tracta.*

*polycerat. δ. Polycerata e gotlandia 248. Aldr. bisulc. 397.*

*africana. ε. africana Raj. 75. prolana pilis brevibus hirta.*

*laticaudata. ζ. arabica platyura. Ruff. alepp. 51. t. 52.*

*Habitat in siccis apricis calidis Africæ; hospitatur in Europa. Ovis cum Ariete, Vervece, Agnoque edit imprimis Festucam ovinam, in arvis Bursam pastoris, leditur a Pruno spinosa, Equiseto, Flammula, Antherico, Kalmia, Myosotide aquatica, Anemone nemorosa. Parum bibit; ab aqua stagnante Fasciola hepatica,*

G



tica, præcavetur muria; mutat ætate dentes; feræ Lanam; lætificat pascua; timida minatur hostem calcando mingendoque; pellit arietando. Mas unus sufficit 20 feminis, gravidis 150 diebus. Opilio perapedoque instructus & cane, e caula minus clausa educit balantes greges in campos siticulosos, apricos. Infestatur Hippobosca ovina, Pediculo ovis, Oestro ovis, Acaro Ricino; Laborat Vertigine, Hydrope, Phthisi, Ictero, Hepatitide.

guineen- 2. O. auribus pendulis, palearibus laxis pilosis, occipite prominente.

Aries guineensis s. angolensis. Marcgr. brass. 234. Raj. quadr. 57.

Habitat in Guinea.

Cornua parva, deorsum usque ad oculos torta. Juba sub collo pendula. Pili breves, hircini.

Strepsiceros. 3. O. cornibus rectis carinatis flexuoso-spiralibus. Strepsiceros cretensis. Bellon. itin. 20. Gesn. ic. 37.

Aldr. bisulc. 407. Raj. quadr. 75.

Ovis africana. Houtt. nat. 3. p. 267. t. 267.

Ovis cretensis. Jonst. quadr. t. 45.

Hircus laniger, cornibus teretibus erectis, ab imo ad summum spiraliter intortis. Briss. quadr. 45.

Habitat in Ida monte, in Hungaria colitur.

32. BOS. Cornua concava, antrorsum versa, lunata, levia.

Dentes Primores inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Taurus. 1. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis. Fn. svec. 46.

α. Bos. Gesn. quadr. 25. Aldr. biscul. 13. t. 36. Jonst. quadr. t. 14. Raj. quadr. 70.

β. Urus. Cæsar. bell. gall. VI. c. 5.

Habitat in Poloniæ depressis graminosis ferus Urus; hospitatur ubique.

Mugiens boansque Bos: Tauro, Vacca, Vitulo, homini utilissimus pro agris lætificandis, colendis sub jugo;

Boves cornu feriunt, pascua depressa amant.

go ; pollet carne , lacte , caseo , butyro , sebo , corio ;  
 infestatur Oestris bovis , Tabanis , Conope calcitrante ,  
 Pediculis ; læditur a Cicuta , Aconito , Anemone.  
*Vitulus tendinosus brevioris ævi singularis.*

Bonafus. 2. *B. cornibus in se flexis , juba longissima.*

Bonafus. *Gesn. quadr. 145. Aldr. bisulc. 361. Jonst. quadr. t. 18. f. 1. Raj. quadr. 71.*

*Habitat in Africa , Asia.*

*Defendit se stercore , ad aliquot passus dejecto , combu-  
 rente.*

Bison. 3. *B. cornibus divaricatis , juba longissima , dorso gibbofo.*

Bison. *Raj. quadr. 71. Gesn. quadr. 296. Jonst. quadr. t. 17. f. 2.*

*β. Bison. americanus. Catesb. carol. 3. p. 20.*

*Taurus mexicanus. Hern. mex. 587. Gesn. quadr. 301.*

*Habitat in Mexico , Florida.*

*Collum & Pectus undique urfi instar hirsuta.*

grunni- 4. *B. cornibus teretibus extrorsum curvatis , vellere pro-  
 ens. pendente , cauda undique jubata.*

*Vacca villosa. Brun. it. 120. t. 120.*

*Vacca grunniens villosa , cauda equina. Act. petrop. 176. v. 5. p. 339. t. 7.*

*Habitat in Asia boreali.*

*Corpus hirci instar totum hirtum pilis ad genua usque  
 propendentibus , nigrum , at album fronte , spina dor-  
 si , cauda , pedibus posterioribus.*

Bubalis. 5. *B. cornibus resupinatis intortis antice planis.*

Bubalus. *Raj. quadr. 72. Gesn. quadr. 58. Aldr. bisulc. l. 1. c. 6.*

*Habitat in Asia , cultus in Italia.*

*Lana duriuscula in dorso , ceterum pili vari. Regitur.  
 annulo narium , trahit currus ; oryxam colit ; caseum  
 di cavallo præbet.*

Indicus. 6. *B. cornibus aure brevioribus , dorso gibbo , juba nulla.*

Bubalus parvus indicus *Edw. av. 200. t. 200.*

*β. Bubalus africanus. Bell. it. 119. Gesn. quadr. 33.*

*Aldr. bisulc. 364. Jonst. quadr. t. 18.*

*Habitat in China.*

*Varietas β videtur eadem species.*



## VI. B E L L U Æ.

*Dentes Primores obtusè truncati.**Pedes ungulati.*33. EQVUS. *Dentes Primores Superiores VI. erecto-parallel.**Inferiores VI prominentiores.**Laniarii solitarii, inclusi, utrinque remoti.**Pedes ungulâ indivisa.**Caballus. 1. E. cauda undique setosa. Fn. svec. 47.**Equus. Gesn. quadr. 132. Aldr. ungv. 12. Jonst. quadr.**1. 1. 1, 2, 3, 4. Raj. quadr. 62.**Habitat in Europa & Oriente; hospitatur extra Tropicos.*

*Animal generosum, superbum, fortissimum in currendo, portando, trahendo aptissimum equitando, cursu furens; sylvis delectatur; posteriora curat; cauda Conopes Tabanosque abigit; alterum scalpit; pullum injuriæ obnoxium reponit; hinnitu socium vocat: dormit post noctem; calcitrando pugnat; sudans se volutat; vegetabilia edit Bove propius, semina disseminat; stercus incalescit; cystide fellea caret; non vomit; Equuleus Hippomane natus pedibus elongatis, leditur globulo auris, acicula pedis, nasi capistro; dentibus sebo illitis, Padi herba, Phellandrii, Curculione, Conope irritante. Laborat hernia mediastini polypo cordis, orthopnoea, Oestro Bovis, nasali, hæmorrhoidali, scabie, tartaroque pedum, Bubone colli; Hippocomia instruitur. Edit impune Aconitum. Utero gerit 290 diebus, placenta non fixa. Laniarios dentes quinto anno acquirit.*

*Asinus. 2. E. cauda extremine setosa, cruce nigra supra humeros. Faun. svec. 1. n. 35.*

Asi-

*Equi pedibus posticis calcitrant; mares magnas non habent.*

*Asinus*. Gesn. quadr. 40. Aldr. ungv. 295. Jonst. quadr. 12. t. 6. Raj. quadr. 63.

*Onager*. Raj. quadr. 63. *sylvestris* est.

β. *Mulus*. Raj. quadr. 64. ab *Equa* ♂ *Asino* ; *sterilis*.

γ. *Hinnus*. Raj. quadr. 64. ab *Asina* ♂ *Equo* ; *sterilis*.

*Habitat* in oriente , *frigoris impatiens*. *Vicitat spinis* ; *tardus* , *stupidus* , *rudens* , *libidinosus*. *Auriculæ magnæ* , *flaccidæ*. *Juba brevis*. *Color cinereus linea dorsali nigra ut* ♂ *transversali scapularum*.

*Zebra*. 3. *E. fasciis fuscis versicolor*.

*Zebra*. Edw. av. t. 222. 223. Raj. quadr. 69. Jonst. quadr. t. 5. f. 1. Aldr. quadr. l. 1. c. 8.

*Habitat* in India , Africa.

*Color albidus seu refuscens fasciis nigris digitos tres latis per totum corpus transversis*. *Cauda Asini*. *Auriculæ erectæ*. *Juba colli brevis* , *fastigiata*.

34. HIPPOPOTAMUS. *Dentes Primores superiores VI* , *per paria remoti*.

*Inferiores IV* , *prominentes* : *intermediis longioribus*.

*Laniarii solitarii* , *oblique truncati*.

*Pedes margine ungviculati*.

amphibius. i. *H. pedibus quadrilobis*. Syst. nat. 10. p. 74. Houtt. nat. 3. p. 405. t. 28.

*Hippopotamus*. Bell. aquat. 28. t. 30. Aldr. digit. 183, 184. Grew. mus. t. 1. f. 5. Alp. ægypt. 245. t. 22, 23, 24, 25. Matthiol. diosc. 2. c. 22. Raj. quadr. 123. Jonst. quadr. t. 49. Column. aquat. 28. t. 30. Briss. quadr. 122.

*Habitat* in Nilo ♂ *Bambolo* *Africæ* ♂ *ad ostia fluviorum Asiæ* , *amphibius* , *obambulans sub aqua* , *ut sola sensus organa eminent* ; *Nares* , *Oculi* , *Aures* ; *pabulatur non natans* , *tam in fundo* , *quam nocte*



in sicco ; Oryzæ & Colocasie damnum infert ; Lupino occiditur ; humiles aggeres non transcendit ; Behemoth. Jobi. Crocodili hostis.

Corpus Suis , nudum præter vibrissas , magnitudine Elephantis. Mandibula superior mobilis ; dentes duritie scintillantes. Pedes tetradactyli ungulati. Mammæ 2 inguinales.

35. SUS. Dentes Primores Superiores IV , convergentes.

Inferiores VI prominentes.

Laniarii Superiores II breviores. Inferiores I exserti.

Rostrum truncatum , prominens , mobile.

Scrofa. 1. S. dorso antice setoso , cauda pilosa. Fn. svec. 21. Amoen. acad. 5. p. 461.\*\*\*

Aper. Gesn. quadr. 146. Aldr. biscul. 1013. Jonst. quadr. 74. Raj. quadr. 96.

β. Sus. Gesn. quadr. 872. Aldr. biscul. 937. Jonst. quadr. t. 47. Raj. quadr. 92.

γ. Sus chinensis. It. wgoth. 62. It. scan. 72.

Habitat in Europa australiore , hospitatur ubique.

Aper vix differt a Sue domestico , nisi quod nigro-canescentem lanam inter setas non habeat , quodque auriculæ sint subrotundæ.

Chinensis dorso subnudo , abdomine ad terram usque dependente , differt , mundum magis animal.

Varietas frequens Upsaliæ Suis domestici semper monunguli , in ceteris eadem species.

Animal odore pollens , naribus fodiens terram ; tendinibus truncandis ; quisquillas , stercus , succulenta , radices variaque spurcata vorans ; multa seligens ; pinguisimum , stupidum , somnolentum , tempestatum prænuncium & impatiens ; apricatur in sole , in cæno se volutat , immundum grunniens , accurrit clamanti affini adversus hostem spumante ore dentibusque immane , Crotalis infestum ; tardum venere : pene laxo longo ; mammis numerosissimis 10 , prole innumera ;

Sues fodiunt naribus , orbiculo tendinibus affixo , e radicesque vellunt .

mera ; laborat pediculis , scabie , scrophulis ; pipere occiditur. Ganæe numerosa materies , Athletis & exercitatis salubris , non vero cinchonæ criticis ; saccharo s. ficu imprimis altilis laudatur : inde Laridum , Pernæ , Sincipitia , Trunculi , Costæ , Sumina , Vulvæ , Isicia , Botuli , Tomacula , Juscula ; at stercus in fluxu sanguineo valet.

Porcus. 2. S. dorso postice setoso , cauda longitudine pedum , umbilico cystifero.

Porcus guineensis. Marcgr. bras. 230. Jonst. quadr. 46. Raj. quadr. 96.

Habitat in Africa.

Affinis priori. Corpus rufum. Auriculæ. acuminatissimæ. Cauda nuda , ad talos usque propendens. Vellus setis caret , nisi supra clunes.

Tajacu. 3. S. dorso cystifero , cauda nulla.

Sus umbilicum in dorso habens. Aldr. bisul. 939.

Porcus americanus. Seb. mus. I. t. III. f. 4.

Tajacu. Pis. ind. 98.

Tajacu s. Aper mexicanus moschiferus. Tyson. act. n. 153. Raj. quadr. 97.

Caaigoara. Marcgr. bras. 229. Barth. cent. 3. n. 44.

Quavhtla coymatl , Quapizotl. Hern. mex. 637. t. 637.

Habitat in Mexici , Panammæ , Brasiliæ montibus , sylvis ; edit Ranas , Serpentes.

Corpus cinereum ; fascia flava circum humeros ; crux nigra supra nasum. Pedes nigri : macula alba supra genua antica. Sætæ rigidulæ in toto corpore : fastigiatae nigrae inter breves aures , nec in dorso. Protuberantia ad latera oris & supra nasum. Glandula secretoria supra clunes , secernens odoratum liquorem ingratum ambrosiacum. D. Z. Hallman. Dentes primores superiores 4 ; inferiores 6.

Hydrochæris. 4. S. plantis tridactylis , cauda nulla.

Capybara. Marcgr. bras. 230. Raj. quadr. 126. an. 2. ( pullum tantum vidi. )

Habitat in Surinamo.

Corpus rufum , setis apice nigris. Aures obtusæ , non parvæ. Folliculus excretorius pone , sed juxta umbilicum , & Porus excretorius supra clunes. Pedes postici ungula succenturiata tantum unica s. interiore , deficiente exteriori.



Babyrus- 5. S. dentibus duobus caninis fronti innatis.

fa.

Babyroussa. Bont. jav. 61. Barthol. cent. 2. obs. 96.

Grew. mus. t. 1. Seb. mus. 1. p. 80. t. 50. f. 2. Raj. quadr. 96.

Habitat in Borneo Indiæ orientalis.

Magnitudine Cervi. Dentes Laniarii superiores II, perforantes cranium frontis, recurvati, ut 2 cornua; inferiores utrinque solitarii, magni, adstant prioribus, minus recurvi. Primores superiores 4; inferiores 6. Molares 5.

36. RHINOCEROS. Dentes Primores utrinque II, remotissimi, obtusi.

Cornu solidum, conicum, naso infidens.

unicor-  
nis.

I. RHINOCEROS. Gesn. quadr. 842. Aldr. bisul. 878. Jonst. quadr. 98. t. 38. Bont. jav. 50. 51. Bergen. orat. 1746. t. 1. Raj. quadr. 122. Edw. av. t. 221. f. 2.

bicornis, β. R. cornibus duobus. Syst. nat. 10. p. 56. n. 2.

Habitat in Africa, India victitans, vepretibus, spinis, in cæno se volutans, mitis nisi laceffetur, irritatus cum fragore arbores prosternit, lambendo trucidat.

Quantus erat cornu cui pila Taurus erat. Martialis. Statura & magnitudo Elephantis, sed pedibus brevioribus. Cutis nuda pilis, nisi cauda & auriculis, Staturæ s. Rugæ transversales: α. Capitis postica; β. Scapularis; γ. Abdominalis ante femora; δ. Femoralis trans femora; Ungulæ tres. Cauda attenuata, pedibus brevior.

## VII. CETE.

*Spiracula supra Caput.*

*Pinnæ Pectorales caudalisque horizontalis  
absque unguibus.*

37. MONODON. *Dentes* duo in maxilla superiore  
exserti, prælongi, recti, spi-  
rales.

*Fistula* in vertice.

Mono- 1. MONODON. *Art. gen.* 78. *syn.* 108. *Fn. svec.* 48.  
ceros. Monoceros piscis. *Will. icht.* 42. *Raj. pisc.* 11.  
Unicornu marinum. *Tulp. obs.* 375. *Worm. mus.*  
283. t. 284.

*Habitat* in Oceano septentrionali Americæ, Europæ.

*Cornu Monocerotis spirale hujus Dens est: dentes tales  
2 in junioribus, labium superius perforantes, Pinnæ  
2: dorsalis nulla.*

38. BALÆNA. *Dentium* loco in maxilla superiore  
laminæ corneæ.

*Fistula* duplex.

Mystice- 1. B. naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni.  
tus, *Art. gen.* 76. *syn.* 106. *Faun. svec.* 49. *Mus. Ad.*  
*Fr. 1. p.* 51.

Balæna dorso impinni, fistula in medio capite, dorso  
caudam versus carinato. *Gron. zooph.* 139.

Balæna bipinnis, dorso lævi nigricante, ventre albo.  
*Briss. cet.* 347.

Balæna. *Will. icht.* 35.

Balæna vulgo f. Musculus. *Rond. pisc.* 475.

Balæna vulgo f. Mysticetus aristotelis. *Gesn. pisc.* 114.

Balæna vulgaris edentula, dorso non pinnato. *Raj.*  
*pisc.* 6.



*Balæna spitzbergenfis.* *Mart. spitzb.* 98. t. Q. f. a. b.  
*Habitat in Oceano Groenlandico.*

*Maximus omnium animalium : sæpe 100 pedum ; vi-*  
*litat Medusis.* Caput grande, maxilla inferiore  
 multo latiore. Dorsum impinne, adiposa nulla.  
 Fistula nulla, sed 2 foramina flexuosa. Aures in-  
 fra oculos. Mammæ 2 abdominales ante vulvam.  
 Maxillofi Dentes flexiles fissilesque usuales. Pin-  
 guedo copiosissima, ut ex unico sæpe oneretur navis.

**Physalus.** 2. *B.* fistula duplici in medio capite, dorso extremo  
 pinna adiposa. *Art. gen.* 77. *syn.* 107. *Fn. svec.* 50.

*Balæna tripinnis*, ventre lævi. *Briss. cet.* 352.

*Balæna edentula*, corpore strictiore, dorso pinnato.  
*Raj. pisc.* 9.

*Physalis bellua* s. *Physeter.* *Gesn. pisc.* 723.

*Physeter.* *Rond. pisc.* 485. *Will. icht.* 41.

*Finfisch.* *Martens. spitzb.* 125. t. Q. f. c.

*Habitat in Oceano Europæo, Americano ; vescitur*  
*Clupeis, Scombris.*

**Boops.** 3. *B.* fistula duplici in rostro, dorso extremo protube-  
 rantia cornea. *Art. gen.* 77. *syn.* 107.

*Balæna tripinnis*, ventre rugoso, rostro acuto. *Briss.*  
*cet.* 355.

*Balæna tripinnis* nares habens cum rostro acuto & pli-  
 cis in ventre. *Raj. pisc.* 16.

*Habitat in Oceano septentrionali.*

*Abdomen rugis longitudinalibus.*

**Muscu-** 4. *B.* fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo  
**lus.** latiore. *Art. gen.* 78. *syn.* 107. *spec.* 106. †

*Balæna tripinnis*, ventre rugoso, rostro rotundo. *Briss.*  
*cet.* 353.

*Balæna tripinnis*, maxillam inferiorem rotundam &  
 superiore multo latiore habens. *Raj. pisc.* 17.

*Habitat in mari Scotico ; vescitur Clupeis.*

*Abdomen rugis plurimis.* Dorsum pinna adiposa.

39. PHYSETER. *Dentes* in maxilla inferiore.  
*Fistula* in capite s. fronte.

Catodon. 1. P. dorso impinni, fistula in rostro.

Catodon fistula in rostro. *Art. gen.* 78. *syn.* 108.

Cetus bipinnis, fistula in rostro. *Briss. cet.* 361.

Balæna minor in inferiore maxilla tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso. *Raj. pisc.* 15.

*Habitat in Oceano septentrionali.*

macrocephalus. 2. P. dorso impinni, fistula in cervice.

Catodon fistula in cervice. *Art. gen.* 78. *syn.* 108.

*Faun. suec.* 53.

Cetus bipinnis supra niger, infra albicans, fistula in cervice, dorso lævi. *Briss. cet.* 357.

Cete. *Clus. exot.* 131.

Cete Clusio descriptum. *Will. icht.* 41.

Balæna major in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala bipinnis. *Raj. pisc.* 15. 11.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Longitudo sæpe sexaginta pedum. Dentes 45. inferioris maxillæ.*

*Sperma Ceti e ventriculis cerebri,*

microps. 3. P. dorso pinna longa, maxilla superiore longiore  
*Art. gen.* 74. *syn.* 104.

Cetus tripinnis, dentibus acutis arcuatis falciformibus.  
*Briss. cet.* 363.

Balæna major inferiore tantum maxilla dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam s. spinam in dorso habens. *Raj. pisc.* 15.

*Habitat in Oceano septentrionali, exagitat sæpe Phocænas usque in ipsam terram.*

*Fistula supra rostrum medium. Pinna dorsi longa acuta.*

Tursio. 4. P. dorsi pinna altissima, apice dentium plano. *Art. gen.* 74. *syn.* 104.

Balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos & in planum desinentes. *Raj. pisc.* 16.

Cetus tripinnis, dentibus in planum desinentibus. *Briss. cet.* 364.

*Habitat in Oceano septentrionali.*



40. DELPHINUS. *Dentes in maxilla utraque.*  
*Fistula in capite.*

Phocæ. 1. *D. corpore subconiformi, dorso lato, rostro subob-*  
*na. tuso. Art. gen. 75. syn. 104. Faun. svec. 51.*

*Phocæna f. Turfio. Bell. pisc. 16. Gesn. pisc. 711.*

*Phocæna. Rond. pisc. 473. Will. icht. 31. Raj.*  
*pisc. 13.*

*Nisen. Gunner. act. nidros. 2. p. 258. t. 4.*

*Habitat in Oceano Europæo & mari Balthico.*

*Corpus supra nigro-cærulescens; subtus album. Ca-*  
*put obtusiusculum. Foraminulum pone oculos. Spi-*  
*raculum lunatum, sinu antrorsum verso, inter oculos.*  
*Dentes utrinque 46. Foramen penis lineare pone*  
*umbilicum s. sub pinna dorsali. Foramen ani medio*  
*loco inter penem & caudam pinnatam.*

Delphis. 2. *D. corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto.*  
*Art. gen. 76. syn. 105.*

*Delphinus. Bell. pisc. 9. Rond. pisc. 459.*

*Delphinus antiquorum. Raj. pisc. 12. Will. pisc. 28.*

*Habitat in Oceano Europæo, adhærens sæpe Balænis,*  
*ut exsiliant. Ström. 309.*

*Rostrum supra cinctum fascia lata transversa. Dentes*  
*subulati.*

Orca. 3. *D. rostro sursum repando, dentibus latis ferratis.*  
*Art. gen. 76. syn. 106. Fn. svec. 52.*

*Orca. Bell. pisc. 18. Rond. pisc. 483. Gesn. pisc.*  
*635. Will. icht. 40.*

*Balæna minor, utraque maxilla dentata. Raj. pisc. 15.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Maxilla inferior multo major. Dentes obtusi.*

CLAS

C L A S S I S II.

AVES.

*Ipsi lætitia voces ad sidera mittunt  
Intonsi montes, ipsæ jam carmina rupes,  
Ipsa sonant arbusæ.*

VIRGIL. ecl. V. 62.

**AERÆ** vocales Volucres pulcherrimæ, *Mandibulis protractis nudis, Corpore pennis imbricato, Alis duabus pennatis volitantes bipedes* dignoscuntur.

**AVES** levissimæ modici ponderis & magnitudinis, *tectæ pennis plumisque, destitutæ Auriculis, Labiis, Cauda, Scroto, Dentibus, Utero, Epiglottide, Fornice, Corpore calloso, Diaphragmate.*

**PENNÆ** avibus propriæ imbricatim in quincuncem dispositæ, interstinctæ *Plumis*, distinctæ a *Remigibus Rectricibusque*, omnes supra convexæ, subtus concavæ: latere exteriori angustiores; interiore latiores; anteriore laxiores, posteriore strictiores; scilicet e baseos cylindro tubuloso, referto vase lymphaticis simili, *Rachi* elongatæ, bifariam radiis parallelis approximatis distinctis itidem pinnatis ancipites. *Colore* ludunt, sed variant ætate, sexu, tempestate, climate; constantiores *Remiges & Rectrices*, quæ attente notandæ (\*). *Nuda* cutis utrinque ad colli latera a capite versus interscapulium; ab axillis per latera pectoris fere ad inguina, & ad femora postica.

**OVA** his, animalibus communia (pag. 15. n. 4.) numero diversis vario, sed majora pro mora exclusionis siccæ, semper putamine calcareo oblecta, incubatu calido excludenda Parentis, in *Nido* artificioso.

**IVIDITUR** Avium corpus in *Caput, Truncum, Artus.*

**APUT** tegitur supra *Pileo e Vertice, Fronte, Occipiteque* unitis, cingens rostrum antice *Capistro*, in quo *Lora* e lineis dua-

(\*) *Act. Stolkh. 1740. p. 370. t. i. f. 10. 11.*



duabus nudis a rostro ad oculos ducta ; *Orbitæ* ambiunt oculos , supra quos *Supercilia* ; inter oculos & aures *Tempora* ; inter oculos vero & gulam *Genæ* sunt.

*Rostrum* in variis varium : *Rectum*, *Incurvum*, *Recurvatum*, *Teres*, *Compressum*, *Depressum*, *Conicum*, *Subulatum*, *Cylindricum*, *Angulatum*, *Cultratum*, *Fornicatum*, *Uncinatum*.

*Mandibulæ* nudæ, edentulæ, quibusdam pone apicem *emarginate*, paucis *serratæ*, expositæ in *Rostrum* corneum, *Naribus* pertusum, superioris basi quibusdam *Cera* nuda vestita. *Vibrissis* pectinatim ciliatis ad faucis exterioris margines.

*Lingua* carnosæ, cartilaginea, emarginata, lacera, pennaceæ ciliata, integra s. acuta.

*Oculi* laterales *Palpebris Membranaque* *nictitante* detergendi *Superciliorum* loco interdum linea picta, rarius carunculata.

*Aures* truncatæ absque auriculis, quarum loco pennæ *Strigibus* longæ.

*Barba* Myiacea ad mandibulas inferiores, mobilis *Momotæ* *Pendulino*; in ipso *Pectore* pendula *Meleagridi* adulto; at *Cypripis* *reversum* tegit basin rostri *Corvis*, *Picis*, *Strigibus*.

*Crista* pennacea pilei *Frontalis*, *Verticalis*, *Occipitalis*, *Erecta*, *Recurvata*, *Deflexa*, *Plicatilis*, *Compressa*. *Carunculæ* vero carnosæ nudæque *Frontis*, *Verticis*, *Nuchæ*, *Superciliorum*, *Gulæ*, *Juguli*, sunt ornamenta capitis in variis.

*Collum* elongatum, erectiusculum, teres, supra incipit *Nucha*, continuatur *Cervice*; infra vero incipit *Gula*, continuatur *Jugulo*.

**TRUNCUS** ovatus constans *Dorso* coadunato macro, subtus supra *Sternum* magnum carinatum musculosissimo *Pectore*, *Claviculis* coadunatis in *Furcam*, *Abdomine* minore, postice supra *Uropygio* perforato *Ano*, genitalibus communi, & terminato *Criffo*.

**ARTUS** sunt *Brachiales Alæ*, veri *Pedes*, *Caudale Uropygium*.

**ALÆ** compressæ, *Ossum* articulis mobiles, testæ *Pennis*, communem *Tectricibus* primis secundisque, postice ciliatæ *Remigibus*; explicantur hæ in fornicatum ventilabrum volitante complicantur stabulanti primoribus subeuntibus secundarias, hæ latere antico depingant specificum *speculum* nitidum *Alarum*; nec deficiunt nisi in *Impennibus* pelagicis ( *Diomedæ* *demersa*, *inundata*, *Alca impenni* ) vel volatu ponderosioribus ( *Struthione*, *Dido* )



OSSA : *α. Brachii* 1 elongatum. *β. Cubiti* 2 elongata. *γ. Carpi* 2 brevissima. *δ. Metacarpi* 2 connexa mediocria. *ε. Digiti* 2 attenuata, altero majore biarticulato, compresso; altero minuto. *ζ. Pollicis* vero 1 minutum, insidens basi anteriori metacarpi, raro *spina* evadens (Parris, Charadrio, Struthioni) adjacente *spina* setacea.

REMIGES *Primores* X: quorum 1 — 4 Digiti, 5 — 10 Metacarpi; *Secundarii* 10 — 20 s. 28 Cubiti, nulli vero Brachii; at *Alula* spuria pennis 3 s. 5 Pollici insidet.

PEDES ex Femore, Tibia, Digitis, Unguibus:

FEMORA ex Osse Femoris, Crurisque binis altero setaceo, carnosa, pennistecta, præterquam cruribus denudatis in *vadantibus* Grallis; ceterum plerisque æquilibrio supposita, nisi in *Conpedibus* ambulare nesciis, quibus intra commune abdominis tegmen recondita (Alcis, Colymbis); nonnullis *Armilla* supra genua cingunt coloratæ.

TIBIÆ ex Osse Tarsi elongato, macres, angustæ, tendinosæ, nudæ, rariusve *villosæ plumosæve*, paucis postice *Spina calcaratæ*, imprimis masculis.

DIGITI e Metatarsi phalangibus, plerumque IV, quorum unus posticus breviorque, intermedius anterior vero longior, sed *Scanforiis* digiti antici 2, posticique 2; *Cursoriæ* vero postico destituuntur *tridactylæ* (Charadrius, Hæmatopus, Otis, Casuarius), rarissime *didactylæ* (Struthio Camelus). Sunt vero Digiti distincti *Fissipedibus* plerisque; vel intermedius adnatus laterali *Gressoriis*; vel anteriores intertexti membrana integra *Natatoriis*; quæ fissa in *Lobatis*; vel basi tantum intertexta *Semipalmatis* vadantibus; vel articulus membranula marginali *Pinnatis*.

UNGUES acuti, quibusdam obtusi, paucis marginati, paucissimis *muticis* nulli.

UROPYGIUM sessile, cordatum, glandula gemina caudæ brevi adposita tumidum, supra pertusum *Poro* oleifero, cincto penicillo; ambitu ciliatum Rectricibus Caudæ:

RECTRICES sæpe XII (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1.); plures (18) Gallinis, pauciores (10) Picis (Pico, Certhiæ, Cuculo, Yungi, Bucero, Ramphasto, Trochilo).

CAUDA inde vel Pedibus brevior *brachyura*, vel longior *macroura*; ex Rectricibus æqualibus *integra*; vel ad latera per gradus brevioribus *cuneata*, aut lateralibus longioribus *forficata*;



*cata*; in quibus omnibus Rectricibus complicatis subeunt laterales intermediae.

**VOLATILES** hæ, Telluris vigiles libidinofique musci; pleræque *Diurnæ*; paucæ *Nocturnæ* (Striges, Caprimulgi), quarum variæ Noctu cantant (Luscinia, Turdi) & Mane (Tetraones, Gallinacei), pleræque inermes sunt, cum Alarum remigibus se facile in æthera recipiant ab hostibus terrestribus, & Caudæ rectricibus aëreos diverso volatu eludant, nisi in terra negotiari necesse sit, quibus odor vel ingratus hostes arcet, vel abolitus occultat; dum aliæ speculantur hostem appropinquantem indicantque aliis: *Lanius*, *Yunx*, *Parra*, *Hæmatopus*, *Meleagris*, *Hirundo purpurea* &c.

**ARMA** paucis, præter *Rostrum* & *Ungues* plerisque,  
*Cornua* Meleagridi cornutæ, Palamedæ.  
*Calcaria* Pavoni, Phasiano, Tetraoni.  
*Spinæ* (pollicares) Struthioni Camelo, Paræ,  
 Charadrio spinoso, Palamedæ.

**VENERE** *monogama* junguntur pleræque Aves, *polygama* pauciores, ut Gallinæ, Anates. Illæ utriusque sexus conjunctis viribus struunt nidum sæpe artificiosissimum, (pendulum, natans, concameratum, argillosum, foraminosum, nullumve) uteri succedaneum, incubant sedulæ ovis, (1 Alca, 2 Colymbus. 3 Larus, 4 Corvus, 5-8 Hirundo, pluribus Anates, Gallinæ) pullos famelicæ alunt (ostendendo, porrigendo, regurgitando,) fovēt, curant, pro aris & focis defendunt (\*), dum in his otientur mares. Nuptias celebrant vestitu, musica, ludibus pleræque.

**MIGRATIONES** annuas inter septentrionales æstivas & australes hybernas plagas arcticæ Telluris plures instituunt internuntii hi naturæ, ne hyeme demergerentur boreales omnes insectivoræ. Sic migrant plurimi *Passeres*, imprimis *tenuirostres*, ob defectum insectorum; *Grallæ* ob denegatum glacie aditum vermibus & amphibiis; *Anseres* ob congelatas aquas includentes pisces &c. Revocant vero easdem Dies æstatis longiores, ciborum copia, densiores vestitus, nuptiæ paratæ.

**HABITANT** aliæ intra *Tropicos*, ut Phaëton; intra *Polos*, Procellaria glacialis; aliæ *alibi*, Procellaria capensis; In *India* orien-



orientali Paradisæ, Pavones; *Africa* Struthio 1, Pelecanus 1; *America* Palamedea, Psophia. In *Pelago* impennes compeditæ; *Mari* Procellariæ; *Lacubus* Colymbi; *Fluviis* Mergi; *Cataractis* Cinclus; *Littoribus* Charadrii; *Paludibus* Scolopaces, Tringæ; *Campis* Otis; *Sylvis* infaustus; *Arboribus* Passeres; *Rupibus* Bubo; *Pagis* Pica, Hirundo; *Alpibus* Turdus roseus, Emberiza nivalis.

**VICTUS** cuique suus. Aliæ Carnivoræ: vorant *Cadavera* Accipitres, Corvi; *Pisces* Anseres; *Insecta* Passeres tenuirostres; *Larvas* Cerambycum Pici; *Lepidopterorum* Cuculus; *Ricinos* Crotophaga; *Oestros* Buphaga; *Oniscos* Cinclus; *Phryganeas* Hirundines; *Conchas* Hæmatopus; *Cancros* Mycteria, Cancroma; *Squillas* Recurvirostra; *Lumbricos* Crex. Aliæ Phytiphagæ: victitant *Plantis* Anseres; *Pomis* Psittaci; *Nucibus* Caryocatactes; *Nucleis* Coccothraustes; *Strobilis* Curvirostra, Eucleator; *nectare florum* Trochilus.

**OPERA**, nec sine fructu, peragunt sua singulæ: sedentes *Accipitres* *Cadavera* auferunt, ut vivis parcant; incedentes *Picæ* Quisquilias impuras verminosasque devorant; natantes *Anseres* *Aquarum* nimios hospites minuunt; vadantes *Grallæ* inquirent in *Paludum* animalcula; currentes *Gallinæ* decidua Grana legunt; salientes *Passeres* arborum herbarumque Semina *Insecta*que carpunt; eoque varia semina *Piscium*, *Insectorum* *Plantarum*que sæpius in remotissima loca deferunt naturæ disseminatores. Conquiruntur *Venatu*; *Falconaria*; *Aucupio* instituuntur *Falcones* ad *venatum*, *Parræ* ad *pastoritiam*, *Pelecani* ad *piscaturam*, *Passeres* ad *musicam*. Mansvescunt *Gallinæ*, *Anates*, *Passeresque* varii. In *Ornithone* s. *Aviario* coluntur ob *carnes*, *ova*, *plumas*, *pennas*, *pulchritudinem*, *sonum*.

**HISTORIA** Avium absolvitur *Descriptione*, *Habitatione*, *Volatu*, *Migratione*, *Nuptiis*, *Nidificatione*, *Ovatione*, *Incubatione*, *Educatione*, *Victu*.

**GENERUM** Characteres desumendi a *Rostro*, *Lingua*, *Naribus*, *Cera*, *Caruncula*, reliquisque partibus denudatis.

**ORNITHOLOGI** eminentiores in *Veteres* & *Recentiores* dispe-  
scuntur.

**VETERUM** *Bellonius* 1557 & *Gesnerus* 1555 patres artis; horum aves collegit & auxit *Aldrovandus* 1599, *Brasilien-  
ses* no-  
vas



vas addente *Marcgravia* 1648; has omnes digessit & auxit *Willughby* 1676, cum suo *Rajo* 1713, iconesque varias dedit *Marsiglius* 1726.

RECENTIORES vivis *Coloribus* nova luce illustrarunt artem: Germanicas *Frischius* 1734, Europæas *Albinus* 1731, at rariorum novarumque Avium centuriam unam *Catesby* 1731, sed tres & ultra centurias eximius *Edwards* 1745, quibus in arte nihil pulchrius.

SYSTEMATICAM in formam aves reducere tentavit de Svecicis *Fauna mea* 1746, *Systemaque Naturæ* 1758; omnes collegit & digessit *Brissonus* 1760, cui integrum exercitum & notarum & novarum obtulere labores & museum magni *Reaumurii*. Sic duplo plures innotuere nuper aves, indefesso studio *Edwardi* & *Reaumurii*, quam quæ antea cognitæ erant.

ASSERVANTUR vel in *Spiritu vini* integræ, vel exuviis integris *farctis* aut dimidiatis *gypso* fixato repletis, methodo *Schæfferi*.

## ORDINUM Characteres.

## I. ACCIPITRES.

ROSTRUM (*Uncus trahens*) subincurvatum: *Mandibula* superiore pone apicem utrinque dilatata s. dente armata: *Naribus* patulis.

PEDES infidentes, breves, robusti: *Digitis* sub geniculis verrucosis; Unguibus arcuatis, acutissimis.

CORPUS Capite Colloque musculosis; *Cute* tenaci. Impurum.

VICTUS: Laniena rapiuque e cadaveribus.

NIDUS in altis; *Ova* circiter 4; *Femina* præstantior; Monogamia.

Analogi *Feris*.

## II. PICÆ.

ROSTRUM (*Cuneus sarriens*) cultratum dorso convexo.

PEDES ambulantes, breves, validiusculi.

CORPUS tenaciusculum, impurum.

VICTUS e Quisquiliis.

NIDUS in Arboribus; *Mas* alens feminam incubantem; Monogamia.

Analogæ *Primatibus*.

## III. ANSERES.

ROSTRUM (*Cribrum colans*) læve, epidermide tectum, apice auctum.

PEDES natatorii digitis membrana palmatis; *Tibiis* compressis, brevibus.

CORPUS pingue, *Cute* tenaci, Plumis præstantioribus. Rancescens.

VICTUS in Aquis ex Plantis, Piscibus, &c.

NIDUS sæpius terrestris; *Mater* rarius porrigit pullis; frequentius Polygamia.

Analogi *Belluis*.



## IV. GRALLÆ.

ROSTRUM (*Bacillus tentans*) subcylindricum.

PEDES vadantes *Femoribus* seminudis.

CORPUS compressum pelle tenuissima; *Cauda* brevi; *Sa-*  
pidum.

VICTUS in Paludibus ex Animalculis.

NIDUS in terra sæpius; Nuptiis variis.

Analogæ *Brutis*.

## V. GALLINÆ.

ROSTRUM (*Harpa colligens*) convexum: *Mandibula* superiori  
re fornicata supra inferiorem; *Naribus* membrana cartilagi-  
nea fornicatis.

PEDES cursorii *Digitis* subtus scabris.

CORPUS sebaceum, musculosum. Purum.

VICTUS in Terra e Granis in ingluvie macerandis. *Pulverac-*  
trices.

NIDUS in Terra absque arte; *Ovis* numerosis. *Pullis* cibum  
demonstrandus. Polygamia.

Analogæ *Pecoribus*.

## VI. PASSERES.

ROSTRUM (*Forceps excipiens*) conico-acuminatum.

PEDES salientes, teneri, fissi.

CORPUS tenellum: *Granivoris* Purum, *Insectivoris* Impu-  
rum.

VICTUS in arboribus e Seminibus aut Insectis.

NIDUS artificiosus; *Pullis* cibum inculcandus. Monogamia  
Cantus.

Analogi *Gliribus*.

## CHARACTERES AVIUM.

## I. ACCIPITRES.

1. VULTUR Rostrum *aduncum*. Caput *denudatum*.  
 2. FALCO Rostrum *aduncum* basi Cera *tectum*.  
 3. STRIX Rostrum *aduncum* capistro *reverso*.  
 4. LANIUS. Rostrum *rectiusculum*, *emarginatum*.

## II. PICÆ.

\* *Pedibus Ambulatoriis.*

6. TROCHILUS Rostrum *incurvatum*, *filiforme*, apice *tubuloso*.  
 5. CERTHIA Rostrum *incurvatum*, *acuminatum*.  
 4. UPUPA Rostrum *incurvatum*, *obtusiusculum*.  
 8. BUPHAGA Rostrum *rectum*, *quadrangulare*.  
 0. SITTA Rostrum *rectum*, apice *cuneato*.  
 2. ORIOLUS Rostrum *rectum*, *conicum*, *acutissimum*.  
 1. CORACIAS Rostrum *cultratum*, apice *incurvo*.  
 3. GRACULA Rostrum *cultratum*, *æquale*, basi *calva*.  
 0. CORVUS Rostrum *cultratum*, capistro *reverso*.  
 4. PARADISEA Rostrum *subcultratum*, capistro *holosericeo*.

\* \* *Pedibus Scansoriis.*

- RAMPHASTOS Rostrum *ferratum*. Lingua *pennacea*.  
 5. TROGON Rostrum *ferratum*, apice *aduncum*.  
 5. PSITTACUS Rostrum *cera obductum*. Lingua *carnosa*.  
 9. CROTOPHAGA Rostrum *rugosum*, margine *angulatum*.  
 9. PICUS Rostrum *angulatum*. Lingua *lumbriciformis*.  
 8. YUNX Rostrum *læve* Lingua *lumbriciformis*.  
 7. CUCULUS Rostrum *læve* Nares *marginatæ*.  
 6. BUCCO Rostrum *læve*, *emarginatum*, *aduncum*.

\* \* \* *Pedibus Gressoriis.*

7. BUCEROS Rostrum *ferratum* fronte *ossea*.  
 2. ALCEDO Rostrum *trigonum*, *rectum*.  
 3. MEROPS Rostrum *incurvatum*, *compressiusculum*.  
 1. TODOS Rostrum *lineare*, *depressum*, *rectum*.



### III. ANSWERS.

\* *Roſtro denticulato.*

- |             |   |
|-------------|---|
| 67. ANAS    | Rostrum unguiculatum denticulis membranaceis. |
| 68. MERGUS  | Rostrum unguiculatum denticulis subulatis.    |
| 74. PHAËTON | Rostrum cultratum.                            |
| 73. PLOTUS  | Rostrum subulatum.                            |

\* \* *Roſtro edentulo.*

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 78. RHYNCOPS    | Rostrum <i>mandibula superiore brevior.</i>                            |
| 71. DIOMEDEA    | Rostrum <i>mandibula inferiore truncata.</i>                           |
| 69. ALCA        | Rostrum <i>rugis lateralibus transversis.</i>                          |
| 70. PROCELLARIA | Rostrum <i>naribus superincumbentibus, suboc-</i><br><i>lindricis.</i> |
| 72. PELECANUS   | Rostrum <i>cinctum facie nuda.</i>                                     |
| 76. LARUS       | Rostrum <i>sub apice subtus gibbum.</i>                                |
| 77. STERNA      | Rostrum <i>subulatum apice compresso.</i>                              |
| 75. COLYMBUS    | Rostrum <i>subulatum lateribus compressiusculum.</i>                   |

#### IV. GRALLÆ.

\* *Pedibus tetradactylis.*

- |                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| 79. PHOENICOPTERUS | Rostrum <i>infractum, denticulatum.</i>               | Pee |
|                    | <i>palmati.</i>                                       |     |
| 80. PLATALEA       | Rostrum <i>depressum spatulatum.</i>                  |     |
| 81. PALAMEDEA      | Rostrum <i>apice uncinatum acutum.</i>                |     |
| 82. MYCTERIA       | Rostrum <i>mandibula inferiore crassiore</i>          |     |
|                    | <i>ascendens.</i>                                     |     |
| 85. TANTALUS       | Rostrum <i>arcuatum sacco gulari.</i>                 |     |
| 84. ARDEA          | Rostrum <i>rectum, acutiusculum.</i>                  |     |
| 89. RECURVIROSTRA  | Rostrum <i>subulato - attenuatum, depressum,</i>      |     |
|                    | <i>recurvum.</i>                                      |     |
| 86. SCOLOPAX       | Rostrum <i>rectum, teretiusculum, obtusiusculum.</i>  |     |
| 87. TRINGA         | Rostrum <i>teretiusculum, obtusum,</i>                | Poe |
|                    | <i>vix insistent.</i>                                 |     |
| 91. FULICA         | Rostri <i>basis fronte calva.</i>                     |     |
| 92. PARRA          | Rostri <i>basis fronte carunculis mobilibus</i>       |     |
| 93. RALLUS         | Rostrum <i>subcarinatum. Corpus compressiusculum.</i> |     |
| 94. PSOPHIA        | Rostrum <i>subfornicatum. Nares ovatae.</i>           |     |
| 83. CANCROMA       | Rostrum <i>ventricosum.</i>                           |     |

\* \* *Pedibus cursoriis s. tridactylis.*

90. HEMATOPUS Rostrum compressiusculum apice cuneo.  
 88. CHARADRIUS Rostrum teretiusculum, obtusum.  
 95. OTIS Rostrum subformicatum. Lingua emarginata.  
 96. STRUTHIO Rostrum conicum. Alæ non volitantes.

## V. GALLINÆ.

97. DIDUS Rostrum medio coarctatum, rugosum, facie nuda.  
 98. PAVO Vertex pennis revolutis. Rostrum nudum.  
 99. MELEAGRIS Facies carunculis verrucosa.  
 100. CRAX Cera basin rostri obducens.  
 101. PHASIANUS Genæ nude, leves.  
 103. TETRAO Supercilia nuda papillosa.  
 102. NUMIDA Carunculæ binæ ad basin mandibularum.

## VI. PASSERES.

\* Crassirostres.

109. LOXIA Rostrum conico-ovatum.  
 112. FRINGILLA Rostrum conicum, acutum.  
 110. EMBERIZA Rostrum subconicum, mandibula inferiore latiore, coarctata.

\* \* Curvirostres mandibul. superior. apice incurvata.

118. CAPRIMULGUS Rostrum incurvum, depressum, ciliatum.  
 Nares tubulosæ.  
 117. HIRUNDO Rostrum incurvum, depressum.  
 115. PIPRA Rostrum incurvum, subulatum.

\* \* \* Emarginatirostres mandib. super. pone apicem emarginata.

107. TURDUS Rostrum emarginatum, subulatum, basi compressum.  
 108. AMPELIS Rostrum emarginatum, subulatum, basi depressum.  
 111. TANAGRA Rostrum emarginatum, subulatum, basi conoidæum.  
 113. MUSCICAPA Rostrum emarginatum, subulatum, basi ciliatum.



\*\*\*\* *Simplicirostres. R. recto integro attenuato.*

116. PARUS      Rostrum *subulatum*. Lingua *truncata*, Capi-  
strum *reversum*.
114. MOTACILLA      Rostrum *subulatum*. Lingua *incisa*. Unguis  
posticus *modicus*.
105. ALAUDA      Rostrum *subulatum*, Lingua *bifida*. Unguis  
posticus *elongatus*.
106. STURNUS      Rostrum *subulatum apice depresso marginato*.
104. COLUMBA      Rostrum *subfornicatum*. Nares *gibbosæ mem-  
brana oblitterata*.

## I. ACCIPITRES.

*Rostrum e Mandibula superiore angulum utrinque exserens.*

41. VULTUR. *Rostrum rectum, apice aduncum. Caput impenne, antice nuda cute, Lingua bifida.*

Gryphus. 1. V. maximus, caruncula verticali longitudine capitis, gula nuda. †

Vultur Gryps Gryphus. Klein. av. 45. Briss. av. 1 p. 473.

Cuntur. Laet. amer. 401. Raj. av. 11.

Condor. Frez. it. 111. Condam it. 175.

*Habitat in Chili, Peru. Prædatur Vitulis, ovibus, immo Pueris decennibus; binæ aves Vaccam dilacerant vorantque; in terram devolans susurro attonitos & surdos fere reddit homines.*

*Alæ maximæ, intra quarum extremitates ped. 13. f. 16. Remex longitudine ped. 2½, crassitie digit. 1½.*

*Corpus nigrum, subtus fuscum. Caput nudum fusca lanugine, carunculaque longitudinali. Gula nuda, rubens. Rostrum & Pedes nigri. Ungues rectiusculi ne nimium sæviant.*

Harpyja. 2. V. capite tecto pennis elongatis cristato.

Yzquauhtli. Hern. mex. p. 34.

Urutaurana. Marcgr. bras. 203. t. 204.

Aquilæ cristatæ genus. Raj. av. 161.

Aquila brasiliensis cristata. Raj. av. 7. Briss. av. 1. p. 446.

*Habitat in Mexico. Fertur unico ictu cranium hominis findere; pennas occipitis sæpius erigit in formam bifidæ coronæ; erectus confidet; iratus pennas demittit usque ad pedum digitos. Caput pennis tectum, leucophæo-cæruleum: capitis pennæ pedem ½ longæ, quas iratus conspectaque præda erigit. Corpus Dorso, Alis, maximaque Colli parte nigrum; subtus Pectore & Ventre niveum. Cauda fusco nigroque fasciata. Crissum & Femora albo atroque fasciata.*



Rostrum nigrum. Digiti Pedesque nudi, flavi.  
Caput nullibi nudum; Falconibus ideoque proximus.

- Papa. 3. V. naribus carunculatis, vertice colloque denudato,  
Vultur elegans. *Edw. av. 2. t. 2.*  
Rex vulturum. *Briss. av. 1. p. 470. t. 36.*  
Vultur. *Alb. av. 2. p. 4. t. 4.*  
Cozcaquauhtli. *Hern. mex. 319. Raj. av. 161.*  
*Habitat in India occidentali. Victitat Serpentibus, Lacertis &c. cadaveribus; alte volitat.*  
Caput & Collum, quasi excoriata, retrahere potest intra vaginam cutis plumosæ colli inferioris; Area oculorum nuda, crocea. Vitta nigricante lanugine ab occipite caput cingit. Corpus rufescenti-album. Remiges cinerascenti-nigri. Pedes rubri. Rostrum rubrum Cera aurantia; Carunculæ dentatæ juxta ceram s. nares.

- Monachus. 4. V. vertice gibboso, corpore nigro.  
Vultur cristatus niger. *Edw. av. t. 290.*  
Vultur arabicus. *Briss. av. app. 29.*  
*Habitat in Arabia.*  
Orbita alba. Caput supra gibbum elevatum. Cera Pedesque cærulescentes.

- Aura. 5. V. fusco-griseus, remigibus nigris, rostro albo.  
Tzopilotl s. Aura. *Hernand. mex. 331.*  
Urubu brasiliensibus. *Marcgr. bras. 207. Willughb. orn. 68. Raj. av. 10. 180.*  
Buteo specie gallo-pavonis. *Catesb. car. 1. p. 6. t. 6.*  
Vultur gallinæ africanæ facie. *Sloan. jam. 2. p. 294. t. 254.*  
Vultur brasiliensis. *Briss. av. 1. p. 468.*  
Vultur pullus, capite implumi, cute crassa rugosa ultra aperturas nasales laxata. *Brown. jam. 471.*  
*Habitat in America calidior.*  
*Privilegio munitus in America cadavera serpentesque vorans; Cadavera animalium simul cum canibus, ceu germanis fratribus, summa concordia dilacerat; sæpe carnes e culina furatur; fætido odore stercoris humani olet; captus materiam adhuc fætidiorē evomit; noctu gregarie dormit in summis arborum cacuminibus. D. Jacquin.*  
Corpus nigrum purpureo viridique micans. Irides croceo-cærulescentes. Pedes carnei. Caput rufescens.

barbatus. 6. *V. albidus*, dorso fusco, gula barbata, rostro incarnato, capite linea nigra cincto.

*Vultur aureus*. *Gesn. av.* 783. t. 781. *Aldr. av.* 1. p. 277. t. 276.

*Vultur barbatus*. *Edw. av.* 106. t. 106. *Briss. av.* 6. app. 26.

*Vultur bæticus*. *Aldr. orn.* 1. 273. t. 274. *Will. orn.* 35. *Raj. av.* 10.

*Habitat in Africa.*

*Ad basin maxillæ inferioris barba dependet; frons oculorumque regio atra. Palpebræ rubræ. Pedes pennis vestiti.*

*Pernopterus*. 7. *V. remigibus nigris margine exteriori ( præter extimas ) canis.*

*Pernopterus* s. *Gypætos*. *Aldr. orn.* 1. 216. t. 217, 219. *Gesn. av.* 199. *Will. orn.* 83. t. 4. *Raj. av.* 8. *Alb. av.* 2. p. 2.

*Falco montanus ægyptiacus*. *Hasselqv. act. stockh.* 1751. p. 196.

*Vultur, Pernopterus*, capite nudo, gula plumosa, *Hasselqv. itin.* 209.

*Vultur niger*. *Raj. av.* 9.

*Vultur leucocephalus*. *Briss. av.* 1. p. 466.

*Vultur alpinus*. *Briss. av.* 1. p. 464.

*Vultur albus*. *Raj. av.* 10. *Will. orn.* 35.

*Vultur aquilina*. *Alb. av.* 2. p. 3. t. 3.

*Vultur fulvus*, bætico bellonii congener *Raj. av.* 10.

*Vultur ægyptius*. *Briss. av.* 1. p. 457.

*Vultur sacer ægyptius*. *Bell. av.* 110. t. III. *Aldr. av.* 1. p. 378. t. 379.

*Habitat in Ægypto, Europa australi. Purgat Cauri terram a cadaverum fœtore, stipendiis allectus. Hasselqv. Palestinæ agri desererentur ob Murium copiam, nisi hæ aves catervatim advolarent. Bellon. Olim hunc capitale occidere Ægyptiis. Herodot.*

*Mas totus albus: Remigibus atris margine exteriori canis, exceptis duobus primis unicoloribus. Femina tota fusca: Remigibus quatuor extimis concoloribus. Rostrum atrum cera flava. Hasselqv. Nares perpetuo stillant. Raj. Pedes nudi.*

*Albiulla*. 8. *V. cera pedibusque flavis, rectricibus albis: intermediis apice nigris. Fn. svec.* 55. \* *Brunnich. orn.* 12.



*Pygargus*, *Albiulla*, *Hirundinaria*. *Bell. av.* 15. *Gesn. av.* 205. *Will. orn.* 31. *Raj. av.* 7. n. 5.

*Aquila Albiulla*. *Briss. av.* 1. p. 427.

*Habitat in Europa*; *ferit Pisces maximos, iisque victitat anceps. Frons inter oculos & nares nuda tantum setulis adspersa. Rostrum basi elongatum.*

## 42. FALCO. *Rostrum* aduncum, basi cera instructum.

*Caput* pennis arcte tectum.

*Lingua* bifida.

\* *Cera lutea.*

**Coronatus.** 1. *F. cera ferruginea*, pedibus lanatis albis nigro punctatis, pectore rufo, lateribus nigro fasciatis.

*Aquila coronata*. *Edw. av.* 3. p. 31. t. 224.

*Aquila africana cristata*. *Briss. av.* 1. p. 448.

*Habitat in Guinea.*

*Cristæ instar interdum pennas erigit. Color fuscus.*

*Area oculorum albida.*

**Melanæetus.** 2. *F. cera lutea*, pedibusque semilanatis, corpore ferrugineo-nigricante striis flavis.

*Melanæetus* s. *Aquila valeria*. *Gesn. av.* 203. *Aldr. orn.* 1. p. 197. t. 199, 200. *Raj. av.* 7. n. 4. *Will. orn.* 30. t. 2. *Alb. av.* 2. p. 2. t. 2. *Briss. av.* 1. p.

434.

*Habitat in Europa.*

**leucocephalus.** 3. *F. cera lutea*, pedibusque semilanatis, corpore fusco, capite caudaque albis.

*Aquila capite albo*. *Catesb. carol.* 1. p. 1. t. 1.

*Aquila leucocephalos*. *Briss. av.* 1. p. 423.

*Habitat in America, Europa.*

**Offragus.** 4. *F. cera lutea* pedibusque semilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore, albis.

*Offragus*. *Gesn. av.* 263. *Aldr. orn.* 1. p. 222. t. 225, 228. *Brünn orn.* 13.

**Haliæ-**

---

*Aquilæ dictæ fuere Falcones majores; pedibus hirsutis; capiunt Anseres, Oves, Lepores, Serpentes.*

*Haliaetus* f. *Aquila marina*. *Will. orn.* 29. t. 1. *Raj.* av. 7. n. 3.

*Habitat in Europa; etiam in Svecia.*

Corpus magnitudine Gallo - pavonis : pennis basi albis, medio ferrugineis, apice nigris. Remiges nigrigantes : secundariæ latere tenuiore albicantes. Rectrices latere interiore albæ rachi niveæ. Tectrices caudæ fere albæ. Pedes lutei. Femina obscure ferruginea.

Chrysaë- 5. F. cera lutea, pedibusque lanatis luteo-ferrugineis, tos. corpore fusco ferrugineo vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. *Fn. svec.* 54. \*

*Aquila germana.* *Gesn. av.* 168.

*Aquila chrysaëtos.* *Will. orn.* 27. t. 1. *Raj.* av. 6. n.

1. *Aldr. orn.* 1. p. 111., 114. 115. *Briss.* av. 1. p. 431.

*Habitat in Europa.*

fulvus. 6. F. cera flava, pedibusque lanatis fusco-ferrugineis; dorso fusco, cauda fascia alba.

*Aquila.* *Aldr. orn.* 1. p. 17. *Briss.* av. 1. p. 419.

*Aquila fulva* f. *Chrysaëtos*, cauda annulo albo cincta. *Will. orn.* 28. t. 1. *Raj.* av. 6. n. 2.

*Aquila.* *Aldr. orn.* 1. p. 17. *Dodart. act.* 3. p. 89. t. 49. *Briss.* av. 1. p. 419.

β. F. *canadensis* cera flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda alba apice fusco. *Syst. nat.* 10. p. 88.

*Aquila cauda alba.* *Edw. av.* 1. t. 1. *Voy. huds.* 3. p. 54. t. 2.

*Habitat in Canada, Europa.*

Pectus punctis trigonis adpersum. Frons inter oculos & nares nuda.

rustico- 7. F. cera palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo lus. alboque undulato, collari albo. *Fn. svec.* 56. \*

*Habitat in Svecia.*

barbarus 8. F. cera pedibusque luteis, corpore cærulescente fuscoque maculato, pectore immaculato, cauda fasciata.

*Falco tunetanus.* *Aldr. av.* 1. p. 483. *Bell. av.* 117?

*Raj. av.* 14? *Alb. av.* 3. p. 2. t. 2: *Briss.* av. 1. p. 343.

*Habitat in Barbaria.*

cærule- 9. F. cera palpebris pedibusque luteis, dorso fcens. nigro-cærulescente, temporibus linea alba inclusis.

Acci-



*Accipiter minimus benghalensis. Edw. av. 108. t. 108.*

*Falco bengalensis. Briss. av. app. 20.*

*Habitat in Asia.*

*Minimus in suo genere. Sinciput candidum. Genæ albæ linea nigra.*

*cyaneus. 10. F. cera alba, pedibus fulvis, corpore cæruleo-canesciente, arcu superciliari albo gulam cingente.*

*Accipiter cæruleus. Edw. av. 5. p. 33. t. 225.*

*Habitat in Europa, Africa.*

*Pygargus. 11. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pallido maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba.*

*Falco torquatus. Briss. av. 1. p. 345.*

*Subbuteo. Gesn. av. 48.*

*Pygargus. Alb. av. 2. p. 5. t. 5. ♂ 3. p. 3. t. 3. Will. orn. 40. t. 7. Raj. av. 17. n. 5. Edw. av. 173. t. 291.*

*Habitat in Europa; in Austria sub asperrima tantum hyeme. Kram. mas subtus maculis transversis, femina longitudinalibus.*

*Milvus. 12. F. cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidior. Faun. svec. 57. \**

*Milvus. Gesn. av. 610. Aldr. ornith. 392. t. 368.*

*Will. ornith. 41. t. 6. Raj. av. 17. Albin. av. 1. p. 4. t. 4.*

*Milvus regalis. Briss. av. 1. p. 414. t. 33.*

*Habitat in Europa, Asia, Africa.*

*Migrat trans Pontum Euxinum in Asiam; ultimo aprilis tot Pontum Euxinum prætervolantes vidit per 14 dies, ut numerum hominum superarent, Bellonius. Privilegio munitus Londini. Bell. itin. 108. Vorat quisquilias, pullos, galinaceos; tempestates præsigit, supra nubes volitans serenitatem aëris, clamore pluvias. Volatus pacatissimus. Pulmones pulchri.*

*gentilis. 13. F. cera pedibusque flavis, corporis cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. Fn. svec. 58. \**

*Falco gentilis. Gesn. av. 71. Aldr. orn. 1. p. 481. Will. ornith. 46. Raj. av. 13. Alb. av. 2. p. 4. t. 6. Briss. av. 1. p. 339.*

*Falco montanus*: Will. ornith. 45. t. 5. Raj. av. 13.  
*Habitat in Alpibus, victitans Tetraonibus.*

*Ars capiendi Falcones Columba & Lanio, instituendi, venandi Gazellas, Ardeas, Aviculas &c. propriis artificibus commissa, in luxuriam magnatum, ridenda etiam a stulto.*

Subbuteo. 14. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis. *Fn. svec. 59. \**

Subbuteo. Aldr. orn. 1. p. 374. Alb. av. 1. p. 6. t. 6. Raj. av. 15. n. 14.

Dendrofalco Briss. av. 1. p. 375.

*Habitat in Europa, Alaudis infestus, quæ cum ita exhorrent, ut in sinum Hominis se recipiant. Raj.*

*Rectrices laterales nigricanti-fasciatae. Uropygium album.*

Buteo. 15. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido maculis fuscis. *Fn. svec. 60. \**

Buteo vulgaris. Gesn. av. 46. Aldr. orn. 1. p. 369. 370. Will. ornith. 38. t. 6. Raj. av. 16.

Buteo. Alb. av. 1. p. 1. t. 1. Briss. av. 1. p. 406.

*Habitat in Europa, Cuniculis, & Bufonibus infestus.*

Tinnunculus. 16. F. cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, pectore striis, fuscis cauda rotunda. *Faun. svec. 61. \* Penn. brit. t. A. B.*

Tinnunculus s. Cenchris. Gesn. av. 54. Aldr. orn. 1. p. 356. t. 358, 359. Will. orn. 50. t. 5. Raj. av. 16.

Alb. av. 1. p. 7. t. 7. (femina) & 3. p. 5. t. 5.

Frisch. av. t. 84, 85. Briss. av. 1. p. 393.

*Habitat in Europæ turribus, Aviculis Muribusque infestus; Advenit ex migratione primo die Germinationis s. veris, una cum Motacilla alba.*

*In Cauda fascia unica lata nigra versus apices. Rectrices, exceptis intermediis, apice albescent.*

fulvator. 17. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco albido, oculorum operculis offeis.

*Habitat in Surinamo. Rolander.*

Cor-

---

Falconaria ars ad aucupium & venatum instruendi Falcones transit in Scientiam; inter auctores plurimos eminet d'Esparon. Falconaria. Francof. 1617. quart. Omnes Species possunt ad artem Falconariam instrui.



Corpus supra fuscum plumis basi albis ; subtus luteo albo fuscoque maculatum , uti etiam rectrices. Nares lobo carneo intercalari. Iratus aut territus caput inflat ad magnitudinem corporis.

cachinnans. 18. F. cera pedibusque luteis palpebris albis , corpore fusco albidoque vario , annulo nigro verticem album cingente. *Rolander.*

*Habitat in America meridionali.*

Corpus supra Dorsum , Alas , Uropygium fuscum ; sed Alba sunt collum , gula , pectus , abdomen , alae subtus. Cauda fasciis luteis nigrisque. Hominem observans cachinnos edit.

hudsonius. 19. F. cera pedibusque flavis , dorso fusco , superciliis albis , speculo alarum cærulescente.

*Pygargus canadensis. Edw. av. 107. t. 107.*

*Accipiter freti hudsonis. Briss. av. 6. app. 18.*

*Habitat ad fretum Hudsonis.*

sparverius. 20. F. cera lutea , capite fusco , vertice abdomineque rubro , alis cærulescentibus.

*Accipiter minor. Catesb. carol. 1. p. 5. t. 5.*

*Æsalon carolinensis. Briss. av. 1. p. 386. t. 32. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Feminae caput cingitur maculis 7 nigricantibus.*

columbarius. 21. F. cera pedibusque luteis , corpore fusco subtus albido , cauda fusca fasciis linearibus quatuor albis.

*Accipiter palumbarius. Catesb. car. 1. p. 3. t. 3.*

*Accipiter carolinensis. Briss. av. 1. p. 378.*

*Habitat in America.*

superciliofus. 22. F. cera pedibus palpebrisque luteis , corpore fusco albido undulato , remigibus ferrugineis nigro fasciatis.

*Habitat in Surinamo. Dahlberg.*

Magnitudo *Picæ*. Corpus supra fuscum , subtus totum etiam femoribus confertim nigro undulatum.

Remiges ferrugineæ fasciis nigris pluribus ; sed secundum

---

Falcones altissime volant , sæpe ut vix videantur ; hærent quasi suspensi in aëre ; visu excellunt ; solitarii degunt , nisi tempore copulæ ; jaculi instar cadunt prosequendo prædam ; famem diu tolerant ; pane ingesto moriuntur ; ætate sexuque variant ; paciscuntur inducias cum avibus , imprimis domesticis , quamdiu Cuculus cuculat , ut hæ feriantur sub nidificatione , incubatione , pullitie.

*cundariæ margine posteriore albido. Cauda nigra fasciis duabus latis & apice cinereis. Crissum album strigis aliquot nigris. Uropygium albo nigroque varium. Supercilia subtus nuda, prominula. Lora setis nigris patentibus. Rostrum & Ungues nigri. Rectrices alarum inferiores albæ lineolis tenuissimis nigris.*

vesperti- 23. F. cera pedibus palpebrisque luteis, crisso femori-  
nus busque ferrugineis.

*Habitat in Ingria, Kober, dictus, vespera & noctu volitans.*

Magnitudo Columbæ. Corpus fusco-cærulescens. Venter albo-cærulescens. Caput fuscum. Rostrum totum flavum excepto apice fusco. Rectrices 12 supra & subtus fusæ. Remiges albo-cærulescentes: primoribus 1-7 apice nigricantibus. Pedes nudi. Descriptionem & figuram misit Georg de Demidoff. L. B.

Lanarius. 24. F. cera lutea, pedibus rostroque cæruleis, corpore subtus maculis nigris longitudinalibus. Faun. svec. 62. \*

Lanarius. Gesn. av. 76. Aldr. orn. 1. p. 488. Will. orn. 48. Raj. av. 15. Alb. av. 2. p. 7. t. 7. Briss. av. 1. p. 363.

*Habitat in Europa; migratorius.*

*Tenia alba cingit frontem supra oculos. Pedes breves.*

\* \* Cera obscura.

furcatus. 25. F. cera obscura, pedibus flavescantibus, corpore supra fusco, subtus albido, cauda forficata longissima. Accipiter cauda furcata. Catesb. car. 1. p. 4. t. 4. Accipiter carolinensis. Briss. av. 1. p. 418. *Habitat in America, viſitat insectis.*

Haliætus. 26. F. cera pedibusque cæruleis, corpore supra fusco subtus albo, capite albido. Fn. svec. 63. \*

Aquila Haliætus. Briss. av. 1. p. 440. t. 34.

Haliætus. Aldr. orn. 1. p. 188, 190.

Morphnos. Aldr. orn. 1. p. 211.

Balbuzardus. Will. orn. 37. t. 6. Raj. av. 16.

*Habitat in Europa, humi inter arundines. Viſcit ut Piscibus majoribus, Anatibus, Pes sinister subpal-matus.*



*Area fusca descendit ab utroque oculo , per latera colli, ad alas.*

**Gyrfalco- 27.** F. cera cærulea , pedibus luteis , corpore fusco , sub-  
tus fasciis cinereis , caudæ lateribus albis. *Fn. svec.*  
46. \*

**Gyrfalco.** *Aldr. orn. 1. p. 471. t. 473. Will. orn.*  
44. t. 8. *Raj. av. 13. n. 3. Briss. av. 1. p. 370.*  
t. 30. f. 2.

**Morphnos.** *Bell. av. 94. Aldr. orn. 1. p. 212.*

*Habitat in Europa , Gruibus , Ardeis , Columbis infestus.*  
*Variat pedibus cæruleis & flavis.*

**apivorus. 28.** F. cera nigra , pedibus seminudis flavis , capite  
cinereo , caudæ fascia cinerea apice albo. *Faun.*  
*svec. 65. \**

**Buteo apivorus s. vespivorus.** *Will. ornith. 38. t.*  
3. *Raj. av. 16. Briss. av. 1. p. 410. Alb. av. 1. p. 2. t. 2.*

*Habitat in Europa ; victitans Muribus , Ranis , La-*  
*certis , Insectis , Apibus , Aviculis.*

**ærugino- 29.** F. cera virescente , corpore griseo , vertice gula  
fus.  
axillis pedibusque luteis. *Fn. svec. 66. \* Penn. bri-*  
*tann. t. A. 5.*

**Circus.** *Gesn. av. 49. Aldr. orn. 1. p. 351.*

**Milvus æruginosus.** *Aldr. orn. 1. p. 395. Will. orn.*  
42. t. 7. *Raj. av. 17. Alb. av. 1. p. 3. t. 3.*

**Accipiter Circus palustris.** *Briss. av. 1. p. 401.*

*Habitat in Europa , in Paludibus nidificat.*

**palumba- 30.** F. cera nigra margine pedibusque flavis , corpore  
rius.  
fusco , rectricibus fasciis pallidis , superciliis albis.  
*Fn. svec. 67. \**

**Falcó sagittatus.** *Frisch. av. t. 82. mas. t. 81. fem.*

**Asterias.** *Aldr. orn. 1. p. 336. t. 340 , 341.*

**stur.** *Briss. av. 1. p. 317.*

**Accipiter palumbarius.** *Gesn. av. 51. Aldr. orinth.*

1. p. 342. t. 343. *Raj. av. 18. n. 1. Alb. av. 2.*  
p. 8. t. 8. *Will. orn. 51. t. 3 , 5.*

*Habitat in Europa , Gallinis infestus.*

*Subtus totus albus nigro undulatus. Rectrices apice*  
*albæ.*

**Nifus. 31.** F. cera viridi , pedibus flavis , abdomine albo gri-  
seo undulato , cauda fasciis nigricantibus. *Fn. svec. 68. \**

Acci-

*Accipiter fringillarius.* Gesn. av. 51. Aldr. orn. 1. p. 344. t. 346, 347. Bell. av. 19. b. Will. orn. 51. t. 5. Raj. av. 18. Alb. av. 3. p. 4. t. 4. & 1. p. 5. t. 5. femina.

*Accipiter.* Briss. av. 1. p. 310.

*Nisus striatus.* Frisch. av. 90. mas; at sagittatus. Frisch. av. t. 91., 92. femina.

*Moscheutus.* Aldr. ornith. 345.

*Habitat in Europa; Columbibus Passeribusque maxime infestus; venatur egregie Alaudas, eoque utimur in aucupiiis.*

*Remiges non supra, sed subtus variegatae fasciis fuscis. Tectrices humerorum fuscae, sed parte occultata albæ cum fascia fusca. Gula fusco striata. Rostrum cærulescens.*

*minutus.* 32. F. cera fusca, pedibus luteis, corpore subtus albo, rectricibus fuscis nigro fasciatis.

*Accipiter minor.* Briss. av. 1. p. 315. t. 30. f. 1.

*Habitat in Melita.*

*Magnitudo Turdi.*

### 43. STRIX. Rostrum aduncum (absque cera.)

*Nares pennæ fetaceis recumbentibus obtectæ.*

*Caput grande: auribus oculisque magnis.*

*Lingua bifida.*

\* *Auriculatæ pennæ auricularum instar exstantium.*

*Bubo.*

1. S. capite auriculato, corpore rufo. Fn. suec. 69. \*

*Bubo.* Bell. av. 25. a Gesn. av. 234. Aldr. orn. 1. p. 502. Will. orn. 63. Alb. av. 2. p. 9. t. 9. Frisch. av. t. 93. Briss. av. 1. p. 477.

β. *Bubo atheniensis.* Alb. av. 3. t. 6. Edw. av. 37. t. 227.

I 2

Habi-

*Strix differt a Falcone ut Phalæna a Papilione; altera enim diurna, alter nocturnus est.*

*Noctu prædantur Aviculis, Muribus, Vespertilionibus; Pedes lanati ne frigescant; Aures amplæ ut percipiant; Oculi magni noctu lucentes, ut tunc acutius videant; ex oculis & auribus caput magnum; die cæcutiunt; Passeribus opprobrio expositæ.*



*Habitat in Europa.*

*Minervæ Avis, unde Noctuas Athenas mittere.*

- Scandia. 2. S. capite aurito, corpore albido. *Faun. svec. 70. \**  
*Habitat in Alpibus Lapponiæ.*

- Asio. 3. S. capite aurito, corpore supra ferrugineo subtus cinereo, alis punctis quinque albis.  
 Noctua aurita minor. *Catesb. car. 1. p. 7. t. 7.*  
 Scops carolinienfis. *Briss. av. 1. p. 497.*  
*Habitat in America.*

- Otus. 4. S. capite auriculato pennis fenis. *Fn. svec. 71. Penna. brit. t. B. 3.*  
 Otus s. Asio. *Bell. av. 25. 6. Gesn. av. 223. Aldr. orn. 1. p. 525. Will. orn. 64. t. 12. Raj. av. 25. Frisch. av. t. 99. Alb. av. 2. p. 10. t. 10.*  
 Bubo Asio *Briss. av. 1. 486.*  
*Habitat in Europa.*  
*Cristæ auritæ albidæ fasciis sex fuscis.*

- Scops. 5. S. capite auriculato penna solitaria.  
 Scops. *Aldr. orn. l. 8. c. 4. Raj. av. 25. Will. orn. 63. t. 12. Briss. av. 1. p. 495. t. 37. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*

\* \* *Inauriculatæ.*

- Nyctea. 6. S. capite lævi, corpore albido maculis lunatis distantibus fuscis. *Faun. svec. 76. \**  
 Aluco albus diurnus. *Edw. av. 61. t. 61. Briss. av. 1. p. 522.*  
*Habitat in Lapponia & America septentrionali.*  
*Hyeme evadit sæpius immaculata nivea.*

- Aluco. 7. S. capite lævi, corpore ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus ferratis. *Faun. svec. 72. It. all. 69. \**  
 Strix cinerea. *Raj. av. 26. n. 3.*  
 Noctua major. *Frisch. av. t. 94.*  
 Ulula. *Gesn. av. 773. Aldr. orn. 1. p. 540. Will. orn. 68. t. 13. Briss. av. 1. p. 507. Penn. brit. t. B. 1.*  
*Habitat in Europa.*

- flammea. 8. S. capite lævi, corpore luteo punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus.  
 Strix capite lævi, corpore luteo. *Fn. svec.* 73.  
 Noctua guttata. *Frisch. av.* 97.  
 Aluco minor. *Aldr. orn.* 1. p. 536, 538. *Will. orn.* 67. t. 13. *Raj. av.* 25. *Briun orn.* 17.  
 Ululæ genus alterum. *Gesn. av.* 765.  
*Habitat in Europa.*
- stridula. 9. S. capite lævi, corpore ferrugineo, remige tertio longiore. *Faun. svec.* 77.  
 Strix. *Gesn. av.* 738. *Aldr. orn.* 561. t. 563. *Will. orn.* 65. *Raj. av.* 25. *Briss. av.* 1. p. 500.  
 Noctua major. *Frisch. av.* 95.  
*Habitat in Europa; viçtitat Muribus, Vespertilionibus.*
- Ulula. 10. S. capite lævi, corpore supra fusco-albo maculato, reëtricibus fasciis linearibus albis. *Fn. svec.* 78.\*  
 Noctua major. *Briss. av.* 1. p. 511.  
 Noctua *Will. orn.* 1. t. 13. *Alb. av.* 3. t. 7.  
 Noctua saxatilis. *Gesn. av.* 622. *Aldr. orn.* 1. p. 545.  
 Ulula flammeata. *Frisch. av.* t. 98.  
*Habitat in Europa.*
- funerea. 11. S. capite lævi, corpore fusco, iridibus flavis. *Fn. svec.* 75.\*  
 Strix canadensis. *Briss. av.* 1. p. 518. t. 37. f. 2.  
*Habitat in Europa & America septentrionali.*  
 Corpus supra fuscum maculis albis. Caput supra atrum punctis albis. Rostrum supra album. Pectus & Abdomen albida fasciis linearibus transversis. Remiges 5 primores interiores ad marginem anteriorem non albo maculatæ. Rectrices, fasciis angustis albidis: intermediis vix apice albescentibus.
- passerina. 12. S. capite lævi, remigibus maculis albis quinque ordinum. *Fn. svec.* 79.\*  
 Noctua minor. *Briss. av.* 1. p. 514.  
 Noctua minima. *Gesn. av.* 620. *Aldr. orn.* 1. p. 543 t. 544. *Will. orn.* 69. t. 13. *Raj. av.* 26. n. 6. *Alb av.* 2. p. 12. t. 12. *Frisch. av.* t. 100. *Edw. av.* 39. t. 228.  
*Habitat in Europa, viçtitat Vespertilionibus, Gryllis Magnitudo Passeris.*



44. LANIUS. *Rostrum* rectiusculum , dente utrinque  
versus apicem , basi  
nudum.

*Lingua* lacera.

- forfica- 1. L. cauda forficata , crista frontali erecta , corpore  
tus, nigro-viridante.  
Musciapa madagascariensis nigra major cristata. *Briss.*  
av. 2. p. 388. t. 37. f. 4.  
*Habitat in Madagascar.*  
Crista ad basin rostri erecta. Cauda admodum longa.
- cærule- 2. L. cauda forficata , corpore nigro-cærulescente , ab-  
scens, domine albo.  
Lanius cauda forficata. *Edw. av. 56. t. 56. Briss. av.*  
2. p. 189.  
*Habitat in Bengala.*
- cristatus. 3. L. cauda cuneiformi , capite cristato , corpore rufe-  
scente , subtus fulvo fuscoque undulato.  
Lanius fulvus cristatus. *Edw. av. 54. t. 54.*  
Lanius bengalensis rufus. *Briss. av. 2. p. 173.*  
*Habitat in Bengala.*
- canaden- 4. L. cauda cuneiformi , capite cristato , corpore rufe-  
fis, scente , subtus albido.  
Lanius canadensis. *Briss. av. 2. p. 171. t. 18. f. 3.*  
*Habitat in Canada.*  
*Remiges Rectricesque nigricantes marginibus albis.*
- macrou- 5. L. cauda cuneiformi longissima cærulescente , capite  
rus, cristato.  
Colius senegalensis cristatus. *Briss. av. 3. p. 306. t.*  
16. f. 3.  
*Habitat in Senegal.*
- ludovici- 6. L. cauda cuneiformi cinereus , remigibus nigris basi  
anus, rectoribusque apice albis.  
Lanius ludovicianus. *Briss. av. 2. p. 162. t. 15. f. 2.*  
*Habitat in Ludovicia.*

*Fascia*

Lanii accedunt Accipitribus laniens, Picis moribus , Passeribus statura , adeoque tanquam inter hos medii.

*Fascia sub oculis nigra. Rectrices mediae 6, 6, totae nigrae, reliquae basi apiceque albæ. Remiges secundariae apice albæ.*

Nengeta. 7. L. cauda cuneiformi apice alba, corpore cinereo subtus albido.

Cotinga cinerea. *Briss. av. 2. p. 353.*

Pica grisea brasiliensis. *Edw. av. 231. t. 318.*

Guiaru Nheengeta. *Marcgr. bras. 209. Will. orn. 170. Raj. av. 166. n. 5.*

*Habitat in Brasilia.*

curvirostris. 8. L. cauda cuneiformi, corpore albo, dorso nigro, remigibus primoribus quinque macula alba.

Collurio madagascariensis. *Briss. av. 2. p. 191. t. 19. f. 1.*

*Habitat in Madagascar.*

Mandibulae inferioris apex reflexus, uti superioris.

Occiput nigro-virescens. Rectrices medietate interiore cinereæ, exteriori nigrae, apice albo.

collaris. 9. L. cauda cuneiformi, corpore nigro, subtus albo, remigibus primoribus basi albis.

Lanius capitis b. spei. *Briss. av. 2. p. 182. t. 15. f. 1.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Rectrices apice albæ exceptis intermediis.*

lucionensis. 10. L. cauda cuneiformi, macula aurium nigra, rectricibus rufescentibus apice fusco-fasciatis.

Lanius lucionensis. *Briss. av. 2. p. 169. t. 18. f. 1.*

*Habitat in insula Lucionensi.*

Corpus griseo-rufescens; subtus albido - rufescens.

Excubitor. 11. L. cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. *Fn. svec. 80. \**

Ampelis cærulescens, alis caudaque nigricantibus. *Fn. svec. 1. n. 181.*

Lanius cinereus major. *Gesn. av. 579. Aldr. orn. 1.*

*p. 384. t. 386. Will. orn. 53. t. 10, Raj. av. 18.*

*Alb. av. 2. p. 13. t. 13. Briss. av. 2. p. 141.*

Pica cinerea. *Frisch. av. t. 59.*

*Habitat in Europa. Accipitres adventantes observat, ♂ aviculis indicat.*



Collurio. 12. *L. cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.*  
*Fn. svec. 81. \* Pen. brit. t. C. f. 1.*

*Ampelis dorso griseo, macula ad oculos longitudinali.* *Fn. svec. 1. n. 180. t. 2. f. 180.*

*Lanius tertius.* *Will. orn. 54. Raj. av. 18. Alb. av. 2. p. 14. t. 14. 15.*

*Lanius Collurio.* *Briss. av. 2. p. 152.*

*Lanius rufus.* *Briss. av. 2. p. 147.*

*Pica media Lanius medius.* *Frisch. av. t. 60.*

*Habitat in Europa. Scarabæos Pruno spinosa perforat; cerebra avicularum effodit, earum Simia.*

Tyrannus. 13. *L. cinereus subtus albus, vertice nigro: stria longitudinali fulva.*

*Muscicapa corona rubra.* *Catesb. car. 1. p. 55. t. 55.*

*Muscicapa tyrannus.* *Briss. av. 2. p. 391.*

*Pica americana cristata.* *Frisch. av. 4. t. 62.*

*Habitat in America septentrionali. Mas omnes aves, etiam Accipitres, dum femina incubat, procul a nido discedere cogit; in cavis arborum nidificat.*

*Color obscure cinereus, abdomine albo. Rectrices fuscae marginibus rufis. Capitis stria verticalis longitudinalis e pennis fulvis apice nigricantibus.*

Schach. 14. *L. lutescens fronte alisque nigris.*

*Lanius A-schack.* *Osb. iter. 227.*

*Habitat in China. P. Osbeck.*

*Magnitudo præcedentium. Caput & Collum supra griseum. Collum subtus testaceo-albidum. Dorsum & Abdomen pallide testacea. Remiges nigrae; primores basi albæ; secundariæ apice albicantes.*

Pitangva. 15. *L. niger subtus flavus, vertice stria fulva, fascia oculari alba.*

*Muscicapa tyrannus brasiliensis.* *Briss. av. 2. p. 401. t. 36. f. 5.*

*Pitangva guacu.* *Marcgr. bras. 216. Will. orn. 146. Raj. av. 165.*

*Habitat in Brasilia.*

*Alæ subtus & Abdomen flavissima.*

doliatus. 16. *L. cauda rotundata, corpore albo nigroque confertim subfasciato.* *Mus. Ad. Fr. 2. p. 12. \**

*Lanius cayanensis. striatus.* *Briss. av. 2. p. 187. t. 29. f. 3. Edw. av. 5. p. 35. t. 226.*

*Habitat in America meridionali.*

*Capitis pennæ longiores albæ apice nigræ, quas dum erigit cristatus.*

- rufus. 17. *L. rufus*, subtus albus, capite nigro-virescente. *Lanius madagascariensis rufus.* *Briss. av. 2. p. 178. t. 18. f. 4.*  
*Habitat in Madagascar.*
- barbarus. 18. *L. niger*, subtus ruber, vertice femoribusque fulvis. *Briss. av. 2. p. 185. t. 17. f. 2.*  
*Habitat in Senegal.*  
*Remiges Rectricesque nigræ.*
- fulphu- 19. *L. fuscus*, subtus flavus, capite nigricante: fascia  
ratus. ambiente albida.  
*Lanius cayanensis luteus.* *Briss. av. 2. p. 176. t. 16. f. 4.*  
*Habitat in Cayania.*
- cayanus. 20. *L. cinereus*, capite remigibus rectricibusque primoribus nigris.  
*Lanius cayanensis.* *Briss. av. 2. p. 158, 160. t. 14. f. 1, 2.*  
*Habitat in Cayania.*
- Senega- 21. *L. griseus*, subtus albidus, vertice fasciaque oculari  
lus. nigris, rectricibus nigris apice albis.  
*Lanius senegalensis cinereus.* *Briss. av. 2. p. 167. t. 17. f. 1.*  
*Habitat in Senegal.*  
*Remiges latere exteriori rufæ. Rectrices 66. obsolete fusco-fasciatæ, apice concolores.*
- madaga- 22. *L. cinereus*, subtus albidus, loris nigris, rectricibus  
scariensis. rufescentibus.  
*Lanius madagascariensis minor.* *Briss. av. 2. p. 264. t. 16. f. 1, 2.*  
*Magnitudo Passeris. Macula nigra utrinque inter nares & oculos. Alarum rectrices superiores rufæ. Rectrices maximam partem rufæ. Mas gula juguloque nigro.*
- Eméria. 23. *L. griseus* subtus albus, temporibus uropygioque rubris.  
*Lanius bengalensis fuscus.* *Briss. av. 2. p. 175.*



*Ruticilia bengalensis*. *Edw. av. 4. p. 190. t. 190.*  
*Alb. av. 3. p. 24. t. 56.*  
*Habitat in Bengala.*

*jocosus*. 24. *L. cauda rotundata, corpore griseo, palpebra inferiore purpurea, ano sanguineo. Amoen. acad. 4. p. 238.*  
*Merula sinensis cristata minor. Briss. av. 2. p. 455.*  
*t. 21. f. 2.*

*Habitat in China. Osbeck.*

*Caput nigrum. Gula alba. Abdomen albicans.*

*Rostrum rectius quam in reliquis, sed utrinque intra apicem emarginatum.*

*infaustus*. 25. *L. dorso cinereo: rectricibus rufis: intermediis duabus cinereis fascia nigricante, cauda rotundata.*

*Corvus infaustus. Fn. svec. 93. \**

*Merula saxatilis. Gesn. av. 732. Will. orn. 145. t. 36. Raj. av. 68. Alb. av. 3. p. 51. t. 55. Briss. av. 2. p. 238.*

*Habitat in Europæ sylvis desertis, alpinis; protervax avis, comessantes peregrinatores sæpe adiens, carnesque disjectas rapiens.*

*Rostrum emarginatum utrinque; Pennarum radii laxius ut in L. jocosus, moresque hoc genus indicant, quamvis rostri basis pennis recumbentibus testata, ut in Corvis.*

*faustus*. 26. *L. griseus, subtus ferrugineus, lineola alba pone oculos, cauda rotundata. Amoen. acad. 4. p. 241. \**

*Habitat in China.*

*Plumis laxissimis cum L. infausto convenit.*

II. P I C Æ

*Rostrum subcompressum, convexum.*

45. PSITTACUS. *Rostrum* aduncum: mandibula superiore mobili cera instructa. *Nares* in *Rostr*i basi. *Lingua* carnosa, obtusa, integra. *Pedes* scanforii.

\* *Macrouri cauda cuneiformi.*

Macao. 1. P. macrourus ruber, remigibus supra cæruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis.

Psittacus maximus alter. Aldr. orn. 1. p. 665. t. 666.

Will. orn. 73. Raj. av. 29.

Psittacus ruber & cæruleus. Edw. av. 158. t. 158.

Psittacus Ara brasiliensis. Briss. av. 4. p. 184. t. 19, f. 1.

Psittacus major de macao. Alb. av. 1. p. 11. t. 11.

Psittacus erythroxanthus. Gesn. av. 721. Aldr. orn. 1. p. 683.

Araracanga. Marcgr. bras. 206.

Habitat in America meridionali.

Corpus magnitudine Gallinæ, coccineum. *Rostr*i maxilla superior alba; inferior nigra. Tempora nuda, alba, rugosa. Remiges imprimis exteriores cæruleæ: rectricibus pluribus luteis. Cauda cuneiformis, longissima. Rectrices rubræ, lateralibus cæruleis.

militaris. 2. P. macrourus viridis, alis cæruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis lineis plumosis.

Habitat in . . .

Corpus viride. Alæ & Uropygium cærulea. Cauda rubra, cuneata, apicibus rectricum cæruleis. Frons rubra. Rostrum nigrum.

Ararau- 3. P. macrourus supra cæruleus subtus luteus, genis nudis: lineis plumosis.

Psitt-

*Psittacis omnibus proprium, quod eis Lingua latior, quam ceteris avibus. Plin.*



*Psittacus maximus cyano-croceus.* Aldr. orn. I. p. 664. Will. orn. 110. t. 15. Raj. av. 28. 181. Sloan. jam. 2. p. 296. Edw. av. 159. t. 159.

*Psittacus Ara brasiliensis cyano-crocea.* Briss. av. 4. p. 193. t. 20.

Ararauna. Marcgr. bras. 206. Will. orn. 111. Alb. av. 3. p. 10. t. 10. fem. ♂ 2. p. 16. t. 17. mas.

*Habitat in America meridionali.*

*Cærulea supra Collum, Dorsum, Alas, Caudam. Subtus Collo, Pectore, Abdomine, Cauda Lutea feminae, s. Rubra Maris. Nigra Rostrum ♂ Gula. Palpebræ serratæ papillis nigris. Tempora nuda, lineata punctis plumosis cæruleo-nigris.*

obscurus. 4. *P. macrourus fuscus*, genis nudis rubris, vertice cinereo-nigrescente vario, cauda cinerea. Hasselq. iter. 236.

*Psittacus masearinus.* Briss. av. 4. p. 315.

*Habitat in Africa.*

*Capistrum nigrum.*

nobilis. 5. *P. macrourus viridis*, genis nudis, humeris coccineis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 13. \*

*Psittacus viridis*, alarum costa superne rubente. Aldr. orn. 668. t. 669. Raj. av. 30, 181. Sloan. jam. 2. p. 297.

*Psittacus amazonicus.* Briss. av. 4. p. 276.

*Psittacus mediæ magnitudinis.* Will. orn. 112. t. 16.

*Habitat in Asia.*

severus. 6. *P. macrourus viridis*, genis nudis, remigibus rectricibusque cæruleis subtus purpurascens. Mus. Ad. Fr. 1. p. 13.

*Psittacus Ara brasiliensis viridis.* Briss. av. 4. p. 198.

Maracana. Marcgr. bras. 207. Will. orn. 112. Raj. av. 29. n. 5. Sloan. jam. 2. p. 297. Edw. av. 41. t. 229.

*Habitat in America.*

\* \* *Macrouri* : Minores.

Eupatria. 7. *P. macrourus viridis*, genis nudis, humeris coccineis. Mus. Ad. Fr. 2. p.

*Psittaca ginginiana.* Briss. av. 4. p. 343.

*Habitat* . . .

- japoni- 8. *P. macrourus viridis*, subtus rectricibusque lateralibus  
cus. ruber, remigibus cæruleis.  
*Psittacus erythrochlorus macrourus*. *Aldr. orn.* 1. p.  
678. t. 681. *Will. orn.* 77. *Raj. av.* 34. n. 3.  
*Psittaca japonensis*. *Briss. av.* 4. p. 362.  
*Habitat in Japonia*.  
*Macula cærulea ante & pone oculum*.
- amboi- 9. *P. macrourus coccineus*, dorso cæruleo, alis macu-  
nensis. la viridi.  
*Psittaca amboinensis coccinea*. *Briss. av.* 4. p. 378. t.  
28. f. 2.  
*Habitat in Amboina*.  
*Rostrum rubicundum; Rectrices 2 extimæ interius rubro*  
*marginatæ*.
- cyanoce- 10. *P. macrourus viridis*, capite gulaque cæruleis.  
phalus. *Psittaca cyanocephala*. *Briss. av.* 4. p. 359. t. 19.  
f. 2.  
*Habitat in India orientali*.  
*Subtus viridi-flavicans, uti etiam in alis passim*.
- borneus. 11. *P. macrourus ruber*, remigibus rectricibusque apice  
viridibus, alis macula cærulea, orbitis fuscis.  
*Psittacus coccineus*, cauda longiore. *Edw. av.* 173.  
t. 173.  
*Psittaca fortunarum insulæ*. *Briss. av.* 4. p. 373.  
*Habitat in India: Borneo*.
- solstitia- 12. *P. macrourus luteus*, alarum tectricibus viridibus,  
lis. orbitis rubris, rectricibus lateralibus extus cæruleis.  
*Psittacus angolensis*. *Alb. av.* 3. p. 13. t. 13.  
*Psittacus luteus*, cauda longa. *Frisch. av.* t. 53.  
*Psittaca angolensis lutea*. *Briss. av.* 4. p. 371.  
*Habitat in Guinea, Angola*.
- caroli- 13. *P. macrourus viridis*, capite collo genibusque luteis.  
nensis. *Psittacus carolinensis*. *Catesb. car.* 1. p. 11. t. 11.  
*Briss. av.* 4. p. 350.  
*Habitat in Carolina, Virginia*.
- Alexan- 14. *P. macrourus viridis*, collari pectoreque rubro, gula  
dri. nigra. *Amoen. acad.* 4. p. 236. *Mus. Ad. Fr.* 2.  
p. 14. \*



*Psittacus cubicularius*, cauda cuneiformi, digito inferiore postico mutico. *Haselq. itin.* 235.

*Psittacus javanicus*. *Osb. itin.* 101.

*Psittacus torquatus macrourus antiquorum*. *Aldr. av.*

1. p. 678. *Will. orn.* 77. t. 16. f. 3. *Raj, av.* 33.

*Edw. av. t.* 292. f. 1.

*Psittaca torquata*. *Briss. av.* 4. p. 323.

*Perrocello*. *Olin. av.* 24. t. 24.

*Habitat in China, Bengala, Æthiopia.*

Conf. β. *Psittacus viridis ex India orientali*. *Alb. av.*

2. t. 18.

*Psittaca indica torquata*. *Briss. av.* 4. p. 326.

γ. *Psittaca borbonica torquata*. *Briss. av.* 4. p. 328.

t. 27. f. 1.

δ. *Psittacula cyanocephalos indica*. *Briss. app.* 129.

*Psittacus minor capite cæruleo*. *Edw. av.* 175. t. 292.

*Primus (totus viridis torque miniato) innotuit sub expeditione Alexandri magni. Plin.*

pertinax. 15. *P. macrourus viridis*, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 14.

*Psittacus minor viridis*, cauda longa & malis croceis.

*Frisch. av.* 4. t. 54.

*Psittacus fauce lucida*. *Edw. av.* 49. t. 234.

*Psittaca illiniaca*. *Briss. av.* 4. p. 353.

*Tui-apute-juba* 2. *Marcgr. bras.* 206. *Raj. av.* 34,

181.

*Habitat in America.*

canicula- 16. *P. macrourus viridis*, fronte rubra, occipite remigibusque extimis cæruleis, orbitis fulvis.

*Psittacus capite rubro cæruleoque*. *Edw. av.* 176. t. 176.

*Psittaca brasiliensis*. *Briss. av.* 4. p. 339.

*Tui-apute-juba*. *Marcgr. bras.* 206. n. 2. *Raj. av.*

34. *Will. orn.* 116.

*Habitat in America.*

*Magnitudo Turdi. Cauda corpore longior.*

ærugino- 17. *P. macrourus viridis*, vertice remigibusque primoribus cæruleis, orbitis cinereis.

*Psittacus minor*, gutture fusco, occidentalis. *Edw. av.* 177. t. 177.

*Psittaca martinica*. *Briss. av.* p. 356.

*Habitat in America.*  
*Cauda corpore brevior.*

- rufiro-  
stris. 18. *P. macrourus viridis*, rostro pedibusque rubris, re-  
ctricibus apice cæruleiscentibus, orbitis incarnatis.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 13. \**  
*Psittacus minor macrourus totus viridis.* *Aldr. orn.*  
*1. p. 678. Will. orn. 77. Raj. av. 33. Sloan.*  
*jam. 2. p. 297.*  
*Psittacus minor viridis, cauda longiore.* *Edw. av. 175.*  
*t. 175.*  
*Psittaca.* *Briss. av. 4. p. 319.*  
*Habitat in America.*  
*Parvus est.*
- ornatus. 19. *P. macrourus luteo-viridis*, occipite gula pectoreque  
rubris, vertice auribusque cæruleis, orbitis cinereis.  
*Psittacus minor e coccineo viridis.* *Edw. av. 174. t.*  
*174.*  
*Psittaca indica varia.* *Briss. av. p. 366.*  
*Avis paradisiaca orientalis elegantissima.* *Seb. mus. 1.*  
*t. 60. f. 2, 3.*  
*Habitat in Asia.*
- agilis. 20. *P. submacrourus viridis*, tectricibus remigum primo-  
rum cæruleiscentium fulvis, cauda subtus rubra, or-  
bitis cinereis.  
*Psittacus minor viridis.* *Edw. av. 168. t. 168.*  
*Psittacus cayanensis.* *Briss. av. 4. p. 237.*  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo Coccythraustis. Cauda cuneiformis, sed non*  
*elongata.*
- \* \* \* *Brachyuri cauda æquali.*
- corona-  
tus. 21. *P. brachyurus viridis*: crista plicatili rubra apice cæ-  
rulea.  
*Habitat in Surinamo.*  
*Magnitudo Ps. cristati. Frons flava. Crista speciosa,*  
*coccinea apicibus lucide cæruleis. Rectrices extimæ*  
*latere exteriori cæruleæ. Crissum rubrum pennarum*  
*apicibus cæruleis.*
- cristatus. 22. *P. brachyurus albus* crista plicatili flava.  
*Psittacus albus cristatus.* *Aldr. orn. l. 11. c. 4. Will.*  
*orn.*



orn. - - *Raj. av. 30. Seb. mus. 1. p. 94. t. 59. f. 11.*  
*Alb. av. 3. p. 12. t. 12. Edw. av. 160. t. 160.*  
*Frisch. av. 4. t. 50.*

*Cacatua. Briss. av. 4. p. 204. t. 21.*

*Habitat in China.*

*Confer album minorem. Edw. t. 317. ♂ nigrum*  
*Edw. t. 316.*

*Crista plicatilis Upupæ, tegens verticis calvitium pennarum*  
*duplici serie sed alternatim connivente imbricatis, quæ*  
*erigit affectu quovis excitata; hæc crista aliis subtilius*  
*flavesceus, aliis rufescens. Pennæ, palpatæ ave, innu-*  
*quant farina manus.*

erythro- 23. *P. brachyurus cinereus, uropygio rectricibus remi-*  
 leucus. *gibusque coccineis. †*

*Psittacus erythroleucus. Aldr. orn. 1. p. 675. Willm.*  
*orn. 76. Raj. av. 31. n. 7.*

*Cacatua alis & cauda rubris. Briss. av. 4. p. 214.*

*Habitat - - -*

*Magnitudo Gallinæ.*

erithacus. 24. *P. brachyurus canus, temporibus nudis albis, cauda*  
*da coccinea. Mus. Ad. Fr. 1. p. 14.*

*Psittacus cinereus s. subcæruleus. Aldr. orn. 1. p. 675*  
*t. 676. Raj. av. 31. n. 8. Alb. av. 1. a 12. t. 12.*  
*Frisch. av. 4. t. 51. Briss. av. 4. p. 310.*

*Habitat in Guinea, Jamaica.*

*Hic loquax varias modulatur gutture voces*  
*Scurrili strepitu, quidquid ♂ audit, ait.*

garrulus. 25. *P. brachyurus ruber, orbitis cinereis, genibus aliss*  
*que viridibus, rectricibus medietate postica cæruleis*  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 14.\**

*Psittacus ruber, remigibus rectricibusque introrsum*  
*purpureis. It. wgoth. 137.*

*Psittacus rufus, femoribus & alis viridibus. Frisch.*  
*av. 4. t. 45.*

*Psittacus coccineus, alis e viridi & nigro variis. Edw.*  
*av. 172. t. 172.*

*Psittacus Lory. Raj. av. 151.*

*Psittacus lorius ceramensis. Briss. av. 4. p. 215.*

β. *Psittacus auroræ brachyurus coccineus, alis viridibus*  
*nigrisque, rectricibus flavis medietate postica vireis*  
*centibus. Syst. nat. 10. n. 22.*

Psittacus coccineus orientalis , alis ex viridi & nigro variis. *Raj. av. 31.*

γ. Lorius moluccensis. *Briss. av. 4. p. 219. t. 33. f. 1.*  
*Habitat in India orientali..*

Corpus coccineum , magnitudine Turdi. Alarum rectrices virides. Remiges nigræ margine exteriori viridi ; subtus purpurascens. Annulus viridis supra genua. Pedes nigri. Rostrum flavum. *Raj.*

Domi- 26. P. brachyurus ruber , pileo violaceo , alis viridibus,  
cella. humeris genibusque cæruleis , orbitis fuscis.

Psittacus coccineus orientalis, vertice nigro. *Edw. av. 171. t. 171.*

Psittacus lorius orient. indicus. *Briss. av. 4. p. 222. t. 24. f. 1.*

Psittacus rufus , vertice nigro , alis viridibus , femoribus cæruleis. *Frisch. av. t. 44.*

*Habitat in Asia.*

Lory. 27. P. brachyurus purpureus, pileo violaceo, alis viridibus , pectore genibus caudaque cæruleis , orbitis subincarnatis.

Psittacus coccineus orientalis, vertice nigro. *Edw. av. 170. t. 170*

Psittacus lorius philippensis. *Briss. av. 4. p. 225. t. 23. f. 2.*

*Habitat in India orientali.*

cæculo- 28. P. brachyurus cæruleus , ventre uropygio cauda-  
cephalus. que viridibus , vertice flavo , remigibus rectricibusque rubris.

Psittacus versicolor s. erythrocyaneus. *Aldr. orn. 1. p. 675. Will. orn. 75. Raj. av. 31.*

Psittacus guianensis cæruleus. *Briss. av. 4. p. 304.*  
*Habitat in Guiana.*

niger. 29. P. cauda elongata æquali , corpore cærulescenti-nigro , rostro orbitisque albidis.

Psittacus niger. *Edw. av. 5. t. 5.*

Psittacus madagascariensis niger. *Briss. av. 4. p. 317.*  
*Habitat in Madagascar.*

*Cauda longa , sed æqualis.*

leucoce- 30. P. brachyurus viridis , remigibus cæruleis fronte  
phalus alba , orbitis niveis.



*Psittacus leucocephalus*. Aldr. orn. 1. p. 670. Raj.  
av. 31.

*Psittacus viridis*, fronte alba collo rubro. Frisch.  
av. 4. t. 46.

*Psittacus martinicanus*. Briss. av. 4. p. 242.

*Psittacus viridis*, capite albo. Edw. av. 166. t. 166.

*Pappagallo*. Olin. av. 23.

*Habitat in America.*

Corpus magnitudine Cuculi, viride pennis margine nigris. Caput supra ♂ ad latera cæruleum; fronte oculorumque regione alba. Gula tota rubra. Remigess nigræ latere exteriori denudato cæruleæ. Rectricess æquales, virides, basi rubræ apice flavescences; att 1, 1 latere exteriori cæruleo; 6, 6 unicolores. Abdomen postice ferrugineum.

lucionen- 31. *P. brachyurus viridis* occipite uropygioque cærule-  
fis. is, alis nigro cæruleo rubroque notatis.

*Psittacus lucionensis*. Briss. av. 4. p. 295. t. 22. f. 21.

*Habitat in Philippinis insulis.*

æstivus. 32. *P. brachyurus viridis* luteo submaculatus, fronte cæ-  
rulea, humeris sanguineis, orbitis incarnatis.

*Psittacus viridis melanorhynchos*. Aldr. av. l. 11. c.  
7. Raj. av. 30.

*Psittacus major viridis*, maculis luteis & rubris. Frisch.  
av. 49.

*Psittacus amazonicus varius*. Briss. av. 4. p. 281. t.  
26. f. 2.

*Psittacus* 2 species. Marcgr. bras. 205. Will. orna  
76. Raj. av. 33. n. 2.

*Psittacus viridis major occidentalis*. Edw. av. 162. t.  
162.

*Psittacus viridis*, capite luteo, fronte cærulea. Frisch.  
av. 4. t. 47.

*Psittacus amazonicus*. Briss. av. 4. p. 256.

*Ajurucutau* 1. Marcgr. bras. 205. Raj. av. 32.

*Habitat in America.*

Corpus magnitudine Columbæ, viride, dorso adperso  
pennis fulvis. Facies flava. Frons cærulea. Verne  
tex albidus. Rectrices virides apice pallidiores; r

2, 3.

*Psittaci monogami, per paria incedunt, garruli, loquaces, meditabundi, dociles, longævi; viçant imprimis nucibus, glandibus, seminibus Cucurbitæ Carthæni; scandunt rostro, irati pennas erigunt; Avium Simiæ.*

2, 3 basi interiore rubræ; at 1 etiam latere exteriore cærulea. Humeri fulvi s. sanguinei. Remiges primores nigræ apice cærulescentes, latere interiore nigræ, exteriore virides; secundariæ anteriores latere exteriore versus basin rubræ. Rostrum nigrum. Adeoque omnes colores: albus, flavus, fulvus, ruber, viridis duplex, cæruleus, niger.

amazoni- 33. P. brachyurus subvirescens, fronte flava, temporibus fulvis.

Psittacus amazonicus. Briss. av. 4. p. 257.

Psittacus viridis, capite luteo, fronte cærulea. Frisch. av. t. 47.

Ajurucurau 2. Marcgr. bras. 205. Will. orn. 76. Raj. av. 33.

Habitat in Surinamo.

Affinis Ps. æstivo, sed duplo major. Remiges exteriores cæuleæ, medio rubræ. Rectrices extimæ medio exteriore cæuleæ; laterales interiore latere rubræ.

paradisi. 34. P. brachyurus luteus, gula ventre rectricumque basi rubris.

Psittacus paradisi ex cuba. Catesb. car. 1. p. 10. t. 10,

Psittacus luteus insulæ cubæ. Briss. av. 4. p. 308.

Habitat in America.

festivus. 35. P. brachyurus viridis, fronte purpurascens, superciliis gulaque cæuleis, dorso sanguineo.

Habitat in Indiis.

Corpus magnitudine Columbæ.

brasiliensis. 36. P. brachyurus viridis, facie rubra, temporibus cæuleis, orbitis cinereis.

Psittacus viridis brasiliensis. Edw. av. 161. t. 161.

Psittacus brasiliensis, fronte rubra. Briss. av. 4. p. 254.

Habitat in Brasilia.

Avis viridis flavo contaminata. Rubrum infra flexuram alæ & in exteriore latere recticum 2, 2; cæuleum in latere exteriore remigum rectricumque primorum.

autumnalis. 37. P. brachyurus viridis, fronte remigumque macula coccinea, vertice remigibusque primoribus cæuleis.



*Psittacus viridis minor occidentalis.* *Edw. av. 164. t. 164.*

*Psittacus americanus.* *Briss. av. 4. p. 293.*

*Habitat in America.*

*Magnitudo Columbæ.* Corpus viride. Oculorum regio cærulea. Alarum tectrices primores cæruleæ, basi rubræ. Remiges primores cæruleæ, posteriores virides. Rectrices supra virides, apice flavescentes, extimo latere exteriori cæruleo; subtus flavæ, basi rufescentes, medio macula viridi.

accipitri- 38. *P. subbrachyurus viridis*, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo vario, remigibus rectricibusque apice cæruleis.

*Psittacus orientalis capite accipitris.* *Edw. av. 165. t. 165.*

*Psittacus elegans.* *Clus. exot., 365. Raj. av. 32. Will. orn.*

*Psittacus varius indicus.* *Briss. av. 4. p. 300.*

*Habitat in India.*

*Similis P. menstru*, sed crissum non est rubrum, orbitæ fusce.

menstru- 39. *P. brachyurus viridis*, capite cærulescente, crisso rubro.

*Psittacus guianensis cyanocephalus.* *Briss. av. 4. p. 247. Edw. av. t. 314.*

*Habitat in Surinamo.* *D. D. Bierchén. Vox Monedula.*

Corpus magnitudine *Turturis*. Caput Collumque cærulescens pennis fuscis, apice cæruleis. Dorsum alæque virides. Tectrices alarum flavescenti-virides. Abdomen virens pennarum apicibus cærulescentibus. Remiges virides, interiore margine fusce. Rectrices virides, apice cærulescentes, sed 1, 2, 3 interiore latere a basi ad medium, sanguineæ; exteriori latere toto cæruleæ. Crissum rubrum apicibus pennarum flavescenti-cæruleis. Rostrum corneum: mandibula superiore lateribus fulva. Oculi nigri. Orbitæ cæruleo-canescentes.

sordidus: 40. *P. brachyurus subfuscus*, gula cærulea, alis caudaque viridibus, rostro crissoque rubris.

*Psittacus novæ hispaniæ.* *Briss. av. 4. p. 303.*

*Psittacus fuscus.* *Edw. av. 167. t. 167.*

*Habitat in Mexico.*

melano- 41. *P. brachyurus viridis*, subtus luteus, pileo nigro, cephalus. pectore albo, orbitis incarnatis. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 15. \*

*Psittacus coccineus*, ventre albo. *Edw. av.* 169. t. 169.

*Psittacus mexicanus*, pectore albo. *Briss. av.* 4. p. 297.

*Habitat in Mexico.*

collarius. 42. *P. brachyurus viridis*, gula rubente.

*Psittacus minor*, collo miniaceo. *Sloan. jam.* 2. p. 297. *Raj. av.* 181.

*Psittacus jamaicensis*, gutture rubro. *Briss. av.* 4. p. 241.

*Habitat in America.*

Senega- 43. *P. brachyurus viridis*, subtus luteus, capite cinereo, lus. orbitis oculorum nigris nudis.

*Psittacula senegalensis*. *Briss. av.* 4. p. 400. t. 23. f. 2. *Habitat in Senegal.*

*Rectrices cinereæ, versus apicem virides evadentes.*

chryso- 44. *P. brachyurus viridis*, alis macula cærulea fulvaque, pterus. orbitis nudis albis.

*Psittacus minor*, alis aureis. *Edw. av.* 177. t. 293. f. 2.

*Psittacula alis deauratis*. *Briss. av. app.* 130.

*Habitat in India.*

*Remiges primores quatuor cæruleæ, at 5 - 8. externe, fulvæ.*

pullarius. 45. *P. brachyurus viridis*, fronte rubra, cauda fulva fascia nigra, orbitis cinereis. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 15. \*

*Psittacus parvus viridis*, ex india orientali. *Alb. av.* 3. p. 15. t. 15.

*Psittacus minimus viridis*, cum fronte & gula rubra. *Frisch. av.* 4. t. 54.

*Psittacus guineensis*. *Edw. av. t.* 237. f. 1.

*Psittacus pusillus viridis æthiopicus*. *Raj. av.* 31.

*Psittacus minimus*. *Clus. exot.* 365.

*Psittacus minor versicolor*. *Seb. mus.* 2. p. 40. t. 40. f. 1.

*Psittacula guineensis*. *Briss. av.* 4. p. 387.

*Habitat in Asia, Æthiopia.*



Galgulus.

46. *P. brachyurus viridis*, uropygio pectoreque coccineis, vertice cæruleo *Amæn. acad.* 4. p. 236. *Osborn. itin.* 101. *Mus. Ad. Fr.* 16. \*

*Psittacus minor*, vertice sapphirino. *Edw. av.* t. 293. f. 1.

*Psittacula philippensis.* *Briss. av.* 4. p. 392. t. 30. f. 1.

*Avicula cechini.* *Aldr. orn.* l. 20. p. 560.

*Habitat in India.*

*Conf. Edw. t.* 6.

*Pede altero suspensus dormit.* *Plin. X.* 33. *Galgulos ipsos dependentes pedibus somnum capere confirmat, quia tutiores ita se sperent.*

passerinus.

47. *P. brachyurus luteo-virens*, macula alarum alisque subtus cæruleis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 14. & 2. p. 16. \*

*Psittacula brasiliensis.* *Briss. av.* 4. p. 51. 384.

*Psittacus.* *Edw. av.* 5. p. 51. t. 235.

*Habitat in America.*

*Conf. Edw. t.* 293. f. 2.

*Magnitudo Passeris.* *Remiges subtus & teñtrices alarum primariæ cæruleæ. Rostrum Pedesque flava.*

46. **RAMPHASTOS.** *Rostrum* maximum, inane, convexum, extrorsum ferratum: mandibulae utraque apice incurva.

*Nares* pone rostri basin.

*Lingua* pennacea.

*Pedes* scanforii plerisque.

viridis.

1. *R. viridis*, abdomine flavo, uropygio rubro.

*Tucana cajanensis viridis* *Briss. av.* 4. p. 423. t. 33. f. 1.

*Tucan pectore flavo.* *Edw. av.* 253. t. 329.

*Habitat in Cayana.*

piperivorus.

2. *R. viridis* antice niger, crisso femoribusque rubris.

*Tucana cajanensis torquata.* *Briss. av.* 4. p. 429. t. 32. f. 2.

*Tucan viridis.* *Edw. av.* 255. t. 330.

*Habi-*

*Habitat in Cayana.*

Rostrum nigrum basi rubra. Caput & Pectus nigra.

Aracari. 3. R. viridis, fascia abdominali, crisso uropygioque rubris, abdomine flavo.

Ramphastos rostro nigro, mandibula superiore lateribus alba basi triloba. *Syst. nat.* 1. p. 104.

Tucana brasiliensis viridis. *Briss. av.* 4. p. 426. t. 33. f. 2.

Aracari. *Marcgr. bras.* 217. *Will. orn.* 96. t. 22. *Raj. av.* 44.

*Habitat in America meridionali.*

Rostrum Mandibula superior dorso apiceque nigra, lateribus albicans, basi triloba ad nares, arcu albo ad radicem; inferior nigra. Caput, Alæ, Caudaque nigra. Pectus & Abdomen flava coccinaque cum macula nigra subrotunda in medio pectore; similisque macula transversalis ad initium ventris. Uropygium coccineum. Femora rufa. D. Jacquin.

piscivorus. 4. R. nigricans fascia abdominali crissoque rubris, uropygio albo.

Tucana f. Pica brasiliensis. *Edw. av.* t. 64.

Tucana brasiliensis gutture albo *Briss. av.* 4. p. 413.

Picus americanus. *Hern. mex.* 697.

Xochitenacatl tertia. *Raj. av.* 178.

*Habitat in America australi.*

Rostrum luteum macula coccinea in apice: mandibula inferior cærulea. Pedes cærulei. Nigra Pileus, Dorsum, Alæ, Cauda, Venter, Femora: Albida Tempora, Gula, Pectus, Uropygium. Rubra Fascia pectoralis & Crissum.

Tucanus. 5. R. nigricans, fascia abdominali crisso uropygioque flavis.

Ramphastos rostro rubro carina obtusa albida. *Syst. nat.* 1. p. 103.

Tucana. *Marcgr. bras.* 217.

Tucana rostro rubro. *Edw. av.* 238.

Tucana brasiliensis gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 419. t. 32. f. 1.

Toucan surin. niger ex albo flavo rubro mixta. *Pet.* 247. t. 44. f. 13.



*Habitat in America meridionali; visitans fructibus Muscæ.*

*Rostrum flavescens, versus basin fascia nigra. Collum subtus & Genæ albæ. Rectrices decem.*

picatus. 6. *R. nigricans*, pectore luteo, crisso rectricumque apicibus rubris, uropygio nigro.

*Ramphastos* rostro rubro apice nigro carina compressa. *Syst. nat.* 1. p. 103.

*Tucana*. *Briss. av.* 4. p. 408.

*Pica brasiliensis*. *Gesn. av.* 800. *Aldr. orn.* 1. p. 801.

*Will. orn.* 88. t. 20. *Raj. av.* 44.

*Habitat in America meridionali.*

Abdomen & Crissum rectricumque apices coccineæ.

*Uropygium nigrum.*

dicolorus. 7. *R. nigricans*, pectore abdomine crisso uropygioque rubris, gula lutea.

*Tucana cayanensis*, gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 411. t. 31. f. 1.

*Tucan* pectore flavo. *Edw. av.* 330. t. 329.

*Habitat in Cayana.*

Momota. 8. *R. pedibus gressoriis*, rectricibus duabus intimis medio denudatis.

*Momot.* *Will. orn.* 298. *Raj. av.* 164. *Edw. av.* t. 328. *Briss. av.* 4. p. 465. t. 35. f. 3.

*Guira Guainumbi*. *Marcgr. bras.* 193. *Raj. av.* 49.

*Habitat in America meridionali; visitans carne cruda, cujus frustula in aqua macerat, rostro prehensa violentis ictibus verberat. Vox rauca tremula debilis.*  
*D. Jacquin.*

*Corpus magnitudine Merulæ splendide virescenti-fuscum, subtus flavescens. Caput majusculum: vertice nigro postice fascia cærulea. Frons & Tempora virescentia. Mystaces ad angulos oris longiores mobiles. Cauda longissima, cuneiformis: Rectricibus 2 mediis longioribus in medio (absque radiis) nudis. Rostrum mediocre, atrum. Pedes nigri digito tantum uno possico. Ungues adunci. Differt a præcedentibus Rostrum mediocri & pedibus non scansoriis; at lingua pennacea in rostro serrato vetat genus distinguere.*

47. BUCEROS. *Rostrum* convexum, curvatum, cultratum, magnum, extrorsum ferratum; *Frontis* calvaria nuda, osseo-gibbosa.

*Nares* pone rostri basin.

*Lingua* acuta, brevis.

*Pedes* gressorii.

bicornis. 1. B. fronte ossea plana antrorsum bicorni. *Amæn. acad.* 4. p. 237.

Calao. *Pet. gaz.* 43. t. 28. f. 6. ♂ t. 31. f. 1.

*Will. orn.* t. 17. f. 1. *Edw. av.* 2. p. 151. t. 281. f. D.

*Hydrocorax philippenis.* *Briss. av.* 4. p. 568.

*Habitat in China, Stratsunda.*

*Corpus* magnitudine *Gallinæ*, nigrum; subtus pectore, abdomine, femoribus album. *Macula* alba in remigibus alarum. *Cauda* longiuscula. *Rectrices* 10, nigrae, extimis 4 utrinque albis. *Pedes* virentes: digitis 3 anticis; 1 postico.

Hydrocorax. 2. B. fronte ossea plana antrorsum mutica, abdomine fulvo.

*Hydrocorax.* *Briss. av.* 4. p. 566. t. 45.

*Corvus indicus.* *Bont. jav.* 62. *Will. orn.* 86. t. 17. *Raj. av.* 40.

*Corvi marini* genus. *Clus. exot.* 106.

*Habitat in Moluccis.*

*Corpus* fuscum, subtus nigricans, *Abdomine* fulvo.

Rhinoceros. 3. B. cornu mandibulari frontis recurvato. †  
Rhinoceros. *Bont. jav.* 63. t. 64. *Olear. mus.* t.

15. f. 4. *Will. orn.* t. 17. f. 3. *Worm. mus.* 293.

*Aldr. orn.* 1. p. 84. *Best. mus.* t. 20. *Edw. av.* 2. p. 151. t. 281. f. B.

*Hydrocorax indicus.* *Briss. av.* 4. p. 571.

*Habitat in India.*

*Cum Willughbæus* alique *rostrum* extrorsum ferratum fistant, videtur *Ramphasti* potius generis avis esse. Fæda fætidaque cadaveribus visitans, venatores concomitans extenterata intestina ingurgitatura.



- nasutus. 4. B. fronte lævi, rectricibus basi apiceque albis.  
 Hydrocorax senegalensis melanorynchos. *Briss. av. 4.*  
*p. 573. t. 46. f. 1.*  
*Habitat in Senegalia.*  
*Corpus magnitudine Picæ.*  
*Conf. Hydrocorax senegalensis erythrorynchos. Briss.*  
*av. 4. p. 575. t. 46. f. 2. an solo sexu differens?*

48. BUPHAGA. Rostrum rectum, subquadrangulare: mandibulis gibbis, integris, extrorsum gibbosioribus. Pedes ambulatorii.

- africana. 1. BUPHAGA. *Briss. av. 2. p. 437. t. 42. f. 2.*  
*Habitat in Senegal; dorso Boum insidens extrahit Oc-*  
*strorum larvas.*  
*Corpus supra griseo - fuscum; subtus sordide flavicans.*  
*Cauda cuneiformis: Rectrices 12 acutæ, griseo-fuscae,*  
*lateralibus interius rufis.*

49. CROTOPHAGA. Rostrum compressum, semi-ovatum, arcuatum, dorso-fato-carinatum: Mandibula superiore margine utrinque angulata. Nares perviæ.

- Ani. 1. C. pedibus scanforiis.  
 Crotophagus ater, rostro breviori compresso arcuato-cultrato. *Brown. jam. 474. Briss. av. 4. p. 177. t. 18. f. 2.*  
 Monedula tota nigra major garrula, mandibula superiore arcuata. *Sloan. jam. 2. p. 298. t. 256. f. 1.*  
*Catesb. car. 3. p. 3. t. 3.*  
 Ani. *Marcgr. bras. 193. Will. orn. 120. Raj. av. 35. n. 10. ♂ 185. n. 29.*  
*Habitat in Africa, America. Nidificant in eodem ni-*  
*do amplissimo sæpe 50; visitant Gryllis, imprimis*  
*vero Acaris Ricinis in Bobus copiosissimis, ideoque*  
*acce-*

*accidentibus hisce Boves se prosternunt, ut Ricinos evellant, qui alias nimium multiplicarentur.*

*Corpus nigrum. Cauda longa, rotundata. Pedes gres-*  
*sorii, nec scanatorii. Mandibula superior apice in-*  
*curvata; dorso alte carinata carina arcuata. Nares*  
*ovatae. Lingua carnosae, integra. Rectrices 10. Pe-*  
*des scanatorii.*

ambula- 2. *C. pedibus ambulatoriis.*  
toria. *Habitat in Surinamo.*

*Simillima C. Ani, etiam rectricibus 10; sed pedes mi-*  
*nime scanatorii.*

50. **CORVUS.** *Rostrum convexum, cultratum.*  
*Nares pennae setaceae recumbentibus*  
*obtectae.*  
*Lingua cartilaginea bifida.*  
*Pedes ambulatorii.*

hotten- 1. *C. virescenti-ater, cauda æquali, mystacibus lon-*  
tottus. *gissimis.*

*Corvus splendido nigro-viridans, pennae colli supe-*  
*rioris longissimis strictissimis. Briss. av. 2. p. 33. t.*  
*2. f. 2.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Pennae a tergo Colli angustiores & longiores sunt. My-*  
*staces nigrae basi superioris rostri, setae, capite*  
*longiores.*

Corax. 2. *C. ater, dorso atro-cærulescente, cauda subrotunda.*  
*Fn. svec. 85. \**

*Corvus. Gesn. av. 334. Aldr. orn. 1. p. 684. t. 685.*  
*Jonst. av. 38. t. 16. Will. orn. 82. t. 18. Raj.*  
*av. 39. Alb. av. 2. p. 19. t. 20. Frisch. av. t.*  
*63. Briss. av. 2. p. 8.*

*Habitat in Europa, victitat cadaveribus, furto dedi-*  
*tus, loqui addiscit, feris convivalis, clamitans.*

Corone. 3. *C. atro-cærulescens totus, cauda rotundata: rectrici-*  
*bus acutis. Fn. svec. 86. \**

*Cornix. Gesn. av. 320. t. 321. Aldr. orn. 1. p. 734.*  
*t. 736.*



t. 736. *Will. orn.* 83. t. 18. *Briss. av.* 2. p. 12.  
*Raj. av.* 39. n. 2. *Alb. av.* 2. p. 20. t. 21.  
*Habitat in Europa; viſitat fructibus & cadaveribus.*  
*Totus atro-cæruleſcens, ſed antecedens tantum dorſo ala-*  
*rumque baſi cæruleſcens.*

frugile-  
 guſ.

4. *C. ater*, fronte cineraſcente, cauda ſubrotundata. *Fn. ſvec.* 87. *It. æl.* 67.

*Cornix frugilega.* *Aldr. orn.* 1. p. 751. t. 753. *Will. orn.* 84. t. 18. *Raj. av.* 39. *Alb. av.* 2. p. 21. t. 22. *Friſch. av.* t. 64. *Briff. av.* 2. p. 16.

*Habitat in Europa, agris infeſta, gregaria; plures pernoſtant ſolita in arbore, unde facile capiuntur.*  
*It. æl.* 55.

*Cornix.*

5. *C. cineraſcens*, capite jugulo alis caudaque nigris. *Fn. ſvec.* 88. \*

*Cornix cinerea frugilega.* *Gefn. av.* 332. *Aldr. orn.* 1. p. 754. t. 755. *Will. orn.* 84. t. 77. *Raj. av.* 39. *Alb. av.* 2. p. 22. t. 23. *Friſch. av.* t. 65. *Briff. av.* 2. p. 19.

*Habitat in Europa; viſitat Larvis, Cochleis, Ranis, quiſquiliis, apud nos relegata, at inaudita, quum purget prata a Larvis Phalænæ calamitoſæ graminumque radicibus ſubjacentibus larvis Tipularum. Ventis adverſa confidet; lepide capitur cucullo papyraceo in nive.*

*Monedula.*

6. *C. fufcus*, occipite incano, fronte alis caudaque nigris. *Faun. ſvec.* 89. \*

*Graculus ſ. Monedula.* *Gefn. av.* 520. t. 521.

*Monedula ſ. Lupus.* *Aldr. orn.* 1. p. 770. t. 771. *Will. orn.* 85. t. 19. *Raj. av.* 40. *Alb. av.* 1. p. 14. t. 14. *Friſch. av.* t. 67. *Briff. av.* 2. p. 24.

*Habitat in Europæ agris; hyeme gregaria; pernoſtat & nidificat in ſummis turribus.*

glandaria-  
 riuſ.

7. *C. tectricibus alarum cæruleis: lineis tranſverſis albis nigrisque; corpore ferrugineo variegato.* *Fn. ſvec.* 90. \*

*Pica glandaria.* *Gefn. av.* 700. *Aldr. orn.* 1. p. 788. t. 789. *Will. orn.* 88. t. 19. *Raj. av.* 41. *Alb. av.* 1. p. 16. t. 16. *Friſch. av.* t. 55. *Olin. av.* 35.

*Garruluſ.* *Briff. av.* 2. p. 47.

*Habi-*

*Habitat in Europa ; colligit nuces , glandes ; superfluas defodit seritque , victitat etiam segete & aviculis.*

cristatus. 8. *C. tectricibus alarum lineis transversis nigris ; corpore cæruleo , collari nigro.*

*Pica glandaria cærulea cristata. Robert. ic. 1676. t. 14. Catesb. car. 1. p. 15. t. 15. Edw. av. 60. t. 239. f. 1.*

*Garrulus canadensis cæruleus. Briss. av. 2. p. 54. t. 4. f. 2.*

*Habitat in America septentrionali. Præcedenti in multis assimilans.*

cayanus. 9. *C. subviolaceus subtus candidus , jugulo fronteque nigris , cauda apice alba.*

*Garrulus cayanensis , tribus utrinque maculis in capite albis. Briss. av. 2. p. 52. t. 4. f. 1.*

*Habitat in Cayana.*

*Pennæ incipitis sursum erectæ , rigide.*

Caryocatactes. 10. *C. fuscus alboque punctatus , alis caudaque nigris : rectricibus apice albis : intermediis apice detritis. Fn. svec. 91. \**

*Corvus cinereus , cauda alisque nigris. Faun. svec. 1. n. 75.*

*Caryocatactes. Gesn. av. 245. Will. orn. 90. t. 20. Raj. av. 42. Edw. av. 240.*

*Pica abietum nigra guttata. Frisch. av. t. 56.*

*Merula saxatilis. Aldr. orn. 2. p. 630.*

*Nucifraga. Briss. av. 2. p. 59. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Europa ; edit nuces , præsertim Pini Pineæ.*

Balicasius. 11. *C. virescenti-ater , cauda forficata.*

*Corvus splendide nigro-viridans. Briss. av. 2. p. 31. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Philippinis.*

afer. 12. *C. violaceo-niger , cauda cuneiformi.*

*Pica nigro-violacea , remigibus majoribus rectricibusque fuscis. Briss. av. 2. p. 40. t. 3. f. 2.*

*Habitat in Africa : Senegalia.*

Pica. 13. *C. albo nigroque varius , cauda cuneiformi. Faun. svec. 92. \**



*Pica varia* f. *caudata*. *Gesn. av.* 695. *Aldr. orn.* 1. p. 784. t. 785. *Jonst. av.* 44. t. 17. *Will. orn.* 87. t. 19. *Raj. av.* 41. *Alb. av.* t. 1. p. 15. t. 15. *Frisch. av.* t. 58. *Briss. av.* 2. p. 35.

*Habitat in Europa nido artificioso unico introitu.*

*Degit ad pagos, inter hostes offensos, sylvarum osor ; legit quisquillas, pullos Gallinarum Anserumque.*

fenega-  
lensis.

14. *C. nigro-violaceus*, cauda cuneiformi, artubus nigris.  
*Pica fenegalensis*. *Briss. av.* 2. p. 40. t. 3. f. 2.  
*Habitat in Senegal.*

brachyu-  
rus.

15. *C. viridis* subtus lineisque capitis fulvescentibus  
alis macula alba.  
*Pica cauda brevi*. *Edw. av.* 3. p. 242. t. 324.  
*Pica indica vulgaris*. *Raj. av.* 195. t. 1. f. 10.  
*Pica bengalensis*. *Alb. av.* 1. p. 31. t. 31.  
*Turdus viridis moluccensis*. *Briss. av.* 2. p. 316. t. 32. f. 1.  
*Habitat in Moluccis, Zeylona.*

canaden-  
sis.

16. *C. fuscus*, fronte flavicante, subtus reſtricumque  
apicibus albidus.  
*Garrulus canadensis fuscus*. *Briss. av.* 2. p. 54. t. 4. f. 2.  
*Habitat in Canada.*  
*Cauda rotundata.*

Pyrrho-  
corax.

17. *C. nigricans* rostro luteo, pedibus nigris.  
*Corvus nigricans*, rostro luteo. *Briss. av.* 30. t. 1. f. 2.  
*Pyrrhocorax*. *Gesn. av.* 527. *Aldr. av.* 1. p. 769. t. 16.  
*Habitat in Alpibus Helveticis.*  
*Hæc & sequentes binæ differunt a reliquis Rostro subulato curvo.*

Gracu-  
lus.

18. *C. violaceo-nigricans*, rostro pedibusque luteis.  
*Graculi tertium genus*. *Gesn. av.* 522.  
*Coracias*. *Aldr. orn.* 1. p. 766. t. 768. *Alb. av.* p. 17. t. 24.  
*Coracias* f. *Pyrrhocorax*. *Will. orn.* 86. t. 19. *Raj. av.* 40. n. 6.  
*Habitat in Helvetiæ alpibus.*

Eremita. 19. *C. virescens*, capite flavescente, occipite subcristato, rostro pedibusque rubris.

Upupa Eremita. *Syst. nat.* 10. p. 118. n. 3.

Coracias cristata. *Briss. av.* 2. p. 6.

Corvus sylvaticus. *Gesn. av.* 351. *Aldr. orn.* 3. p. 270, 267. *Will. orn.* 306.

Eremita montanus helveticus. *Alb. av.* 3. p. 16. t. 16.

*Habitat in Helvetiæ montibus & destructis arcibus.*

**51. CORACIAS.** *Rostrum* cultratum apice incurvato, basi pennis denudatum.  
*Lingua* cartilaginea, bifida.  
*Pedes* ambulatorii.

Garrulla. 1. *C. cærulea*, dorso rubro, remigibus nigris. *Fn. svec.* 94. \*

*Cornix cærulea.* *Gesn. av.* 335. *Aldr. orn.* 1. p. 790. t. 791, 792. *Will. orn.* 85. t. 20.

*Garrulus argentoratenensis.* *Raj. av.* 41. *Edw. av.* 109. t. 109. *Briss. av.* 2. p. 64. *Frisch. av.* t. 57.

*Habitat in Europa, victitans Scarabæis, Ranis, Glan-  
dibus, Frugibus.*

indica. 2. *C. cærulea*, antice testacea, pileo viridi.

*Garrulus ceruleus indicus.* *Edw. av.* t. 326.

*Habitat in India orientali.*

*Collum, Pectus & Dorso antica testacea, ceterum si-  
milis Garrulæ.*

cafra. 3. *C. cærulea*, remigibus margine exteriori luteis.

*Habitat in Æthiopia.* *J. Burmannus.*

*Femina cærulescenti-nigra est.*

orientalis. 4. *C. viridis*, jugulo cæruleo striato, rectricibus apice nigris.

*Galgulus indicus.* *Briss. av.* 2. p. 75. t. 7. f. 2.

*Habitat in India orientali.*

*Rectrices cæruleæ, basi virides, apice nigre.*

bengalen- 5. *C. subfulva*, subtus cærulescens, collo subtus viola-  
lis. ceo pallido striato, cauda integra.

*Corvus bengalensis.* *Syst. nat.* 10. p. 106. n. 6.

Galgu.



*Galgulus mindanensis.* *Briss. av. 2. p. 69. t. 6. f. 1.*  
*Gay de Bengale. Alb. av. 1. p. 16. t. 17.*  
*Habitat in Bengala.*

caudata. 6. *C. subfulva*, subtus cærulescens, collo subtus violaceo pallido striato, rectricibus extimis longissimis.  
*Galgulus angolensis. Briss. av. 2. p. 72. t. 7. f. 1.*  
*Habitat in Angola.*  
*Rectrix extima longissima, ceterum similis Bengalensi.*  
*Confer. Edw. av. 3. p. 249. t. 327.*

**32. ORIOLUS.** *Rostrum* conicum, convexum, acutissimum, rectum: mandibula superiore paulo longiore, obsolete emarginata.

*Lingua* bifida, acuta.

*Pedes* ambulatorii.

*Galbula. 1. O. luteus* loris artubusque nigris, rectricibus exterioribus postice flavis. *L. Act. stockb. 1750. p. 127. t. 3. f. 5.\**  
*Coracias Oriolus. Faun. svec. 95.*  
*Oriolus. Gesn. av. 713. Briss. av. 2. p. 320.*  
*Turdus luteus. Frisch. av. t. 31.*  
*Picus nidum suspendens. Aldr. orn. 1. p. 854. t. 857, 858.*  
*Galbula. Will. orn. 147. t. 38, 36. Raj. av. 68. n. 5.*  
*Galbula bengalensis. Edw. av. 185. t. 185.*  
*Chlorion. Gesn. av. 261.*  
*Avis bengalensis. Alb. av. 3. p. 19. t. 20.*  
*Habitat in Europa & India orientali; victitat insectis, baccis; nidus e foliis urceolatus in ramificationibus arborum.*

chinentis. 2. *O. luteus*, artubus nigris apice luteis, fascia occipitis nigra.

*Oriolus cochinentis. Briss. av. 2. p. 326. t. 33. f. 1.*  
*Habitat in China.*

*Fascia occipitis ab oculo per occiput ad oculum ducta.*

melanocephalus. 3. *O. luteus*, capite remigibus apicibusque rectricum intermediarum nigris.

*Sturnus Luteolus. Syst. nat. 10. p. 167.*

*Icterus indicus*, capite nigro. *Edw. av.* 77. t. 77. 83  
t. 186. *Alb. av.* 2. 41. t. 41.

*Oriolus bengalensis*. *Briss. av.* 2. p. 329.

*Pica maderaspatana* sturni instar maculata. *Raj. av.*  
175. t. 1. f. 7.

*Habitat in Bengala.*

*Icterus*. 4. *O. fulvus*, capite jugulo dorso remigibus rectricibusque nigris, macula alarum alba.

*Icterus*. *Briss. av.* 2. p. 86. t. 8. f. 1.

*Pica luteo-nigra* varia. *Sloan. jam.* 2. p. 301. t. 259. f. 4. *Raj. av.* 181. n. 10.

*Picus americanus* nidum suspendens. *Will. orn.* 97. t. 23.

*Guira-Tangeima*. *Marcgr. bras.* 192. *Raj. av.* 45. n. 6.

*Xanthornus major* nigro-varius. *Brown. jam.* 477.

*Pica alba & nigra*. *Catesb. car.* 3. p. 5. t. 5.

*Avis Bananas*. *Alb. av.* 2. p. 40. t. 40.

*Habitat in America calidiore.*

phoeniceus. 5. *O. niger*, alarum rectricibus fulvis.  
*Sturnus niger*, alis superne rubentibus. *Catesb. car.* 1. p. 13. t. 13.

*Sturnus rubris* alis. *Alb. av.* 1. t. 38.

*Icterus pterophoeniceus*. *Briss. av.* 2. p. 97.

*Pterophoenicus indiarum*. *Nieremb. nat.* 225.

*Acolchichi*. *Hern. mex.* 14. *Raj. av.* 166. n. 6.

*Habitat in America septentrionali; volitat cum Quiscalis.*

*Cauda rotundata. Corpus totum nigrum, exceptis alarum rectricibus fulvis s. rubris.*

hæmorrhous. 6. *O. niger*, uropygio coccineo. *Briss. av.* 2. p. 98. t. 8. f. 2.

*Habitat in Brasilia, Cayana.*

persicus. 7. *O. niger*, dorso postico maculaque rectricum alarum basique rectricum luteis.

*Cassicus luteus*. *Briss. av.* 2. p. 100. t. 9. f. 1.

*Pica persica*. *Bell. av.* 292. *Aldr. orn.* 1. p. 793. t. 795. *Will. orn.* 90. *Raj. av.* 42.

*Jupujuba*. *Marcgr. bras.* 193. *Will. orn.* 98. t. 22.

*Raj. av.* 46. n. 7. *Edw. av.* 234. t. 319.



*Habitat in America meridionali ; Nidus ex stramine & pilis contextus in formam alembici ; dependens ex extremis ramulis arborum , præsertim prope pagos.*

mexicana- 8. O. nigricans , subtus capiteque luteus.  
nus. Icterus fuscus novæ hispaniæ. *Briss. av. 2. p. 105.*  
*Habitat in Mexico.*

guianensis- 9. O. nigricans marginibus pennarum griseis , pectore colloque subtus rubris.  
fis. Icterus guianensis. *Briss. av. 2. p. 107. t. 11. f. 1.*  
Merula indica pectore cinnabarino. *Will. orn. 143.*  
*Raj. av. 67. n. 10.*  
*Habitat in Guiana.*  
*Confer Tanagras.*

Baltimore- 10. O. nigricans , subtus fasciaque alarum fulvus.  
re. Icterus minor. *Briss. av. 2. p. 109. t. 12. f. 1.*  
Icterus ex aureo nigroque varius. *Catesb. car. 1. p. 48. t. 48.*  
*Habitat in America septentrionali. Nidus e bifurcatura ramorum instar marsupii dependens.*

spurius. 11. O. niger , subtus fulvus , fascia alarum alba.  
Icterus minor. *Catesb. car. 1. p. 49. t. 49.*  
Icterus minor spurius. *Briss. av. 2. p. 111. t. 10. f. 3.*  
*Habitat in America septentrionali.*

Bonana. 12. O. fulvus , capite pectoreque castaneis , dorso remigibus rectricibusque nigris.  
Icterus minor , nidum suspendens. *Sloan. jam. 2. p. 299. t. 257. f. 1. Raj. av. 184. n. 27.*  
Icterus minor , nidum suspendens alter. *Sloan. jam. 2. p. 300. t. 258. f. 3.*  
Xanthornus. *Briss. av. 2. p. 115. t. 12. f. 2.*  
Xanthornus minor , nigro varius. *Brown. jam. 477.*  
Xochitototl. *Hern. mex. 40. Raj. av. 167. n. 12.*  
*Habitat in America meridionali ; Nidi intertexti e foliorum fibrillis , quartam globi partem efformantes sub folio Musæ.*

mexicana- 13 O. luteus , gula remigibus rectricibusque nigris.  
nus. Bonana minor. *Edw. av. 68. t. 243.*

*Xanthornus mexicanus.* *Briss. av. 2. p. 118. t. 11. f. 2.*

*Avis Ayoquantototl.* *Seb. mus. 2. p. 102. t. 96. f. 4.*

*Hern. mex. 54. Raj. av. 171.*

*Habitat in Mexico, Jamaica.*

domini-  
centis.

14. *O. niger*, corpore postico tectricibus alarum maculaque luteis.

*Xanthornus dominicensis.* *Briss. av. 2. p. 121. t. 12. f. 3.*

*Habitat in Dominica.*

*Dorsum posticum Abdomen pedesque lutei ut ♂ fascia alarum e tectricibus.*

cayanen-  
sis.

15. *O. niger*, macula alarum lutea.

*Pica alis flavis.* *Edw. av. 3. p. 239. t. 322.*

*Xanthornus cayanensis.* *Briss. av. 2. p. 123. t. 9. f. 2.*

*Habitat in Insula S. Thomæ, Cayana.*

*Macula alarum lutea e tectricibus luteis, ovata, magna.*

icteroce-  
phalus.

16. *O. niger*, capite colloque luteis.

*Sturnus capite flavo.* *Edw. av. 3. p. 241. t. 323.*

*Xanthornus icterocephalus cayanensis.* *Briss. av. 2. p.*

*124. t. 12. f. 4.*

*Habitat in Cayana.*

melan-  
cholicus.

17. *O. griseus nigro punctatus*, fascia oculorum atra.

*Fringilla melancholica.* *Syst. nat. 10. p. 180. n. 7.*

*Emberiza fusca americana.* *Edw. av. 85. t. 85.*

*Xanthornus nævius.* *Briss. av. 2. p. 126.*

*Habitat in Mexico.*

capensis.

18. *O. fusco-olivaceus*, subtus luteus.

*Xanthornus capitis b. spei.* *Briss. av. 2. p. 128.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

aureus.

19. *O. flavo-fulvus*, capistrogula tectricibus primariis extremitateque rectricum nigris.

*Paradisea flavo-fulva.* *Mus. Ad. Fr. 1. p. 15.*

*Paradisea aurea.* *Edw. av. 112. t. 112.*

*Icterus indicus.* *Briss. append. 37.*

*Habitat in India Orientali.*



chrysocephalus. 20. *O. niger*, pileo tectricibus alarum caudæque luteis.  
*Xanthornus icterocephalus americanus.* *Briss. app.*  
 38. t. 2. f. 2.  
*Habitat in America.*

53. **GRACULA.** *Rostrum* convexo cultrato, basi nudiusculum.

*Lingua* integra, acutiuscula, car-nosa.

*Pedes* ambulatorii.

religiosa. 1. *G. nigro violacea*, macula alarum alba, fascia occipitis nuda flava.

*Corvus javanensis* *Osb. itin.* 102.

*Sturnus indicus.* *Bont. jav.* 67. *Will. orn.* 145. t. 38. *Raj. av.* 68.

*Minor* s. *Mino.* *Edw. av.* 17. t. 17. *Alb. av.* 2. p. 35. t. 38.

*Turdus mainatus.* *Briss. av.* 2. p. 305. t. 28. f. 2.

*Habitat in Asia*, in ædibus loquacissima, præstantior *Psittaco*, egregie sibilans.

*Rostrum* rubrum apice flavum. *Pedes* fulvi. *Pennæ* capitis (exceptis intermediis) brevissimæ holosericeæ. *Fascia* nuda infra oculos fere ad nucham. *Remiges* 2 ad 8 fascia alba.

calva.

2. *G. subcinerea*, capite utrinque nudo.

*Merula calva.* *Briss. av.* 2. p. 280. t. 26. f. 2.

*Habitat in Philippinis.*

*Latera capitis* utrinque nuda ♂ dum irascitur coccinea; linea verticis plumosa nigra. *Rostrum* *Pedesque* fusca.

foetida.

3. *G. nigra*, remigibus extus cærulescentibus, fascia col-lari nuda.

*Habitat in America.* *Rolander.*

*Magnitudo Picæ.* *Corpus* nigrum, at *Alæ* compositis remigibus extus cærulescentes absque alba macula.

*Rectrices* æquales. *Caput* nigrum, plumis erectissimis brevissimis quasi holosericeum. *Rostrum* fere Cuculi.

*Nares* ovatae nude. *Lingua* integra carnosae acuta.

*Pedes* tetradactyli: uno postico.

- Barita. 4. *G. subgrisea*, humeris cæruleis, remigibus extus viridibus.  
*Icterus niger* *Briss.* av. 2. p. 103. t. 10. f. 1.  
*Monedula tota nigra.* *Sloan. jam.* 2. p. 299. t. 257. f. 2. *Raj.* av. 185. n. 28.  
*Habitat in Americæ Musis, cujus fructus devastat. Rolander.*  
*Rostrum breviusculum, cultratum, nigricans, basi nudum, subtus albicans. Alæ complicatis remigibus virides; explicatæ remiges intus nigræ. Cauda rotundata viridis dum complicata.*
- cristatella. 5. *G. nigra*, remigibus primoribus basi rectricibusque apice albis, rostro flavo.  
*Sturnus chinensis niger.* *Edw.* av. 19. t. 19.  
*Merula sinensis cristata.* *Briss.* av. 2. p. 253.  
*Habitat in China.*
- Saularis. 6. *G. nigro-cærulescens*, abdomine macula alarum rectricibusque lateralibus albis.  
*Pica minor bengalensis.* *Ediv.* av. 181. t. 181.  
*Lanius bengalensis niger.* *Briss.* av. 2. p. 184.  
*Dialbird.* *Alb.* av. 3. p. 17. t. 17, 18.  
*Saularis maderaspatanus.* *Raj.* av. 197. t. 2. f. 19, 20.  
*Habitat in Asia.*
- Quiscal. 7. *G. nigro-violacea*, cauda rotundata.  
*Pica jamaicensis.* *Briss.* av. 2. p. 41.  
*Monedula purpurea.* *Catesb. car.* 1. p. 12. t. 12.  
*Merops niger iride argenteo.* *Brown. jam.* 476.  
*Fur zeæ.* *Kalm. it.* 3. p. 33. \*  
*Habitat in America septentrionali. Virginianis invisa avis; aqua & igne interdicta, sed injuste. Kalm ibid. 35. devastat Bruchos Pisi.*  
*Narium valvulæ convexæ. Lingua bifida. Remiges nigre; secundariæ margine exteriori purpurascetes.*
- Atthis. 8. *G. viridi-cærulea*, abdomine ferrugineo, pedibus sanguineis.  
*Corvus (ægyptius) viridi maculatus, dorso medio cæruleo.* *Hasselt. itin.* 140. n. 20.  
*Habitat in Ægypto.*



54. PARADISEA. *Rostrum* capiftri plumis tomentosis tectum.

*Pennæ* hypochondriorum longiores.

*Rectrices* duæ superiores singulares denudatæ.

apoda. 1. *P. pennis* hypochondriis corpore longioribus, rectricibus duabus intermediis longis setaceis.

*Paradisea lutea*, cauda pectore abdomineque brunneis, gula azurea. *It. wgoth.* 139. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 15.

*Paradisea avis.* *Clus. exot.* 360. t. 360. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 1. *Seb. mus.* 1. p. 24. t. 13. f. 1. *Hern. mex.* 317. t. 318. *Worm. mus.* 294. f. 294. *Bradl. nat. t.* 12. f. 1, 2. *Calc. mus.* 669. t. 673. *Besl. mus.* 32. t. 9. f. 1. *Alb. av.* 3. t. 9.

*Manucodiata major.* *Edw. av.* 110. t. 110. *Marcgr. bras.* 201. *Raj. av.* 21. n. 7. *Briss. av.* 2. p. 130. t. 13. f. 1.

*Habitat in Moluccis, gregaria.*

*Cirrhi* 2 caudæ apice attenuati, nudi, recti. Caudæ perperam dicta sunt pennæ elongatæ dorsi & hypochondrii.

*Apodam perperam dixere veteres; videtur Papilionibus maximis. Phœnix loco Palmæ credita avis.*

regia. 2. *P. rectricibus* duabus intermediis filiformibus apice lunato-pennaceis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 15.

*Rex avium paradisæarum.* *Pet. gaz.* 1. t. 53. f. *Clus. exot.* 362. t. 362. *olear. mus.* 24. t. 13. f. *Raj. av.* 22. n. 10. *Seb. mus.* 1. t. 38. f. 5. *Edw. av.* 111. t. 111.

*Manucodiata minor.* *Briss. av.* 2. p. 136. t. 13. f. 1.

*Habitat in Amboina.*

*Purpurea pectorali cærulescente; cirrhi caudæ longissimi. Pennæ sub alis sunt reliquis longiores, licet caudæ breviores & truncatæ (\*).*

3. *P. I.*

(\*) *Paradiseas fictas* ( *Seb. mus.* 1. t. 60. f. 1, 2, 3, ) e *Psittacis* aliisque vis didit sæpe *Museis astus Chinenſum.*

tristis. 3. *P. area nuda pone oculos triangulari, capite colloque fuscis.*

*Turdus Merula philippenfis. Briss. av. 2. p. 278. t. 26. f. 1.*

*Habitat in Philippinis, viſitat Gryllis aliisque insectis. Rostrum & Pedes flavi. Corpus subfuscum. Remiges primores a basi ad medium albæ. Rectrices apice albæ exceptis intermediis. Ob rostri basin plumis tomentosis tectam huic generi affinis.*

55. TROGON. *Rostrum capite brevius, cultratum, aduncum, margine mandibularum ferratum.*

*Pedes scanforii.*

strigilatus. 1. *T. cinereus, alis strigis albis.*

*Trogon cayanensis cinereus. Briss. av. 4. p. 165. t. 16. f. 1.*

*Habitat in Cayania.*

Curucui. 2. *T. viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra.*

*Trogon brasiliensis viridis. Briss. av. 4. p. 173.*

*Curucui. Marcgr. bras. 211. Will. orn. 96. t. 22.*

*Raj. av. 45. n. 4. Edw. av. 3. p. 256. t. 331.*

*Psittacus flammeus viridis cinereus, rostro ferrato.*

*Feuill. per. 20.*

*Tzinitzcan. Hern. mex 23. Nieremb. nat. 230. Will. orn. 303. Raj. av. 163.*

*Habitat in Mexico, Brasilia, Peru.*

*Rectrices laterales fasciis albis nigrisque; intermediæ apice nigre.*

viridis. 3. *T. viridi aureus, subtus luteus, gula nigra.*

*Trogon cayanensis viridis. Briss. av. 4. p. 168. t. 17. f. 1.*

β. *Trogon cayanensis viridis ventre candido. Briss. av. 4. p. 170.*

*Habitat in Cayania.*

*Fascia pectoralis viridi-aurea. An præcedentis varietas aut sexus?*

*Rectrices in hoc genere XII.*



56. **BUCCO.** *Rostrum* cultratum, lateraliter compressum, apice utrinque emarginato, incurvato; rictu infra oculos protenso.

*Nares* pennis recumbentibus obtectæ.  
*Pedes* scanforii.

capensis. 1. *B. rufus*, fascia humerali fulva, pectorali nigra.

*Bucco. Briss. av. 4. p. 92. t. 6. f. 2.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Cauda rotundata rectricibus 10.*

57. **CUCULUS.** *Rostrum* teretiusculum.

*Nares* margine prominulæ.

*Lingua* sagittata, plana, integra.

*Pedes* scanforii.

canorus. 1. *C. cauda rotundata nigricante albo-punctata. Faun. svec. 96. \* Penn. brit. t. F. G.*

*Cuculus. Gesn. av. 363. Aldr. orn. 1. p. 409, 415.*

*t. 414, 416. Bell. av. 22: 6. Will. orn. 62. t. 77.*

*Frisch. av. 4. t. 40, 41, 42. Raj. av. 23. Alb.*

*av. 1. p. 8. t. 8. Olin. av. 38. Briss. av. 4. p.*

*105.*

*Habitat in Europa; Viçtitat Larvis & Passeribus.*

*Coccyx*, incubandi ipse impotens, semper parit in alienis nidis, imprimis in *Motacillæ*, majori ex parte singula ova, aufuratis prioribus; educat subditum adulterato fæta nido & sequitur nutritrix fidelissima mensibus æstatis pulcherrimis frondescentiæ; florescentiæ, grossificationis, dum ille aridis insidens arborum ramis famelicus semper cuculans advocat nutricem, donec sub ortu caniculæ ingratus eam occidat devoretque, unde orbus viçtitet rapina *Avicularum Larvisque Brassicæ aliarumque*; non tamen in *Falconem* transformatur.

orientalis. 2. *C. cauda rotundata, corpore nigro-virente nitente, rostro fusco.*

Cuculus indicus niger. *Briss. av. 4. p. 142. t. 10. f. 1.*  
*Habitat in India orientali.*

mindanensis. 3. C. cauda rotundata, corpore viridi-aureo fusco albo maculato, subtus albo nigricanteque undulato.  
 Cuculus mindanensis nævius. *Briss. av. 4. p. 130. t. 12. f. 1.*  
*Habitat in Philippinis.*

Vetula. 4. C. cauda cuneiformi, corpore subfusco: subtus testaceo, ciliis rubris.  
 Cuculus cinereus, rostro longiore. *Feuill. per. 416.*  
 Cuculus major. *Sloan. jam. 2. p. 312. t. 258. f. 1, 2.*  
 Cuculus major olivaceus, cauda longiore, ciliis rubris. *Brown. jam. 476.*  
 Cuculus jamaicensis longiroster. *Briss. av. 4. p. 116. t. 17. f. 2.*  
 Picus major leucophæus f. canescens, pluviae avis & senex dictus. *Raj. av. 182.*  
*Habitat in Jamaica. Voce clamore pulviam præagit. Rostrum reliquis longius, rectius. Cauda longa, apice alba. Palpebræ punctis coccineis.*

glandarius. 5. C. cauda cuneiformi, capite subcristato, fascia oculari nigra.  
 Cuculus andalusæ. *Briss. av. 4. p. 126.*  
 Cuculus fulvus maculatus. *Edw. av. 57. t. 57.*  
*Habitat in Africa septentrionali & Europa australi.*  
 Dorsum fuscum. Alæ albo punctatæ. Subtus testaceus est. Caput cinereum, subcristatum. Linea nigra trans oculos.

senegalensis. 6. C. cauda cuneiformi, corpore griseo subtus albo, pileo rectricibusque nigricantibus.  
 Cuculus senegalensis. *Briss. av. 4. p. 120. t. 8. f. 1.*  
*Habitat in Senegalia.*

honorus. 7. C. cauda cuneiformi, corpore nigricante albo maculato, subtus albo cinereoque fasciato.  
 Cuculus malabaricus nævius. *Briss. av. 4. p. 136. t. 11. f. 2.*  
*Habitat in Malabar.*



- punctatus. 8. *C. cauda cuneiformi*, corpore nigricante rufo-punctato, subtus rufo strigis nigris, rectricibus rufo-fasciatis.  
*Cuculus indicus nævius. Briss. av. 4. p. 134. t. 10. f. 2.*  
*Habitat in India orientali.*
- nævius. 9. *C. cauda cuneiformi*, corpore fusco ferrugineoque, jugulo strigis fuscis, rectricibus apice rufescentibus.  
*Cuculus cayanensis nævius. Briss. av. 4. p. 128. t. 9. f. 1.*  
*Habitat in Cayania.*  
*Rectrices caudæ elongatæ.*
- americanus. 10. *C. cauda cuneiformi*, corpore supra cinereo, subtus albo, mandibula inferiore lutea.  
*Cuculus carolinianus. Catesb. car. 1. p. 9. t. 9. Briss. av. 4. p. 112.*  
*Habitat in Carolina.*  
*Rectrices laterales nigræ apice albo. Remiges rufæ.*
- scolopaceus. 11. *C. cauda cuneiformi*, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.  
*Cuculus indicus fuscus maculatus. Edw. av. 59. t. 59.*  
*Cuculus bengalensis nævius. Briss. av. 4. p. 132.*  
*Habitat in Bengala.*
- niger. 12. *C. cauda cuneiformi*, corpore nigro nitido, rostro flavo.  
*Cuculus indicus niger. Edw. av. 58. t. 58.*  
*Cuculus bengalensis niger. Briss. av. 4. p. 141.*  
*Habitat in Bengala.*
- dominicus. 13. *C. cauda cuneiformi*, corpore griseo-fusco, subtus exalbido, rectricibus lateralibus tribus apice albis.  
*Cuculus dominicensis. Briss. av. 4. p. 110. t. 9. f. 2.*  
*Habitat in Dominica, Ludovicia.*  
*Rectrix extima margine longitudinali exteriori albo.*
- cayanus. 14. *C. cauda cuneiformi*, corpore castaneo purpurascente, subtus cinereo, rectricibus omnibus apice albis.  
*Cuculus cayanensis. Briss. av. 4. p. 122. t. 8. f. 2.*  
 β. *Cuculus cayanensis minor. Briss. av. 4. p. 124. t. 16. f. 2.*  
*Habitat in Cayana.*

cæruleus. 15. C. cauda rotundata, corpore cæruleo.

Cuculus madagascariensis cæruleus. *Briss. av. 4. p. 156. t. 13. f. 1.*

*Habitat in Madagascaria.*

*Remiges Rectricesque subviolaceæ.*

finensis. 16. C. cauda cuneiformi macroura, corpore cæruleo sub-  
tus albo, rectricum apicibus macula alba. †

Cuculus finensis cæruleus. *Briss. av. 4. p. 157. t. 14. f. 2.*

*Habitat in China.*

*Capitis pileus albus, cæruleo punctatus.*

Perfa. 17. C. cauda æquali, capite cristato, corpore viridi-cæ-  
rulescente, remigibus sanguineis.

Cuculus guineensis cristatus viridis. *Briss. av. 2. p. 152.*

*Touraco. Alb. av. 2. p. 19. t. 19. Edw. av. 7. t. 7.*

*Habitat in Guinea.*

*Rostrum rubrum; fascia ocularis nigra; linea alba su-  
pra & infra oculos.*

brasiliens. 18. C. cauda subæquali, capite cristato, corpore rubro,  
remigibus flavescentibus.

Cuculus brasiliensis cristatus ruber. *Briss. av. 4. p. 154.*

Cuculus brasiliensis. *Seb. mus. 1. p. 102. t. 66. f. 2.*

*Habitat in Brasilia.*

*Crista rubra nigro variegata.*

cristatus. 19. C. cauda rotundata, capite cristato, corpore cinereo-  
virescente nitente.

Cuculus madagascariensis cristatus. *Briss. av. 4. p. 149. t. 12. f. 2.*

*Habitat in Madagascaria.*

coroman- 20. C. cauda cuneiformi, corpore nigro, subtus albo,  
dus. torque candido. †

Cuculus coromandelanensis cristatus. *Briss. av. 4. p. 147. t. 11. f. 1.*

*Habitat in Coromandel.*

cornutus. 21. C. cauda cuneiformi, capite crista bifida, corpore  
fuliginoso. †

Cuculus brasiliensis cornutus. *Briss. av. 4. p. 144.*



Atingacu camucu. *Marcg. bras. 216. Will. orn.*  
 146. t. 38. *Raj. av. 165. n. 5.*  
*Habitat in Brasilia.*

paradi- 22. *C. caudæ rectricibus extimis binis longissimis apice*  
 feus. *dilatatis, capite cristato, corpore viridi †*  
*Cuculus siamensis cristatus viridis. Briss. av. 4. p.*  
*151. t. 14. f. 1.*  
*Habitat in Siam.*

58. YUNX. *Rostrum teretiusculum, acuminatum.*  
*Nares concavæ, denudatæ.*  
*Lingua teres, lumbriciformis, longissi-*  
*ma, apice mucronata.*  
*Pedes scansorii.*

Torquil- 1. JYNX. *Fn. svec. 97. t. 1. f. 97. \* Penn. brit.*  
 la. *t. F. G.*

*Cuculus subgriseus maculatus, rectricibus nigris fasciis*  
*undulatis. Fn. svec. 1. p. 78. t. 1. f. 78.*

*Jynx s. Torquilla. Bell. av. 76. a. Gesn. av. 573.*  
*Aldr. orn. 1. p. 863. t. 865. Jonst. av. . . t. 42.*  
*Will. orn. 95. t. 22. Raj. av. 44. Rudb. lapp.*  
*56. t. 66. Alb. av. 1. p. 11. t. 21. Frisch. av.*  
*. . t. 38. Briss. av. 4. p. 2. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Europæ truncis arborum putrescentibus, e*  
*quibus Larvas extrahit; collum contorquens circum-*  
*spicit, adventantes Accipitres Passeribus indicat.*

59. PI-

---

*Lingua Picorum & Yungis inseritur fronti, longissime protrahenda. Act.*  
*paris. 1709. Act. angl. 350. Will. orn. t. 21. Intestino cæco destituuntur.*

59. PICUS. *Rostrum* polyedrum , rectum : apice cuneato.

*Naves* pennis fetaceis recumbentibus obtectæ.

*Lingua* teres , lumbriciformis , longissima , mucronata , apice retrorsum aculeata fetis.

*Pedes* scanforii.

*martius.* 1. *P. niger* , pileo coccineo. *Fn. svec.* 98.

*Picus niger maximus.* *Gesn. av.* 708. *Aldr. orn.* 1. p. 843. t. 844. *Will. orn.* 22. t. 21. *Raj. av.* 42. *Alb. av.* 2. p. 26. t. 27. *Frisch. av.* t. 34. f. 1. *Briss. av.* 4. p. 21.

*Habitat in Europa , vix in Anglia.*

*Arbores emortuas conscindit , uti congeneres.*

*principa-* 2. *P. niger* , crista coccinea , linea utrinque collari remi-  
*lis.* gibusque secundariis albis.

*Picus maximus* , rostro albo. *Catesb. car.* 1. p. 16. t. 16.

*Picus niger carolinensis.* *Briss. av.* 4. p. 26.

*Picus imbrifoetus.* *Nieremb. nat.* 223. *Will. orn.* 301.

*Ipecu.* *Marcgr. bras.* 207. *Will. orn.* 94. t. 22. *Raj.* av. 43. n. 7.

*Quatotomom.* *Fern. mex.* 50. *Raj. av.* 162.

*Habitat in America septentrionali.*

*Remiges secundariæ & uropygium albæ.*

*pileatus.* 3. *P. niger* , crista rubra , temporibus alisque albis maculis.

*Picus niger maximus* , capite rubro. *Catesb. car.* 1. p. 17. t. 17. *Kalm. itin.* 2. p. 271.

*Picus virginianus pileatus.* *Briss. av.* 4. p. 29.

*Habitat in America.*

*Differt a P. martio* , quod tempora alba ; maculæ aliquot parvæ in alis albæ ; caput magis late coccineum.

*Mas tenia secundum mandibulam inferiorem. Mas feminaque crista rubra.*

4. *P.*

---

*Pici Larvas insectorum lignum intus rodentium , rostro secante , sono stridulo terrefaciente , auditu percipiente ; lingua acuta hastata intrante extrahunt , ( Aët. angl. 350. p. 509. ) injuste proscripti.*



- lineatus. 4. *P. niger*, crista coccinea, linea a rostro utrinque col-  
lari ad medium dorsum alba.  
*Picus niger cayanensis cristatus.* *Briss. av. 4. p. 31.*  
*t. 1. f. 2.*  
*Habitat in Cayana.*  
*Corpus subtus albido-rufescens fasciis nigris.*
- hirundi- 5. *P. niger*, occipite coccineo, humeris albido punctatis.  
naceus. *Picus secundus niger.* *Alb. av. 3. p. 22. t. 23.*  
*Picus niger novæ angliæ.* *Briss. av. 4. p. 24.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Magnitudine vix Hirundinem superat.*
- passerini- 6. *P. olivaceo-flavicans*, subtus fusco candicanteque  
nus. fasciatus.  
*Picus dominicensis minor.* *Briss. av. 4. p. 75. t. 4.*  
*f. 2.*  
*Habitat in Dominica.*  
*Caput supra rubrum.*
- erythro- 7. *P. capite toto rubro*, alis caudaque nigris, abdomine  
cephalus. albo. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 21. \**  
*Picus erythrocephalus.* *Briss. av. 4. p. 53. t. 3. f. 1.*  
*Picus capite toto rubro.* *Catesb. car. 1. p. 20. t. 20.*  
*Kalm. it. 3. p. 43.*  
*Habitat in America, Poma Glandesque devastans.*  
*Remiges secundariæ albæ.*
- aurantius. 8. *P. supra aurantius*, nucha uropygio rectricibusque nigris.  
*Picus capitis bonæ spei.* *Briss. av. 4. p. 78. t. 6. f. 1.*  
*Habitat ad Cap. b. spei.*  
*Caput superius & occiput rubra.*
- auratus. 9. *P. griseo nigroque transversim striatus*, gula pectore-  
que nigris, nucha rubra, uropygio albo.  
*Cuculus auratus.* *Syst. nat. 10. p. 112.*  
*Picus major*, alis aureis. *Catesb. car. 1. p. 18. t. 18.*  
*Kalm. it. 3. p. 42.*  
*Picus canadensis striatus.* *Briss. av. 4. p. 70.*  
*Habitat in America septentrionali; victitat vermibus &*  
*insectis terrestribus; truncos arborum non scandit, ra-*  
*mis quamvis insideat.*
- caroli- 10. *P. pileo nuchaque rubris*, dorso fasciis nigris, rectri-  
nus. cibus mediis [albis nigro punctatis.

**Picus ventre rubro** *Catesb. car. 1. p. 19. t. 19. f. 2.*  
*Kalm. it. 3. p. 43.*

**Picus varius medius.** *Sloan. jam. 2. p. 299. t. 255.*

**Picus varius jamaicensis.** *Briss. av. 4. p. 59.*

**Picus jamaicensis.** *Edw. av. 5. p. 71. t. 244.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Crissum rubrum punctatum. Venter ruber.*

**undatus.** 11. **P. testaceus nigro-undulatus**, temporibus sanguineis.  
**Picus maxillis rubris.** *Edw. av. 7. p. 258. t. 332.*  
*Habitat in Surinamo.*

**viridis.** 12. **P. viridis**, vertice coccineo. *Fn. svec. 99. \* Penn. brit. t. E.*

**Picus viridis.** *Gesn. av. 710. Aldr. orn. 1. p. 848. t. 849. Will. orn. 93. t. 21. Raj. av. 42. Alb. av. 1. p. 18. t. 18. Frisch. av. . . . t. 35. f. 1. Briss. av. 4. p. 9.*

*Habitat in Europa; delectatur Apibus in sylvis.*

**bengalensis.** 13. **P. viridis**, crista rubra, nucha nigra, subtus anticeque albus nigro maculatus.

**Picus bengalensis.** *Alb. av. 3. p. 21. t. 22. Edw. av. 182. t. 182.*

**Picus viridis bengalensis.** *Briss. av. 4. p. 14.*

*Habitat in Bengala.*

*Habitus P. viridis, sed dilutior; facie antice, collo subtus, pectore albis maculis nigris. Cauda nigra. Occiput crista rubra.*

**femirostris.** 14. **P. maxilla superiore brevior.** *Mus. Ad. Fr. 1. p. 16. \**

*Habitat in India.*

**pubescens** 15. **P. dorso longitudinali villoso**, rectrice extima alba maculis quatuor nigris.

**Picus varius minimus.** *Catesb. car. 1. p. 21. t. 21. f. 1.*

**Picus varius virginianus minor.** *Briss. av. 4. p. 50.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Mas occipite rubro.*

**villosus.** 16. **P. dorso longitudinali subvillosa**, rectricibus extimis totis albis. *Kalm. it. 3. p. 43. \**



*Picus varius* medius quasi villosus. *Catesb. car. 1. p.*  
19. t. 19.

*Picus varius virginianus.* *Briss. av. 4. p. 48.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Mas occipitis fascia transversa rubra.*

major. 17. *P. albo nigroque varius, crisso occipiteque rubro.*  
*Fn. svec. 100. \* Penn. brit. t. E.*

*Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus laterali-*  
*bus utrinque albescentibus.* *Fn. svec. 1. n. 81.*

*Picus varius major.* *Will. orn. 94. t. 21. Raj. av.*  
43. *Alb. av. 1. p. 19. t. 19. Briss. av. 4. p. 34.*

*Picus discolor.* *Frisch. av. t. 36.*

*Habitat in Europa.*

medius. 18. *P. albo nigroque varius, crisso pileoque rubris.* *Fn.*  
*svec. 101. \* Penn. brit. t. E.*

*Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus laterali-*  
*bus apice albo variegatis.* *Fn. svec. 1. n. 82.*

*Picus major.* *Aldr. orn. 1. p. 845. t. 846.*

*Picus varius ex albo & nigro.* *Gesn. av. 709.*

*Picus varius minor.* *Will. orn. 92. t. 21. Raj. av.*

43. *Hasselq. it. 242? Briss. av. 4. p. 38.*

*Habitat in Europa.*

minor. 19. *P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisso testae-*  
*ceo.* *Faun. svec. 102. \**

*Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus laterali-*  
*bus seminigris.* *Faun. svec. 83. Hasselq. itin. 242.*

*Picus varius tertius.* *Raj. av. 43.*

*Picus alius minor f. graminis.* *Gesn. av. 709.*

*Picus varius minor.* *Aldr. orn. 1. p. 847. Will. orn.*

94. t. 21. *Raj. av. 43. n. 5. Alb. av. 1. p. 20.*

t. 20. *Briss. av. 4. p. 41.*

*Picus discolor minor.* *Frisch. av. t. 37.*

*Habitat in Europa.*

varius. 20. *P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisso albo-*  
*fusco-fasciato.*

*Picus varius carolinus.* *Briss. av. 4. p. 62.*

*Picus varius minor, ventre luteo.* *Catesb. car. 1. p.*

21. t. 21. f. 2.

*Habitat in America septentrionali.*

*Mas vertice gulaque rubris, occipite luteo.*

*Femina vertice rubro, gula & occipite albis.*

tridactylus. 21. P. albo nigroque varius, pedibus tridactylis. *Faun. svec.* 103. \* *L. Act. Stockh.* 1740. p. 222. \*

Picus tridactylus. *Edw. av.* 114. t. 114.

Picus tridactylos anomalus. *Mus. petrop.* 368.

Picus varius cayanensis. *Briss. av.* 4. p. 54.

*Habitat in Svecia ad alpes Lapponicas, Dalekarlicas frequens & ad sinum Hudsonis nec non in Sibiria.*

*Europæus vertice flavo, Americanus rubro est. Crissum albidum. Plura individua nobis visa, omnia tridactyla.*

60. SITTA. Rostrum subulatum, teretiusculum, rectum, porrectum, integerrimum: mandibula superiore paulo longiore: apice compresso.

Lingua emarginato-lacera.

Nares vibrissis tectæ.

Pedes ambulatorii.

europæa. 1. S. rectricibus nigris: lateralibus quatuor infra apicem albis. *Fn. svec.* 104. \* *Penn. brit.* t. H. I. K.

Sitta s. Picus cinereus. *Gesn. av.* 711. *Aldr. orn.* 1. p. 852. t. 853. *Will. orn.* 98. t. 33. *Raj. av.* 47. *Alb. av.* 2. p. 27. t. 28. *Frisch. av.* . . t. 39. f. 2. *Briss. av.* 3. p. 588. t. 29. f. 3.

β. Sitta capite nigro & Sitta capite fusco. *Catesb. car.* 1. p. 22. t. 22.

*Habitat in Europæ, Americæ truncis arborum; Larvas sub cortice effodiens; Nuces rostro perforat & edit. Nidum struens reperto congruo foramine arboris, illud limo oblinat pro capacitatis ingressus. Noctu cantillat. Ström.*

Corpus cano-cærulescens, subtus album. Linea atra per oculos & aures. Hypochondria Femoræque ferruginea. Uropygium albo ferrugineoque varium. Rectrix 1 fascia alba; 2 macula alba; 3, 4 apice albo; 5 dorso concolor.

canadensis. 2. S. superciliis albis.

Sitta canadensis. *Briss. av.* 3. p. 593. t. 29. f. 4.

*Habitat in Canada.*

*Affinis multum S. europæa.*



jamaicen-3. *S. pileo nigro.*

sis

*Sitta jamaicensis. Briss. av. 3. p. 594.*

*Sitta f. Picus cinereus major, capite nigro. Sloan. jama.*

*2. p. 300. t. 259. f. 1.*

*Habitat in Jamaica.*

61. **TODUS.** *Rostrum subulatum, depressiusculum, obtusum, rectum, basi setis patulis.*

*Lingua - - -*

*Pedes gressorii.*

viridis. 1. *T. viridis, pectore rubro.*

*Todus viridis, pectore rubro, rostro recto. Brown. jam. 476. Briss. av. 4. p. 528. t. 41 f. 2.*

*Rubecula viridis elegantissima. Sloan. jam. 2. p. 306.*

*t. 263. f. 1. Raj. av. 187. Edw. av. 121. t. 121.*

*Habitat in America.*

*Cauda rotundata.*

cinereus. 2. *T. cinereus, subtus luteus.*

*Todus cinereus. Briss. app. 134.*

*Muscicapa cinerea & lutea. Edw. av. 2. p. 110. t. 262. f. 2.*

*Habitat in Surinamo.*

*Cauda cuneiformis.*

62. **ALCEDO.** *Rostrum trigonum, crassum, rectum, longum.*

*Lingua carnosissima, brevissima, plana, acuta.*

*Pedes gressorii plerisque.*

cristata. 1. *A. brachyura subcristata cærulea, subtus rufa, crista nigro-undulata.*

*Alcedo amboinensis cristata. Seb. mus. 1. t. 63. f. 4.*

*Ispida philippensis cristata. Briss. av. 4. p. 483. t. 37. f. 3.*

*Habitat in India orientali.*

*Rostrum nigrum. Pedes rubri.*

*Confer. Edw. av. t. 336.*

- inda. 2. *A. brachyura virens*, subtus fulva, fascia pectorali nebulosa.  
 Alcedo. *Edw. av.* 335.  
*Habitat in India occidentali.*  
*Rostrum nigrum. Pedes rubri. Corpus supra virens, subtus fulvum. Alæ albo punctatæ. Fascia nebulosa maculata pectoris. Linea supra infraque oculos fulva.*  
*Conf. Ispida senegalensis. Briss. av. 4. p. 485. t. 39. f. 1.*
- Ispida. 3. *A. brachyura*, supra cyanea, subtus fulva, loris rufis.  
*Ispida supra cærulea, subtus ferruginea. Mus. Ad. Fr. 1. p. 16. penn. brit. t. H. I. K.*  
*Ispida. Gesn. av. 571. Raj. av. 48. n. 1. Olin. av. 39. Aldr. orn. 3. p. 518. t. 520. Will. orn. 101. t. 24. Briss. av. 4. p. 471. 475. 477.*  
*Ispida indica minor. Edw. av. 11. t. 11. Alb. av. 1. p. 51. t. 54.*  
*Alcyon. Gesn. av. 85. Aldr. av. 3. p. 497.*  
*Habitat ad maris littora in Europa, Asia.*  
*Rostrum nigrum. Pedes rubri.*
- Erithaca. 4. *A. brachyura*, dorso cæruleo, abdomine luteo, capite uropygioque purpureis, gula nuchaque albis.  
*Alcedo bengalensis. Alb. av. 3. p. 28. t. 29.*  
*Ispida bengalensis torquata. Briss. av. 4. p. 503.*  
*Habitat in Bengala.*  
*Rostrum Pedesque rubri.*
- madaga- 5. *A. subbrachyura rufa*, gula alba, remigibus nigrican-  
 scariensis. tibus.  
*Ispida madagascariensis. Briss. av. 4. p. 508. t. 38. f. 1.*  
*Habitat in Madagascar.*  
*Rostrum Pedesque rubri.*
- superci- 6. *A. submacroura viridis*, subtus alba fascia viridi super-  
 iliosa. ciliis fulvis  
*Alcedo viridis & lutea. Edw. av. 73. t. 245.*  
*Ispida americana viridis. Briss. av. 4. p. 490.*  
*Habitat in America.*  
*Rostrum nigrum, Pedes carnei.*



Alcyon. 7. *A. macroura cristata cærulescens*, abdomine albo, pectore ferrugineo, macula alba ante poneque oculos.

Alcyon. *Catesb. car.* 1. p. 69. t. 69. *Raj. av.* 49.  
2. ♂ 184. n. 14.

*Ispida carolinensis cristata.* *Briss. av.* 4. p. 512.

β. *Ispida dominicensis cristata.* *Briss. av.* 4. p. 515.

*Ispida carolinensis.* *Edw. av.* 115. t. 115.

γ. *Jaguacati guacu.* *Margr. bras.* 194. *Will. orn.* 1022.  
*Raj. av.* 49.

*Ispida brasiliensis cristata.* *Briss. av.* 4. p. 511.

*Habitat in America.*

Rostrum capite longius, validum s. *Picæ.* Macula alba ante & post oculos. Lingua brevissima, carnosa, acuta, plana. Corpus nigrum. Pennæ capitula longiores. Remiges nigrae, apice albæ: exterioribus minoribus; omnes latere interiore albo maculatæ. Rectrices 12, æquales, utrinque albo maculatæ. Gula alba. Pectus & Abdomen alba, sed Pectus antica fascia ferruginea. Femora ferruginea. Tibiæ brevissimæ. Digitus extimus connexus cum intermedio. Rostrum nigrum. Pedes rubri.

torquata. 8. *A. macroura subcristata cano-cærulescens*, torque albo, alis caudaque albo-maculatis.

*Ispida mexicana cristata.* *Briss. av.* 4. p. 518. t. 41.  
f. 1.

*Achalalaçtli* s. *Piscium vorax.* *Hern. mex.* 13. *Will. orn.* 301. *Raj. av.* 156.

*Habitat in Martinica, Mexico.*

Rostrum nigrum; basi rubrum. Pedes rubri.

capensis. 9. *A. macroura cinereo-cærulea*, subtus, fulva, pectore testaceo, rostro rubro.

*Ispida capitis bonæ spei.* *Briss. av.* 4. p. 488. t. 30.  
f. 3.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

Rostrum Pedesque rubri. Rostrum magnum ut in *torquata.*

senegalensis. 10. *A. macroura cyanea*, subtus alba, capite cano, tectricibus alarum nigris.

*Ispida senegalensis major.* *Briss. av.* 4. p. 494. t. 400.  
f. 1.

*Habitat in Senegal.*

*Rostrum mandibula superior rubra, inferior Pedesque nigri.*

*Smyrnen- 11. A. macroura ferruginea, alis caudâ dorsoque viri-*  
*dis.*

*Alcedo smyrnensis. Alb. av. 3. p. 26. t. 27.*

*Ispida smyrnensis. Briss. av. 4. p. 499.*

*β. Ispida major africana. Edw. av. 8. t. 8.*

*Ispida madagascariensis cærulea. Briss. av. 4. p. 496. t.*  
*38. f. 2.*

*Habitat in Africa & Asia.*

*Confer. Alcedo major bengalensis. Alb. av. 3. p. 271.*  
*t. 28. Briss. av. 4. p. 501.*

*Rostrum Pedesque rubri.*

*rudis. 12. A. macroura fusca albido varia.*

*Alcedo rudis. Hasselq. itin. 243. n. 22.*

*Ispida ex albo & atro varia. Edw. av. 9. t. 9, Sloan.*  
*jam. 2. p. 313. t. 255. f. 3. Briss. av. 4. p. 520.*  
*t. 39. f. 2.*

*Habitat in Persia, Ægypto.*

*Cauda æqualis albida fascia lineari lataque nigra.*

*Rostrum Pedesque nigri.*

*Dea. 13. A. rectricibus duabus longissimis medio attenuatis,*  
*corpore nigro-cærulescente, alis virescentibus.*

*Ispida ternatana. Briss. av. 4. p. 525. t. 40. f. 2.*

*Avis paradisiaca ternatana. Seb. mus. 1. p. 74. t. 46.*  
*f. 3.*

*Habitat in Surinamo.*

*Rostrum Pedesque fulvi.*

*Paradisea. 14. A. rectricibus intermediis duabus longissimis, corpo-*  
*re viridi-aureo, pedibus scanforiis.*

*Alcedo binis plumis in cauda longissimis Edw. av.*  
*10. t. 10.*

M 3

Gal-

*Rostrum nigrum. Pedes nigri: Paradiseæ rudi.*

*- - - rubri: cristatæ, indicæ, superciliosæ, Ispidæ, Alcyoni.*  
*rubrum, Pedes nigri:*

*- - - rubri: madagasc. smyrnensi, Erithacæ, Deæ, capensi,*  
*Galbulæ.*

*rubro nigr. Pedes nigri: senegalensi.*

*- - - rubri: torquatæ.*



*Galbula longicauda.* *Briss. av. 4. p. 89. t. 5. f. 22*  
*Habitat in Cayania, Surinamo.*  
*Rostrum ♂ Pedes nigri.*

*Galbula. 15. A. cauda cuneiformi, corpore viridi-aureo, subtur-*  
*rufo, pedibus scansoriis.*

*Galbula. Briss. av. 4. p. 85. t. 5. f. 1.*

*Jacamaciri. Marcgr. bras. 202. Will. orn. 96. t. 222.*

*Raj. av. 44. Edw. av. t. 334.*

*Habitat in Brasilia, Cayania.*

*Rostrum nigrum. Pedes pallidi.*

### 63. MEROPS. *Rostrum curvatum, compressum* *carinatum.*

*Lingua apice laciniata.*

*Pedes gressorii.*

*Apiaster. 1. M. dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-cæru-*  
*lescente, rectricibus duabus longioribus, gula lutea.*  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 21. \**

*Merops. Bell. av. 16. Gesn. av. 599. Aldr. orn.*  
*1. p. 871 t. 872 ♂ 873. Will. orn. 102 t. 222*  
*Raj. av. 49. Alb. av. 2. p. 40. t. 44. Charl. onom.*  
*87. t. 87.*

*Merops galilæus. Hasselq. itin. 247.*

*Apiaster. Briss. av. 4. p. 533.*

*Habitat in Europa australi, Oriente. Nidus ex Mus-*  
*scis in cavernis subterraneis. Gregaria visitat Cicadibus*  
*Apibus, Muscis, Culicibus.*

*Pedes rubri.*

*viridis. 2. M. virens, fascia pectorali nigra, gula caudaque ca-*  
*ruleis, rectricibus duabus elongatis.*

*Ispida viridis, supra ferruginea. Osb. itin. 96.*

*Merops viridis, supra ferruginea. Amæn. acad. 4.*  
*237.*

*Merops bengalensis. Alb. av. 3. p. 29. t. 30.*

*Merops minor, caudæ & pennis longioribus & tenui-*  
*ribus Edw. av. 183. t. 183.*

*Apiaster bengalensis torquatus. Briss. av. 4. p. 555*

*Apiaster madagascariensis torquatus. Briss. av. 4.*  
*549. t. 42. f. 2.*

*Apiaster philippensis minor.* *Briss. av. 4. p. 555. t. 43. f. 2.*

*Habitat in Java, Bengala.*

*Caudæ pennæ longiores subsubulatæ.*

congener. 3. *M. flavescens*, uropygio virescente, remigibus apice rubris, rectricibus basi luteis.

*Merops alter.* *Gesn. av. 601. t. 602. Aldr. orn. 1.*

*p. 875. t. 876. Will. orn. 103. Raj. av. 49.*

*Apiaster icterocephalus.* *Briss. av. 4. p. 537.*

*Habitat in Europa australi.*

superci- 4. *M. viridis*, linea frontis supra infraque oculos alba, liosus. gula flavicante, rectricibus duabus elongatis.

*Apiaster madagascariensis.* *Briss. av. 4. p. 546. t. 42. f. 1.*

*Habitat in Madagascar.*

philippi- 5. *M. viridis*, subtus flavescens, uropygio cæruleo, caud- nus. da æquali.

*Apiaster philippensis major.* *Briss. av. 4. p. 560. t. 43. f. 1.*

*Habitat in Philippinis.*

*Rostrum Pedes apicesque remigum nigra.*

cinereus. 6. *M. rubro flavoque variegatus*, subtus flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis rubris.

*Avicula de Qvauhcuilui.* *Seb. mus. 1. p. 50. t. 31. f. 10.*

*Apiaster mexicanus.* *Briss. av. 4. p. 541.*

*Habitat in America.*

cafer. 7. *M. griseus*, crisso flavo, cauda longissima.

*Habitat in Æthiopia.*

*Inter pulchre delineatas icones animalium ultra 150, quas misit amicissimus J. Burmannus, visa est hæc avis.*

64. UPUPA. *Rostrum* arcuatum, convexum, subcompressum, obtusiusculum.

*Lingua* obtusa, integerrima, triquetra, brevissima.

*Pedes* ambulatorii.

Epops. 1. *U. cristata* variegata. *Fn. svec. 105. \* Penn. brit. t. L.*



Upupa. Bell. av. 72. a. Gesn. av. 776. Aldr. orn. 2. p. 702. Jonst. av. . . t. 42. Will. orn. 100. t. 24. Raj. av. 48. Alb. av. 2. p. 39. t. 42. 43. Frisch. av. t. 43. Charl. onom. 63. t. 63. Olina. av. 36. Edw. av. t. 345. Briss. av. 2. p. 455. t. 43. f. 1.

*Habitat in Europæ & Indiæ orientalis sylvis, victitans insectis. Terrefacta cristam erigit Psittaco cristato similem.*

Promerops. 2. U. rectricibus sex: intermediis longissimis.

Promerops superne fuscus, inferne albus, pectore rufescente. Briss. av. 2. p. 461. t. 43. f. 2.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Caudæ Rectrices laterales sensim exterius breviores. Crissum luteum.*

paradisea. 3. U. rectricibus duabus longissimis.

Avis paradisiaca Manucodiata cristata orientalis. Selb. mus. 1. p. 40. t. 30. f. 5.

Promerops indicus cristatus. Briss. av. 2. p. 461.

*Habitat in Asia.*

65. CERTHIA. Rostrum arcuatum, tenue, subtriangulum, acutum.

*Lingua acuta.*

*Pedes ambulatorii.*

familiaris. 1. C. grisea, subtus alba, remigibus fuscis: decem macula alba, rectricibus decem. Fn. svec. 106. \* Penn. brit. t. H. I. K.

Certhia. Gesn. av. 251. Aldr. orn. 1. p. 869. t. 87.

Bell. av. 98. a. Will. orn. 100 t. 23. Raj. av. 41.

n. 5. Alb. av. 3. p. 24. t. 25. Frisch. av. 39. f. 1.

Briss. av. 3. p. 603.

*Habitat in Europæ arboribus reptans; victitat Insectorum ovis larvi que; ova 20 parit.*

*Remiges 4 - 14. macula transversa alba notata. Rectrices 10 huic, reliquis 12.*

muraria. 2. C. cinerea, macula alarum fulva.

Certhia muralis. Briss. av. 2. p. 607.

*Picus murarius.* *Gesn. av.* 712. *Aldr. orn.* 1. p. 851. t. 852. *Will. orn.* 99. t. 23. *Raj. av.* 46. *Briss. av.* 3. p. 607. t. 30. f. 1. *Edw. av.* 3. t. 361.

*Habitat in Europæ australis turribus, arcibus.* *D. Scopoli. Nidificat in Craniis.* *Kram. austr.* 336.

*Rostrum subulatum, cultratum, subarcuatum, tenue, capite longius. Collum subtus albidum. Remiges nigre: 1, 2 latere tenuiore maculis duabus albis. Macula alarum rosea e rectricibus & remigum latere interiore. Rectrices 12, albicantes. Ungues validi, præsertim posticus.*

puffilla. 3. *C. grisea, subtus alba, superciliis candidis, rectricibus fuscis: extimis apice albis.*

*Certhia fusca minor. Edw. av.* 26. t. 26.

*Certhia indica. Briss. av.* 3. p. 621.

*Habitat in India.*

capensis. 4. *C. grisea, rectricibus nigricantibus: extima exterius albo fimbriata. Briss. av.* 3. p. 618. t. 31. f. 1.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

olivacea. 5. *C. olivacea, subtus grisea, orbitis albicantibus. Briss. av.* 3. p. 625. t. 33. f. 1.

*Habitat in Madagascar.*

curruca- 6. *C. olivacea, subtus flavescens, rectricibus æqualibus.*  
ria. *Certhia philippensis. Briss. av.* 3. p. 615. t. 30. f. 3. 2.

*Habitat in Zeylona. J. G. Loten, Gubernat. Zeylona.*

*Corpus Currucæ, subtus a gula ad anum flavescens. Rostrum cinereum, validius quam in congeneribus, Lingua setis 2. Remiges Rectricesque magis obscure cinereæ rachi nigra, apice extimo cinerascens.*

jugularis. 7. *C. subgrisea, subtus-lutea, gula violacea, rectricibus duabus extimis apice flavis.*

*Certhia philippensis minor. Briss. av.* 2. p. 616. t. 32. f. 5.

*Habitat in Philippinis.*

cærulea. 8. *C. cærulea fascia oculari gula remigibus rectricibusque nigris. Mus. Ad. Fr.* 2. p. 22. \*

*Certhia cærulea. Edw. av.* 21. t. 21.

*Certhia cayanensis cærulea. Briss. av.* 3. p. 626. t. 31. f. 4.



*Habitat in Surinamo.*

*Rostrum huic longius.*

cayana. 9. *C. viridis nitida, subtus albo striata, rectricibus viridibus: lateralibus interius nigricantibus.* *Briss. av. 3. p. 636. t. 23. f. 2.*

*Habitat in Cayana.*

chalybea. 10. *C. viridis nitens, pectore rubro: fascia antica chalybea.* *Briss. av. 3. p. 643. t. 32. f. 1.*

*Certhia purpurea indica.* *Edw. av. 116. t. 265.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

afra. 11. *C. viridis, abdomine albo, pectore rubro, uropygio cæruleo.*

*Trochilus capitis b. spei.* *Edw. av. 287. t. 347. f. 1.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Remiges & Rectrices nigrae.*

Spiza. 12. *C. viridis, capite remigibusque nigricantibus.*

*Motacilla Spiza.* *Syst. nat. 10. p. 188. n. 27.*

*Certhia brasiliensis viridis atricapilla.* *Briss. av. 3. p. 635. & p. 633.*

*Muscicapa viridis, capite nigro s. cæruleo.* *Edw. av. 25. t. 25. f. 1. 2.*

*Habitat in Brasilia, Surinamo.*

sperata. 13. *C. purpurea subtus coccinea, capite gula uropygioque violaceis.*

*Certhia philippensis purpurea.* *Briss. av. 3. p. 655. t. 31. f. 2, 3.*

*Habitat in Philippinis.*

*Femina olivacea, supra viridescens, subtus flavesens.*

senega- 14. *C. nigro-violacea, vertice gulaque viridi-aureis, pectore coccineo.* *Briss. av. 3. p. 660. t. 34. f. 2.*

lensis. *Habitat in Senegal.*

gutturalis 15. *C. nigricans, gutture viridi-nitente, pectore purpureo.*

*Certhia brasiliensis nigricans.* *Briss. av. 3. p. 658. t. 33. f. 3.*

*Habitat in Brasilia.*

Pinus. 16. *C. flava*, supra olivacea, alis cæruleis fasciis duabus albis.

*Certhia Pinus. Edw. av. 140. t. 277. f. 2.*

*Parus americanus lutescens. Catesb. car. 1. p. 46. t. 46.*

*Briss. av. 3. p. 576.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Lora nigra.*

cruenta- 17. *C. nigro-cærulescens*, subtus alba, vertice cervice dorso uropygioque rubris.

*Certhia minor*, ex albo nigro & rubro varia. *Edw. av. 81. t. 81.*

*Certhia bengalensis. Briss. av. 3. p. 663.*

*Habitat in Bengala.*

flaveola. 18. *C. nigra*, subtus lutea, superciliis exalbidis, rectricibus extimis apice albis.

*Luscinia f. Philomela e fusco & luteo varia. Sloan. jam. 2. p. 307. t. 259. Raj. av. 187. n. 45. Edw. av. 122. t. 122. ♂ t. 362. f. 3.*

β. *Certhia bahamensis. Catesb. car. 1. p. 59. t. 59. Briss. av. 3. p. 620. & 611. t. 34. f. 5.*

*Certhia f. saccharivora jamaicensis. Briss. av. 6. app. 117.*

*Habitat in America.*

pulchella. 19. *C. rectricibus intermediis 2 longissimis*, corpore viridi nitente, pectore rubro.

*Certhia longicauda senegalensis. Briss. av. 3. p. 645.*

*Avicula amboinensis discolor. Seb. mus. 2. t. 7. f. 2.*

*Habitat in Senegal.*

famosa. 20. *C. rectricibus intermediis 2 longissimis*, corpore viridi nitente, axillis luteis, loris nigris.

*Certhia longicauda*, cap. b. spei. *Briss. av. 3. p. 647. t. 34. f. 1.*

*Trochilus afer. Syst. nat. 10. p. 119. n. 2.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Linea atra inter rostrum & oculos. Macula axillaris elevatis alis conspicitur.*

philippi- 21. *C. rectricibus intermediis 2 longissimis*, corpore sub-  
na. griseo-virescente, subtus albo-flavescentis.

*Certhia philippensis. Briss. av. 3. p. 613. t. 30. f. 2.*

*Habitat in Philippinis.*



violacea, 22. *C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore violaceo nitente, pectore abdomineque luteis.*

*Certhia longicauda minor, capitis b. spei. Briss. av.*

3. p. 649. t. 33. f. 6.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

zeyloni- 23. *C. pileo viridi, dorso ferrugineo, abdomine flavo,*  
ca gula uropygioque azureis.

*Certhia philippensis olivacea. Briss. av. 3. p. 623. t.*

34. f. 4, 8. ?

*Habitat in Zeylona. J. G. Loten.*

Rostrum subulatum, arcuatum, nigrum, longitudine capitis. Corpus magnitudine *C. familiaris*, supra ferrugineum. Gula Uropygiumque azureo-aurea. Pileus viridis, nitens. Pectus ♂ Abdomen flava. Remiges fuscae apicis margine pallido. Rectrices æquales, nigricantes : extimis 1, 2. apicis margine albedo.

cyanea. 24. *C. cærulea, fascia oculari humeris alis caudaque nigris, pedibus rubris.*

*Certhia nigro cæruleoque varia. Edw. av. 2. p. 114. t. 264. f. 1.*

*Certhia brasiliensis cærulea. Briss. av. 3. p. 628. t. 31. f. 5.*

*Guiracoereba. Marcgr. bras. 212. Will. orn. 239. Raj. av. 83.*

*Avicula e cuba. Seb. mus. 1. p. 96. t. 60. f. 5.*

*Habitat in Brasilia, Cayania.*

*Remigum latus interius ♂ Tectrices alarum inferiores sulphurea sunt.*

Lotenia. 25. *C. cærulea, fascia pectorali rubro-aurea, loris atris.*

*Certhia madagascariensis viridis. Briss. av. 3. p. 641. t. 33. f. 4, 5.*

*Avis ceylanica unicolor. Seb. mus. 1. t. 69. f. 5.*

*Habitat in Zeylona. J. G. Loten p. m. Gubernat. Zeylon. qui hortum Botanicum primus in India condidit, & tot raris avibus me aliosque ditavit.*

Rostrum subulatum, arcuatum, nigrum, capite duplo longius. Caput Dorsumque cæruleo-nitentia. Pectus nigro-cæruleum, nitens, fascia pectorali ignita f. ferrugineo-aurea. Abdomen fuscum. Remiges nigrae. Rectrices nigrae æquales.

66. TROCHILUS. *Rostrum* subulato-filiforme apice tubulato, capite longius: Mandibula superior vaginans inferiorem.

*Lingua* filiformis, filis duobus coalitis tubulosa.

*Pedes* ambulatorii.

paradi- 1. T. curvirostris ruber, alis cæruleis, capite cristato, seus. rectricibus intermediis longissimis.

Mellivora avis cristata cum duobus pennis longis in cauda. *Seb. mus. 1. p. 97. t. 61. f. 4.*

Polytmus mexicanus longicaudus ruber cristatus. *Briss. av. 3. p. 692.*

*Habitat in Mexico.*

Pella. 2. T. curvirostris ruber, rectricibus intermediis longissimis, corpore rubro, capite fusco, gula aurata uropygioque viridi.

Mellivora major rubra, cauda longa. *Edw. av. 32. t. 32. f. 2.*

Polytmus surinamensis longicaudus ruber. *Briss. av. 3. p. 690.*

*Habitat in America meridionali.*

superci- 3. T. curvirostris fuscus nitens, rectricibus intermediis liosus. longis, abdomine subincarnato, superciliis albis.

Polytmus cayanensis longicaudus. *Briss. av. 3. p. 686. t. 35. f. 5.*

*Habitat in Cayania.*

*Rectrices intermediae a medio ad apicem albicantes.*

Polyt- 4. T. curvirostris virescens, rectricibus lateralibus mus. longissimis, pileo rectricibusque fuscis.

Polytmus viridans aureo varie splendens, pennis binis uropygii longissimis. *Brown. jam. 475.*

Mellivora capite nigro, cauda longa. *Edw. av. 34. t. 34. Alb. av. 3. p. 45. t. 49. f. 1.*

Melli-



Mellisuga jamaicensis atricapita, cauda bifurc. *Briss.*  
*av. 3. p. 729.*  
*Habitat in America.*

forficatus. 5. *T. curvirostris viridis*, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque cæruleis.  
*Polytmus major nigricans aureo varie splendens*, pen-  
 nis binis uropygii longissimis. *Brown. jam. p.*  
*475.*

*Mellivora viridis*, cauda longa. *Edw. av. 33. t. 33.*

*Mellisuga jamaicensis*, cauda bifurca. *Briss. av.*  
*3. p. 728. ♂ 732. t. 37. f. 6.*

*Mellivora avis maxima.* *Sloan. jam. 2. p. 309. t. 264.*  
*f. 4. Raj. av. 83. n. 3.*

*Guainumbi 3. Marcgr. bras. 197. Raj. av. 187. n.*  
*41.*

*Habitat in Jamaica.*

*Pennæ longissimæ basi suffultæ supra ♂ infra pennula*  
*rigida.*

leucurus. 6. *T. curvirostris viridi-aureus*, rectricibus æqualibus  
 albis, colori rubro.

*Mellivora cauda alba.* *Edw. av. 5. p. 99. t. 256. f. 1.*

*Polytmus surinamensis.* *Briss. av. 3. p. 674.*

*Habitat in America meridionali.*

*Rectrices extimæ apice nigricantes; intermediæ duæ vi-*  
*ridi-auratæ.*

jugularis. 7. *T. curvirostris cærulescens*, rectricibus æqualibus,  
 collo subtus sanguineo.

*Polytmus cayanensis violaceus.* *Briss. av. 3. p. 683.*

*t. 35. f. 3. Edw. av. 2. p. 118. t. 266. f. 1.*

*Habitat in Cayenna, Surinamo.*

Thaumantias. 8. *T. curvirostris viridis nitens*, rectricibus æqualibus  
 albo fimbriatis: extima exterius alba.

*Polytmus.* *Briss. av. 2. p. 677.*

*Avicula Americana, Colubris.* *Seb. mus. 1. t. 59. f. 5.*

*Guainumbi 6 species.* *Marcgr. bras. 197. Will. orn.*  
*167. Raj. av. 83. n. 6.*

*Habitat in America meridionali.*

6. T.

---

*Mel f. Nectar florum volantes hauriunt, nec floribus, ne frangantur, insident,*  
*sed Bombylii instar exsugunt. Aqua e siphone explosa lumesecti capiuntur.*

- domini- 9. *T. curvirostris viridis nitens, subtus subcinereus, re-*  
cus. *ctricibus medio ferrugineis apice albis.*  
*Polytmus dominicensis. Briss. av. 3. p. 672. t. 35.*  
*f. 4.*  
*Habitat in Dominica.*
- Mango. 10. *T. curvirostris viridis nitens rectricibus subæquali-*  
*bus ferrugineis, abdomine atro.*  
*Mellivora Mango. Alb. av. 3. p. 45. t. 49. f. 2.*  
*Mellivora avis maxima. Sloan. jam. 2. p. 308. t.*  
*264. f. 3.*  
*Guainumbi 3 species. Marcgr. bras. 197. Will. orn.*  
*167. Raj. av. 187. n. 5.*  
*Polytmus jamaicensis. Briss. av. 3. p. 679. t. 35. f. 1.*  
*Habitat in Jamaica.*
- holoseri- 11. *T. curvirostris viridis, rectricibus æqualibus supra*  
ceus. *nigris, fascia pectorali cærulea, abdomine nigro.*  
*Mellivora viridis, ventre nigro. Edw. av. 36. t. 36.*  
*Polytmus mexicanus. Briss. av. 3. p. 676. t. 35. f. 2.*  
*Avis auricoma mexicana. Seb. mus. 1. t. 99. f. 4.*  
*Habitat in Mexico.*
- Colubris. 12. *T. rectirostris viridi-aureus, rectricibus nigris: la-*  
*teralibus tribus ferrugineis apice albis, gula flammea.*  
*Mellivora avis carolinensis. Catesb. car. 1. p. 65.*  
*t. 65.*  
*Mellivora gula rubra. Edw. av. 38. t. 38.*  
*Mellisuga carolinensis, gutture rubro. Briss. av. 3.*  
*p. 716. t. 36. f. 6, 5.*  
*Tomineio mariana virescens, gutture flammeo. Pet.*  
*gaz. t. 3. f. 8.*  
*Passer muscatus. Gesn. av. 655.*  
*Guainumbi. Marcgr. bras. 196. Will. orn. 165. Raj.*  
*av. 82. n. 1.*  
*β. Trochilus Tomineo rectricibus subæqualibus basi*  
*ferrugineis apice albis, corpore supra fusco, subtus*  
*albido. Mus. Ad. Fr. 2. p. 23. femina.\**  
*Ourissia f. Tomineo. Clus. exot. 96.*  
*Habitat in America, imprimis septentrionali.*  
*Corpus viridi aureum, subtus album.*
- Ourissia. 13. *T. rectirostris viridi-auratus, rectricibus subæqualibus*  
*fusco-aureis, remigibus nigris, abdomine cæruleo.*  
*Habitat in Indiis.*



- Melchior-14. *T. rectirostris viridi-aureus*, rectricibus æqualibus  
 fus. ferrugineis : extimis apice fuscis, remigibus nigris  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 24. \* Syst. nat. 10. p. 120. n.*  
*8, 12.*  
*Mellisuga brasiliensis*, gutture topazino. *Briss. av. 3.*  
*p. 699. t. 37. f. 1.*  
*Avis Colubri Thaumantias.* *Seb. mus. 1. p. 61. t.*  
*37. f. 4.*  
*Guainumbi 8. species.* *Marcgr. bras. 197. Will.*  
*orn. 167. Raj. av. 83.*  
*Habitat in America.*
- mellifu-15. *T. rectirostris viridi-aureus*, rectricibus æqualibus  
 gus. cæruleis, remigibus atro-cærulescentibus, tibiis  
 pennatis. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 23. \**  
*Mellisuga viridis.* *Edw. av. t. 360. f. 1.*  
*Mellisuga cayanensis.* *Briss. av. 3. p. 704. t. 36. f. 3.*  
*Colubri f. Florifuga.* *Seb. mus. 2. p. 42. t. 41. f.*  
*2, 4.*  
*Guainumbi 9 species.* *Marcgr. bras. 197. Will. orn.*  
*167. Raj. av. 83.*
- Pegasus. 16. *T. rectirostris*, rectricibus basi virescentibus, cor-  
 pore virescente-aureo, subtus subgriseo tibiis pennatis.  
*Mellisuga cayanensis*, ventre griseo. *Briss. av. 3. p.*  
*709. t. 36. f. 4.*  
*Habitat in Cayania.*  
*Rectrices æquales nigro-purpureæ : lateralibus apice*  
*griseis.*
- niger. 17. *T. rectirostris* rectricibus subæqualibus, corpore ni-  
 gro subtus aurato, crisso albo, tibiis pennatis.  
*Trochilus niger.* *Mus. Ad. Fr. 1. p. 18.*  
*Mellisuga dominicensis.* *Briss. av. 3. p. 702. t. 36.*  
*f. 8.*  
*Habitat in America meridionali.*
- cristatus 18. *T. rectirostris viridis*, alis fuscis, abdomine fusco  
 cinereo, crista cærulescente, tibiis pennatis.  
*Mellivora minor cristata.* *Edw. av. 37. t. 37.*  
*Mellisuga cristata.* *Briss. av. 3. p. 417. t. 37. f. 1.*  
*Habitat in America.*
- latus. 19. *T. rectirostris virescente-aureus*, rectricibus æqu  
 libus ferrugineis apice nigris, pileo rubro cristato  
 Mel.

Mellivora cristata rubra. *Edw. av. t. 3. 44. f. superior.*  
*Habitat in India orientali.*

Caput nigrum, tectum pileo in cristam longam decumbentem sanguineam. Rostrum fere rectum. Cauda terminata fascia nigra.

mellivo- 20. T. rectirostris, rectricibus nigris: lateralibus albis,  
 rus. capite cæruleo, dorso viridi, abdomine albo.

Mellivora ventre albo. *Edw. av. 35. t. 35. f. 1.*

Mellisuga surinamensis torquata. *Briss. av. 3. p. 713.*  
*Habitat in India.*

Collum a tergo lunula alba.

ruber. 21. T. rectirostris, rectricibus lateralibus violaceis, corpore testaceo fusco submaculato.

Mellivora parva purpurea. *Edw. av. 32. t. 32. f. 1.*

Mellisuga surinamensis. *Briss. av. 3. p. 701.*

*Habitat in Surinamo.*

Rectrices intermediae testaceæ.

minimus. 22. T. rectirostris, rectricibus lateralibus margine exterioriore albis, corpore viridi nitente, subtus albido.

Mellivora avis minima. *Sloan. jam. 2. p. 307 t. 264. f. 1. Raj. av. 187. Edw. av. 105. t. 105. f. infima.*

Mellisuga. *Briss. av. 3. p. 695. t. 36. f. 1.*

Guainumbi 7 species. *Marcgr. bras. 197. Will. orn. 167. Raj. av. 187.*

Guainumbi minor, corpore toto cinereo. *Raj. av. 83.*

*Habitat in America. Avis minima inter omnes notas, ut Struthio Camelus maxima. Sloanei viva ponderabat Gr. 20, Edwardi sicca Gr. 45. Rectrices nigrae nitentes, at 1, 1, totæ griseæ; 2, 2, a medio ad apicem griseæ.*



## III. ANSERES.

*Rostrum obtusiusculum, epidermide tectum, sub basi gibbum, apice auctum. Faux denticulata.*

*Lingua carnosæ.*

*Pedes palmati, natatorii.*

67. ANAS. *Rostrum lamelloso - dentatum, convexum, obtusum.*

*Lingua ciliata, obtusa.*

\* *Rostrum basi gibbo.*

Cygnus. 1. A. *rostrum semicylindrico atro, cera flava, corpore albido.* Fn. svec. 107. It. wgoth. 143.

a. Cygnus ferus. Bell. av. 30. a. Gesn. av. 371. t. 372. Aldr. orn. 3. p. 10. t. 8. Will. orn. 212. t. 69. Raj. av. 136. Alb. av. 3. p. 91. t. 96. Edw. av. 150. t. 150. Marsf. danub. 5. p. 98. Briss. av. 60. p. 292. t. 28.

B. Cygnus mansuetus. Will. orn. 271. t. 69. Raj. av. 136.

Cygnus. Gesn. av. 371. t. 372. Bell. av. 30. Aldr. orn. 3. p. 1. Besl. mus. t. 20. Marsf. dan. 5. t. 47. Frisch. av. t. 152.

*Habitat in Europa, America septentrionali; accedit ad nos ultimo die regelationis. Piscatur poma.* It. scan. 186. 228.

*Mansuetus B. distinguitur Cera nodosa nigra. Utrisque Rostrum versus basin rubrum. Pedes fusci.*

Cygnoides. 2. A. *rostrum semicylindrico: cera gibbosa, palpebris tumidis.* Fan. svec. 108.

australis. a. Anser hispanicus f. guineensis. Raj. av. 138. Will. orn. 275.

Anser cygnoides. Alb. av. 1. p. 89. t. 91.

Anser hispanicus. Alb. av. 1. p. 79. t. 91. Marsf. dan. 5. p. 104. t. 50.

orientalis B. Anser, *rostrum semicylindrico atro basi gibbo, minor*

Anser chinensis. *It. wegoth.* 145. *Frisch.* av. 153, 154.

Anser moschoviticus. *Alb.* av. 2. p. 83. t. 91, 92. *Briss.* av. 6. p. 83. t. 91, 92.

*Habitat in Asia.*

*Varietas orientalis β. ab australi α. parum differt; imprimis quod illa minor.*

gamben- 3. A. rostro semicylindrico, cera gibbosa, humeris spinosis.

Anser gambensis. *Will. orn.* 275. t. 61. *Raj.* av. 138. *Briss.* av. 6. p. 283.

*Habitat in Gambensi regno.*

Tadorna. 4. A. rostro fimo, fronte compressa, capite nigro-virescente, corpore albo variegato. *Faun. svec.* 112. \* *Penn. brit.* t. O.

Anas albo-variegata, pectoris lateribus ferrugineis, abdomine longitudinaliter cinereo-maculato. *Faun. svec.* 1. n. 93.

Anas Tadorna dicta. *It. scan.* 212. \* *It. wegoth.* 214.

Tadorna s. Vulpanser. *Will. orn.* 278. t. 70. 71. *Raj.* av. 140.

Anas maritima. *Gesn.* av. 803. *Aldr. orn.* 3. p. 196. t. 195.

Tadorna. *Bell.* av. 36. *Aldr. orn.* 3. p. 236. t. 237. *Briss.* av. 6. p. 344. t. 33. f. 2.

Vulpanser. *Gesn.* av. 161. *Aldr. orn.* 3. p. 159. *Alb.* av. 1. p. 90. t. 94.

Brandgaas. *Clus. exot.* 368.

*Habitat in Europæ maritimis, nidificat in cuniculis a se fossis duplici introitu.*

Mas. Caput collumque violaceum. Collum medium albo annulatum. Dorsum album. Pectus brunneum. Abdomen album linea carinali nigra. Remiges primæ primæ nigrae; proximæ violaceæ; interiores ferrugineæ; ultimæ albæ. Speculum violaceum. Cauda alba apice nigro. Rostrum rubrum basi compressa carnosum. Pedes rubri.

spectabi- 5. A. rostro basi gibbo compresso: carina pennacea nigra, capite canescente. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 25. \* *Faun. svec.* 112.



*Anas canadensis*, capite griseo - cæruleo. *Edw. av.*  
154. t. 154.

*Anas freti hudsonis*. *Briss. av. 6. p. 366.*

*Habitat in Canada, Svecia.*

*Rostrum nigrum cum rubro. Pedes rufi.*

**fusca** 6. *A. nigricans*, palpebra inferiore speculoque alarum  
albis. *Fn. svec. 109. \**

*Anas corpore obscuro, macula alba pone oculos,*  
lineaque alba. *Fn. svec. 1. p. 106. \* It. gotl. 215.*  
271. \*

*Anas fera fusca*, *Jonst. av. t. 44. Brunn. act. ni-*  
*drof. 1. t. 5.*

*Anas niger*. *Wil. orn. 278. t. 70. Raj. av. 141.*  
n. 4.

*Anas nigra*, rostro nigro rubro luteo. *Aldr. av. 33.*  
p. 234. t. 235.

*Anas nigra major*. *Briss. av. 6. p. 366.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Mas ad basin rostri gibbositate notatus. Rostrum ma-*  
*ris luteum, medio nigrum. Pedes rubri.*

**nigra.** 7. *A. rostro basi gibbo, corpore toto nigro. Fn. svec.*  
110.

*Anas niger minor*. *Will. orn. 280. t. 74. Raj. av.*  
141. n. 5.

*Anas nigra*. *Briss. av. 6. p. 420. t. 38. f. 2.*

*Habitat in Lapponia, Anglia.*

*Cauda subcuneiformis. Femina fusca est. Rostrum ni-*  
*grum, medio luteum. Pedes fusci. Frontis gibbo-*  
*sitas carnosâ rubra, divisa lineâ flava.*

\* \* *Leves rostro basi æquali.*

**Marila.** 8. *A. nigra humeris cinereo-undulatis, abdomine specu-*  
*loque alari albis. Faun. svec. 111. \* Pontopp. all.*  
t. 26.

*Anas toto corpore fusca, macula alarum alba. Kram.*  
*austr. 342. \**

*Anas nigra ultima nova. Stræm. sændm. 230.*

*Fuligula forte gesneri. Raj. av. 142. Will. orn. 279.*

*Habitat in Europæ alpinis in Svecia, Norvegia, Aus-*  
*tria.*

*Femina fusca. Thorace & anterioribus corporis griseo-*  
*fuscis. Speculum album, antice posticeque nigrum.*  
Conf.

*Conf. subterranea A. fusca subtus alba. Scopol.*  
*Habitat in la'us Zirchnicensis cryptis subterraneis.*  
*Uropygium fusco maculatum. An distincta?*

- Anser. 9. A. rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, sub-  
 tus pallidiore, collo striato. *Fn. svec. 114. \**  
 α. Anser ferus. *Gesn. av. 158. Aldr. orn. 3. p. 147. t.*  
*150, 151. Will. orn. 274. t. 69. Raj. av. 136.*  
*Marf. dan. 5. p. 100. t. 48.*  
 Anser ferus flandricus. *Aldr. orn. 3. p. 155. t. 152.*  
 Anser ferus tertius. *Aldr. orn. 3. p. 155. t. 153.*  
 Anser palustris nostras. *Raj. av. 138.*  
 Anser sylvestris. *Frisch. av. t. 155. Briss. av. 6. p.*  
*265.*  
 β. Anser domesticus. *Gesn. av. 141. Will. orn. 273. t.*  
*75. Raj. av. 136. Aldr. orn. 3. p. 99. t. 102. Frisch.*  
*av. t. 157.*  
 γ. Anser canadensis fuscus maculatus. *Edw. av. 153.*  
*t. 153.*  
*Habitat in Europa & America maxime borealis lacu-*  
*bus fluviisque gratitans. Mas feminam alloquitur ho-*  
*ra 4 matutina.*  
*Collum striatum; Speculum nullum. Pedes rubri. An-*  
*nulus albus ad basin rostri in spontaneo; migrat per*  
*phalanges; filo arcetur. Mas 1 feminis 4; inde*  
*Pennæ, Plumæ, Anser durateus, Jus spartanum, Je-*  
*cur ficatum; at Stercus ictericis.*  
 ægyptia- 10. A. rostro subcylindrico, corpore undulato, vertice  
 ca. albo, speculo alari candido fascia nigra.  
 Anser ægyptiacus. *Briss. av. 6. p. 284. t. 27.*  
 Anser anglicus. *Alb. av. 2. p. 59. t. 93.*  
 Anser hispanicus parvus. *Raj. av. 138. n. 7: 1.*  
*Habitat in Ægypto?*  
*Corpus undulatum e fusco ferrugineoque. Tempora ca-*  
*stanea. Macula sterni castanea. Speculum alarum*  
*magnum, album, fascia nigra. Rostrum rubescens.*  
*Pedes rubri.*  
 erythro- 11. A. cinerea, fronte alba. *Faun. svec. 116. \* Zool.*  
 pus. *brit. t. 00: 1.*  
 Anser helsingicus. *Clus. exot. 368.*  
 Anser canadensis fuscus maculatus. *Edw. av. 153.*  
*t. 153.*



*Anser septentrionalis sylvestris.* *Briss. av. 6. p. 269.*  
*Habitat in Europa & America septentrionali.*  
*Rostrum rubrum. Pedes rubri.*

cærule- 12. *A. grisea, subtus alba, rectricibus alarum dorsoque*  
 fcens. *postico cærulescentibus.*

*Anser canadensis, alis cæruleis.* *Edw. av. 152. t. 152.*

*Anser sylvestris freti hudsonis.* *Briss. av. 6. p. 275.*

*Habitat in Canada.*

*Rostrum rubrum. Pedes rubri.*

Bernicla. 13. *A. fusca, capite collo pectoreque nigris, collari albo.*

*Anas capite colloque nigris.* *Faun. svec. 115.\**

*a. Brenta.* *Will. orn. 275. t. 69. Raj. av. 137. n. 6.*

*Alb. av. 1. p. 80. t. 93. Briss. av. 6. p. 304. t. 31.*

*Bernicla.* *Bell. av. 34. Aldr. orn. 3. p. 166. t. 168.*

*Anas torquata.* *Aldr. orn. 3. p. 213. t. 214.*

*Glaucius.* *Friseh. av. t. 156*

*Bernicla.* *Briss. av. 6. p. 300.*

*Bernicla f. Bernacla.* *Will. orn. 274. Raj. av. 137.*  
*n. 5.*

*Branta f. Bernicla.* *Gesn. av. 109. t. 110. Aldr. orn.*  
*3. p. 165. t. 167.*

*Bernacle.* *Clus. exot. 368.*

*Clakis.* *Gesn. av. 112. Aldr. orn. 3. p. 166. t. 169,*  
*170.*

*Anser arboreus.* *Gesn. av. 112. t. 111. Bell. av. 31.*

*Habitat in Europa boreali; migrat supra Sveciam,*  
*nidificat in Groenlandia; hibernat in Belgio.*

*Rostrum nigrum. Pedes nigri.*

canaden- 14. *A. cinerea, capite colloque nigris, genis gulaque albis.*  
 sis. *Anser canadensis.* *Will. orn. 276. t. 70. f. 1. & t.*

*71. f. 3. Raj. av. 139. n. 9. Catesb. car. 1. p.*

*92. t. 92. Briss. av. 6. p. 272. t. 26. Edw. av. 151.*  
*t. 151.*

*Habitat in Canada.*

*Rostrum nigricans. Pedes plumbei. Uropygium Re-*  
*ctricesque nigra.*

mollissi- 15. *A. rostro cylindrico, cera postice bifida rugosa.* *Fn.*  
 ma. *svec. 117.*

*Anser lanuginosus.* *Briss. av. 6. p. 494. t. 19, 20.*

Anas plumis mollissimis. Barth. act. 1. p. 90. Worm.  
mus. 310. Will. orn. 277.

Anas magna nigra & alba. Edw. av. 98. t. 98.

Anas f. cuberti f. farnensis. Will. orn. 278. t. 76.  
Raj. av. 141. n. 3.

Habitat in Europa boreali, pelagica. It. gotl. 213. de-  
plumatur in nido: plumis mollissimis, præstantissimis,  
pretiosissimis. Vide monographiam Brännichi. Hassn.  
1763. oct.

Mas albus, subtus posticeque niger. Femina grisea.  
Rostrum nigrum. Pedes nigri.

moscha- 16. A. facie nuda papillosa. Faun. svec. 118. \*  
ta.

Anas moschata. Raj. av. 150. Alb. av. 3. p. 92. t.  
97, 98. Will. orn. 294. t. 75. Marsf. dan. 5. p.  
116. t. 5657. Briss. av. 6. p. 313.

Anas Indica. Gesn. av. 122. Aldr. orn. 3. p. 192.  
t. 193. Will. orn. 295.

Anas indica alia. Gesn. av. 803. Aldr. orn. 3. p.  
192. t. 194, 195.

Anas cairina. Aldr. orn. 3. p. 199. t. 200, 201. Will.  
orn. 294.

Anas lybica. Will. orn. 294. Aldr. orn. 3. p. 196.  
t. 197, 198.

Habitat in India.

Alba, hujus forte varietas minor. It. wgot. 143.

Rostrum Pedesque rubri. Corpus cærulescenti-nigrum  
albo variegatum. Rectrix extima alba.

bahamen 17. A. grisea, rostro plumbeo, macula laterali ful-  
fis. va macula alarum viridi luteaque.

Anas bahamensis; rostro plumbeo, macula aurantii  
coloris. Catesb. car. 1. p. 63. t. 93. Briss. av. 6.  
p. 358.

Moreca. Marcgr. bras. 214. Will. orn. 292. Raj.  
av. 149. n. 4.

Habitat in Bahama, Brasilia.

Rostrum plumbeum macula aurantia. Pedes plumbei. Spe-  
culum viride, antice flavum, postice nigrum.

Albeola. 18. A. alba, dorso remigibusque nigris, capite cærule-  
scente, occipite albo.

Anas minor albus & fuscus. Edw. av. 100. t. 100.

Querquera ludoviciana. Briss. av. 6. p. 461. t. 41. f. 1.



*Habitat in America*

Rostrum nigricans. Pedes auranti.

clypeata. 19. A. rostri extremo dilatato rotundato : ungue incur-  
vo. *Fn. svec.* 119. \* *It gotl.* 167. \*

Anas platyrhynchos erythropus. *Aldr. orn.* 3. p. 230,  
231. *Will. orn.* 283.

Anas platyrhynchos pedibus luteis. *Aldr. orn.* 3. p.  
230. t. 232. *Will. orn.* 284. *Raj. av.* 144. n. 13.

Anas virescens. *Marsf. dan.* 5. p. 120. t. 58. *Catesb.*  
*car.* 1. p. 96. t. 96.

Anas latirostra major. *Gesn. av.* 120. *Aldr. orn.* 3.  
p. 227. t. 230. *Frish. av.* t. 161, 163.

Anas platyrhynchos altera. *Will. orn.* 283. t. 74. *Raj.*  
*av.* 143. *Gesn. av.* 119. *Aldr. orn.* 3. p. 224. t.  
226.

Anas clypeata. *Alb. av. l.* p. 93. t. 97, 98. *Briss.*  
*av.* 6. p. 329. t. 32. f. 1.

β Anas muscaria. *Gesn. av.* 118. *Aldr. orn.* 3. p. 223.  
*Will. orn.* 287. *Raj. av.* 146.

Anas platyrhynchos macula alari purpurea utrinque  
nigra albaque, pectore rufescente. *Fn. svec.* 120. \*  
*Syst. nat.* 10. p. 125. femina est.

*Habitat in Europæ, Americæ maritimis.*

Pedes rubri. Speculum violaceum, antice posticeque  
nigrum margine albo. Remiges primores scapo albo.

strepera. 20. A. speculo alarum rufo nigro albo. *Faun. svec.*  
121. \*

Anas strepera. *Gesn. av.* 121. *Aldr. orn.* 3. p. 234.  
*Briss. av.* 6. p. 338. t. 33. f. 1.

Anas platyrhynchos, rostro nigro plano. *Aldr.*  
*orn.* 3. p. 230. t. 233. *Raj. av.* 145. n. 2.

The godwal or gray. *Will. orn.* 287. t. 72. *Zool.*  
*brit.* t. 00. f. 3.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

Rostrum nigrum. Pedes rubri. Speculum nigrum  
margine antico rufo, postico albo. Uropygium ni-  
grum. Dorsum fuscum, pallido undulatum.

bucepha- 21. A. albida, dorso remigibusque nigris, capite supra  
la. infraque tumido sericeo nitente.

Anas hyberna. *Briss. av.* 6. p. 349.

Anas minor, purpureo capite. *Catesb. car.* 1. p. 95.  
t. 95.

*Habi-*

*Habitat in aquis dulcibus Americæ septentrionalis.*  
*Rostrum fuscum. Pedes rubri.*

- domini- 22. *A. rufa*, capite anteriore fuliginoso, speculo alarum  
 ca, candido, rectricum scapis aterrimis. *Briss. av. 6.*  
*p. 472. t. 41. f. 2.*  
*Chilcanauhtli. Hern. mex. 21. Raj. av. 177.*  
*Chilcanauhtli. Hern. mex. 44. Raj. av. 176.*  
*Habitat in America meridionali.*

- Clangula* 23. *A. nigro alboque varia*, capite tumido violaceo: sinu  
 oris macula alba. *Fn. svec. 192. \* It. æl. 49. \**  
*Clangula. Gesn. av. 119. Aldr. orn. 3. p. 224. Alb.*  
*av. 1. p. 92. t. 96.*  
*Anas platyrhynchos mas. Aldr. orn. 3. p. 22. t. 225.*  
*Will. orn. 282. t. 73. Raj. av. 142. Marf. dan.*  
*5. p. 114. t. 55.*  
*Habitat in Europa; sæpius maritima. Urinatur egre-*  
*gie quæsitura cochleas: trachea ventricosa, oculis*  
*æneis.*  
*Speculum album, subtus fuscum. Cauda subbifurca.*  
*Remiges 1 — 14. nigricantes; 16 — 21. albæ. Ro-*  
*strum nigrum. Pedes rubri. Feminae.*

- rustica. 24. *A. fusco-cinerea*, macula aurium alarumque alba.  
*Anas minor ex albo & fusco varia. Catesb. car. 1. p.*  
*98. t. 98.*  
*Querquedula carolinensis. Briss. av. 6. p. 466.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Mas albo nigroque varius. Briss.*

- perspicil- 25. *A. nigra*, vertice nuchaque albis, macula nigra ro-  
 lata, stri pone nares.  
*Anas canadensis major niger. Edw. av. 155. t. 155.*  
*Anas nigra major freti hudsonis. Briss. av. 6. p. 425.*  
*Anser maximus niger. Raj. av. 138. n. 2.*  
*Habitat in Canada.*  
*Corpus nigrum. Remiges & Rectrices nigrae. Ro-*  
*strum rubrum macula quadrata nigra ad basin. Pe-*  
*des rubri. Macula alba triangularis in vertice &*  
*in nucha.*

- Glaucion* 26. *A. corpore nigricante*, pectore nebuloso, speculo  
 alarum albo lineari.



*Anas iridibus flavis, capite griseo, collari albo. Faun. svec. 123. \**

*Anas platyrhynchos. Gesn. av. 118. Aldr. orn. 3. p. 223.*

*Anas platyrhynchos minor. Aldr. orn. 3. p. 227. t. 229.*

*Anas fera fusca minor. Will. orn. 281. t. 73.*

*Anas fera, capite fusco, major. Will. orn. 282. Raj. av. 144. n. 12.*

*Glaucion. Bell. av. 33: b. Gesn. av. 108. Aldr. orn. 3. p. 215. t. 216. Will. orn. 231. Raj. av. 144. Briss. av. 6. p. 406. t. 36. f. 1, 2.*

*Habitat in Europæ maritimis.*

*Rostrum nigrum. Pedes nigricantes.*

*Penelope. 27. A. cauda acutiuscula, crisso nigro, capite brunneo, frönte alba, dorso cinereo undulato. Fn. svec. 124. \**

*Penelope. Gesn. av. 108. Aldr. orn. 3. p. 217. t. 219, 220. Jonst. av. 49. Will. orn. 288. t. 72. Raj. av. 146.*

*Anas fistularis. Gesn. av. 121. Aldr. orn. 3. p. 234.*

*Habitat in Europæ maritimis & paludibus.*

*Rostrum Pedesque nigri. Speculum azureum, antice posticeque nigrum.*

*acuta. 28. A. cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato. Faun. svec. 126. \**

*Anas cauda forcipata pedibus longiore, macula alarum cupreo fusca. Kram. austr. 340. \**

*Anas longicauda. Briss. av. 6. p. 369. t. 34. f. 1, 2.*

*Anas fera marina. Gesn. av. 120.*

*Anas See-Vogel. Aldr. orn. 3. p. 229.*

*Anas cauda acuta. Gesn. av. 121. Aldr. orn. 3. p. 234. Will. orn. 289 t. 73. Raj. av. 147. Alb. av. 2 p. 84. t. 94. Frisch. av. t. 160.*

*Habitat in Europæ maritimis; Hybernatur in Austria.*

*Rostrum Pedesque nigricantes. Speculum violaceum, antice ferrugineum, postice nigrum albumque. Rectrices 2 intermediae longissimæ nigrae.*

*hyemalis. 29. A. cauda cuneata: rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus pectore dorso alisque nigris. Fn. svec. 225. \**

*Anas islandica* Havelda. *Worm. mus.* 302. *Will. orn.* 290. *Raj. av.* 145. n. 14. *Briss. av.* 6. p. 379.

*Anas cauda acuta canadensis.* *Edw. av.* 156. t. 156. *Habitat in Europa & America arctica.* Hieme ad nos migrat; æstate versus septentrionem ulterius pergit.

*Cauda alba; Rectricibus 2 intermediis longissimis nigris.*

glacialis. 30. *A. cauda acuminata elongata, corpore nigro, subtus albo.*

*Anas longicauda ex insula terræ novæ.* *Briss. av.* 6. p. 382. *Edw. av.* 280. t. 280.

*Habitat in insula terræ novæ.*

*Rostrum nigrum fascia rubra. Pedes rubri. Occiput, gula pectusque alba. Caudæ Rectrices 4 mediæ nigræ intermediis longissimis, reliquis albis.*

ferina. 31. *A. cinereo-undulata, capite brunneo, fascia pectorali crisso uropygioque nigro.* *Fn. svec.* 127. \*

*Anas fera fusca.* *Gesn. av.* 116. *Aldr. orn.* 3. p. 221. t. 552. *Will. orn.* 288. t. 72. *Raj. av.* 143. *Alb. av.* 2. p. 87. t. 98.

*Penelope.* *Briss. av.* 6. p. 384. t. 35. f. 1.

*Habitat in Europæ maritimis.*

*Corpus cinereum, lineolis fuscis undulatum. Caput castaneum. Pectorale corpus ambiens fuliginosum. Remiges secundariæ apice albo. Caudæ rectrices superiores & inferiores nigræ. Rostrum Pedesque nigricantes.*

Querquedula. 32. *A. macula alarum viridi, linea alba supra oculos.* *Fn. svec.* 128. \*

*Sarcelle.* *Bell. av.* 37.

*Kernell.* *Gesn. av.* 107. *Aldr. orn.* 4. p. 210.

*Querquedula prima.* *Aldr. orn.* 3. p. 209. t. 549. *Will. orn.* 291. t. 74. *Raj. av.* 148.

*Querquedula.* *Briss. av.* 6. p. 427. t. 39. f. 1, 2.

*Boschas bellonii.* *Gesn. av.* 104. *Aldr. orn.* 3. p. 208. t. 548.

*Phaschas forte gesnero.* *Will. orn.* 289. *Raj. av.* 147. femina.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

*Pedes & Rostrum nigricantia. Speculum viride margine anteriore & posteriore nigro.*



- Crecca. 33. A. speculo alarum viridi, linea alba supra infraque oculos. *Faun. svec.* 129. \* *Strom. sondm.* 200. n. 3. Anas fera XVI. *Raj. av.* 148. n. 9. Phaschas. *Gesn. av.* 104. *Aldr. orn.* 3. p. 207. Querquedula. *Gesn. av.* 105. Querquedula secunda. *Aldr. orn.* 3. p. 209. t. 550. *Will. orn.* 290. t. 74. *Raj. av.* 147. Querquedula francia. *Alb. av.* 1. p. 95. t. 100. ♂ 2. p. 91. t. 102. *Habitat in Europæ aquis dulcibus.* Corpus undulatum albo ♂ nigricante. Tempora viridi-sericea : linea supra infraque oculos albida. Caput ferrugineum. Speculum viride, antice album, supra infraque nigrum margine albo. Rostrum nigrum. Pedes cinerei.
- Circia. 34. A. speculo alarum varii coloris, linea alba superciliari, rostro pedibusque cinereis. *Faun. svec.* 129. \* *Brunnich. orn.* 83. Anas Circia. *Gesn. av.* 106. *Aldr. orn.* 3. p. 209. *Will. orn.* 290. t. 76. *Raj. av.* 148. n. 7. *Alb. av.* 2. p. 92. t. 103, 104. *Habitat in Europæ paludibus fluviisque.* Pectus rufescens. Genæ ♂ Gula castanea. Speculum nigro-virens, supra infraque nigrum, margine antico posticoque album.
- histrioni- 35. A. fusca albo cæruleoque varia, auribus, temporibus ca. linea gemina, collari fasciaque pectorali albis. *Brunn. orn.* 84. Anas fuscus maculatus. *Edw. av.* 99. t. 99. Anas torquata ex insula terræ novæ. *Briss. av.* 6. p. 362. *Habitat in America, Islandia.* Speculum cæruleum linea alba transversa. Rostrum Pedesque nigra.
- minuta. 36. A. grisea, auribus albis, remigibus primoribus nigricantibus. Anas canadensis minor fuscus. *Edw. av.* 157. t. 157. Querquedula freti hudsonis. *Briss. av.* 6. p. 469. *Habitat in Canada, Islandia.* Parva admodum, tota grisea. Punctum album ad aures utrinque. Basis mandibulæ superioris alba.

discors. 37. *A. tectricibus alarum cæruleis, remigibus secundariis extus viridibus, fascia frontali alba.*

*Anas subfusca minor, remigibus extimis cæruleis, fascia alba in fronte. Brown. jam. 481.*

*Querquedula americana variégata. Catesb. car. 1. p. 100. t. 100. Briss. av. 6. p. 452.*

*β. Querquedula americana fusca. Catesb. car. 1. p. 99. A. 99.*

*Querquedula virginiana. Briss. av. 6. p. 455.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Mas α. caput ♂ collum violaceum pileo nigro; ante oculos fascia utrinque alba. Pectus testaceum. Rostrum nigrum. Pedes lutei. Speculum viride. Corpus fuscum, griseo undulatum.*

*Femina β. Corpus griseum.*

viduata. 38. *A. fusca, capitis antico albo postico nigro, pedibus cæruleis.*

*Vindila Hispanis.*

*Habitat in Carthagenæ lacubus. D. Jacquin. fistulans uti A. arborea ♂ autumnalis.*

*Corpus fuscum absque crista ♂ recurvatis pennic. Abdomen lineolis transversis interruptis e griseo ♂ nigro varium. Pectus ♂ Collum ad eandem altitudinem rufa. Caput dimidia antica parte album; postica vero nigrum. Rostrum oculique nigri. Adeoque avis pulcherrima, A. autumnali paulo minor. Jacqu.*

autumna- 39. *A. grisea, remigibus cauda ventrequé nigris, speculo lis. alarum fulvo alboque.*

*Anas fistularis rufus, rostro rubro, occidentalis. Edw. av. 194. t. 194.*

*Anas fistularis americana. Briss. av. 6. p. 400. t. 38. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Speculum latum album, antice fulvum. Uropygium rectricesque nigra. Rostrum Pedesque rubri.*

*\* \* \* Pennis aliquot recurvis.*

Boschas. 40. *A. rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto. Fn. spec. 131. \**



*Anas fera torquata minor.* Gesn. av. 113. t. 114.  
Aldr. orn. 3. p. 202. Raj. av. 145. Frisch. av. t.  
150, 159. Briss. av. 6. p. 318.

*Bochas major.* Will. orn. 284. t. 72. Alb. av. 2.  
p. 89. t. 100. Aldr. orn. 3. p. 211. t. 212.

β. *Anas domestica.* Jonst. av. 141. t. 49. Will. orn.  
293. t. 75. Aldr. orn. 3. p. 198. Gesn. av. 96.  
Raj. av. 150. Alb. av. 3. p. 41. t. 99. Briss. av.  
6. p. 308.

*Boschas torquata major.* Gesn. av. 114. t. 115. Aldr.  
orn. 3. p. 213.

*Habitat in Europæ lacubus; ♂ mansueta.*

*Mas autumnno feminis similis, ova numerosa parere in-*  
*cipit florescente Hepatica. Visitat Ranis, Culicibus,*  
*Lemna, sordibus.*

*Speculum cæruleum margine nigro, antice posticeque*  
*album. Pedes rubri. Feminae pennæ caudæ non*  
*recurvantur.*

adunca. 41. *A. rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro*  
*incurvato.*

*Anas domestica, rostro adunco.* Will. orn. 280. Raj.  
av. 150. Alb. av. 2. p. 86. t. 97, 96.

*Habitat in Belgio, hodie ui præcedens domestica.*

*Quomodo hæc a priori exorta, sit me fugit; differt enim*  
*solo rostro.*

*Spontaneæ descriptio, quæ constans; mansueta enim*  
*variat. Caput, Collum, Uropygium viridi-nitentia;*  
*subtus nigra. Remiges primores 5 extimæ albæ;*  
*secundariæ exteriores apice exterius albo marginatæ*  
*♂ margine exteriori longitudinali obscuriores. Gu-*  
*læ macula ovalis alba. Irides fulvæ. Pallas adum-*  
*brant.* 248.

galericu- 42. *A. crista dependente, dorsoque postico utrinque pen-*  
*lata. na recurvata compressa elevata.*

*Querquedula sinensis elegans.* Edw. av. 102. t. 102.  
Briss. av. 6. p. 450.

*Kinmodsuis.* Kæmph. jap. 129. t. 10.

*Habitat in China.*

*Crista viridis rubraque. Rostrum rubescens. Pedes*  
*fulvi. Dorsum fuscum maculis cæruleis. Pennæ dor-*  
*si erectæ rufæ obtusæ. Remex intimus, clausis alis,*  
*altero margine erigitur supra dorsum, rufus, an-*  
*trorsum falcatus.*

\* \* \* \* *Cristatæ.*

Sponsa. 43. A. crista dependente duplici viridi cæruleo alboque varia.

Anas cristatus elegans. *Catesb. car. 1. p. 97. t. 97.*

*Edw. av. 101. t. 101.*

Anas fusca cristata, ad gulam alba, iride flammea.

*Brown. jam. 481.*

Anas æstiva. *Briss. av. 6. p. 351. t. 32. f. 2.*

Avis varii capitis. *Fern. mex. 28. Raj. av. 176.*

Avis non consistens. *Nieremb. nat. 215.*

*Habitat in America septentrionali.*

Crista dependens viridi alboque cærulea, striata uti ♂

dorsum. Pectus griseum, albo maculatum. Gula

alba. Caput violaceum, superciliaris linea alba.

Pedes rubri.

arborea. 44. A. grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque maculato.

Anas fistularis rufus, rostro nigro, occidentalis. *Edw.*

*av. 193. t. 193.*

Anas fistularis arboribus insidens. *Sloan. jam. 2. p. 324.*

*t. 272. Raj. av. 192. Briss. av. 6. p. 403.*

*Habitat in America.*

Rostrum Pedesque nigricantia.

Fuligula. 45. A. crista dependente, corpore nigro, abdomine speculoque alarum albis. *Fn. svec. 132. \**

Anas Fuligula. *Gesn. av. 107. Aldr. orn. 3. p. 221.*

*Will. orn. 280. t. 73. Alb. av. 1. p. 91. t. 95.*

Anas cristata. *Raj. av. 142.*

Anas cirrhata. *Gesn. av. 120. Aldr. orn. 3. p. 229.*

Anas platyrhynchos minor prior. *Aldr. orn. 3. p. 227.*

*t. 228.*

Querquedula cristata f. colymbis. *Aldr. orn. 3. p. 210.*

*Strauszendt. Gesn. av. 107.*

*Habitat in Europæ maritimis.*

*Mas, incubante femina, nos deserit.*

Rostrum Pedesque plumbei. Speculum album.

68. MERGUS. Rostrum denticulatum, subulato-cylindricum apice adunco.

cuculla- r. M. crista globosa utrinque alba, corpore supra fusco,  
tus. subtus albo.

Anas



*Anas cristatus.* *Catesb. car.* 1. p. 94. t. 94. *Edw.*  
av. 360. t. 360. f. 3.

*Merganser virginianus.* *Briss. av.* 6. p. 258.

*Avis venti.* *Hern. mex.* 24, 33. *Will. orn.* 301.  
*Raj. av.* 175.

*Avis venti altera.* *Hern. will.* *Raj. l. c.*

*Habitat in America.*

*Corpus supra nigricans, subtus albicans.* *Christa capite major lateribus alba margine nigro.* *Pedes Rostrumque nigra.*

**Mergan- 2.** *M. crista longitudinali erectiuscula, pectore albido immaculato, rectricibus cinereis scapo nigricante.*

*Mergus ferratus s. longiroster major.* *Gesn. av.* 134.  
*Aldr. orn.* 3. p. 283. *Raj. av.* 134.

*Merganser.* *Gesn. av.* 134. *Aldr. orn.* 3. p. 285.  
*Will. orn.* 253. t. 64. *Raj. av.* 134. *Mars. danub.*  
78. t. 37. *Briss. av.* 6. p. 231. t. 22.

*Anas raucedula.* *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. p. 281.  
*Zool. brit. t. N. N.*

*Habitat in Europa.*

*Tectrices inferiores alæ albæ. Speculum album, nigro bifidum. Rostrum Pedesque rubra.*

**Serrator. 3.** *M. crista dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus fuscis cinereo variegatis.*

*Mergus crista dependente, capite nigro-cærulescente, collari albo.* *It. gotl.* 166. \* *It. æl.* 49. \* *Fn. svec.* 135. \* *Mas.*

*Mergus crista dependente, capite nigro maculis ferrugineis.* *Fn. svec.* 136. \* *It. gotl.* 271. \* *Femina.*

*Anas longirostra.* *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. p. 281. t. 282.

*Mergus cirrhatus fuscus.* *Will. orn.* 255. t. 64. *Raj. av.* 135.

*Merganser cristatus.* *Briss. av.* 6. p. 237. t. 23.

*Marle.* *Aldr. orn.* 3. p. 236. *Alb. av.* 2. p. 65. t. 101. *Edw. av.* 95. t. 95.

*Habitat in Europa.*

*Hujus methodus piscandi habetur in Actis Stockh.* 1749. p. 190; rubro allicitur.

*Rostrum Pedesque nigra. Tectrices alarum inferiores variegatæ. Speculum album nigro-bifidum. Pectus grijeum.*

Castor. 4. *M.* capite cristato cinereo, subtus ferrugineo, gula alba, rostro pedibusque nigricantibus.

*Mergus ruber.* *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. p. 281.

*Mergus cinereus.* *Briss. av.* 6. p. 225. t. 25.

Castor f. Fiber. *Bell. av.* 33. *Aldr. orn.* 3. p. 285. t. 284.

*Habitat in Europa australiore.*

*Remiges primores cinereo fuscae. Rectrices cinerae.*

Albellus. 5. *M.* crista dependente, occipite nigro, corpore albo, dorso temporibusque nigris, alis variegatis. *Faun. svec.* 137. \*

*Mergus Tinus.* *Hasselq. iter.* 269.

*Mergus major cirratus.* *Raj. av.* 135.

*Mergus rhenanus.* *Gesn. av.* 131. *Aldr. orn.* 3. p. 274. t. 275. *Will. orn.* 225. *Raj. av.* 135.

*Mergus varius.* *Gesn. av.* 132.

*Mergus varius monialis fuscus.* *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. p. 282. *femina.*

*Mergus argentinensis.* *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. p. 282. *femina.*

*Mergus mustelaris.* *Gesn. av.* 132. *femina.*

*Merganser cristatus minor* f. *Albellus.* *Briss. av.* 6. p. 243. t. 24. f. 1, 2.

*Albellus aquaticus.* *Aldr. orn.* 3. p. 276. t. 277.

*Albellus alter.* *Aldr. orn.* 3. p. 276. *Alb. av.* 1. p. 85. t. 89. *Will. orn.* 254. t. 64.

*Habitat in Europa.*

*Rostrium Pedesque nigri. Speculum album.*

minutus. 6. *M.* capite lævi griseo: fascia oculari nigra, macula suboculari alba.

*Mergus glacialis.* *Aldr. orn.* 3. p. 279. t. 80. *Will. orn.* 254. *Raj. av.* 135. n. 3.

*Mergus albus.* *Gesn. av.* 133. *Aldr. orn.* 3. p. 282.

*Mergus varius alter.* *Gesn. av.* 132.

*Merganser stellatus.* *Briss. av.* 6. p. 252. *Alb. av.* 1. p. 77. t. 88.

*Habitat in Europa.*

*Rajus hanc feminam Albelli facit. Remiges primores nigrae, unde speculum alarum atrum, antice posticeque album.*



69. ALCA. *Rostrum* edentulum, breve, compres-  
sum, convexum, fulcatum sæpius  
transverse: *Mandibula* inferior an-  
te basin gibba.

*Nares* pone rostrum.

*Pedes* plerisque tridactyli.

Torda. 1. A. rostri fulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro  
ad oculos. *It. gotl.* 285. \* *Fn. svec.* 139. \*

Alca. *Clus. exot.* 367. *Worm. mus.* 363. *Will. orn.*  
243. t. 64. f. 1. ♂ t. 65. f. 2. *Raj. av.* 119. *Alb.*  
av. 3. p. 90. t. 95. *Edw. av.* 358. t. 358. f. 2.  
*Ström. sondm* 219. n. 2.

*Habitat* in Europæ borealis oceano. *Plures* ova solita-  
ria simul in antro rupium pariunt, conjunctis viribus  
alternatim excludunt, unica excubias agente; erectæ  
incedunt.

*Nares* pone rostrum. *Remiges* 12 -- 26 apice albæ,  
unde linea alæ.

Pica. 2. A. rostro lævi compresso, corpore toto subtus apici-  
busque remigum posticarum albis, pedibus rubris.  
Alca minor. *Briss.* av. 6. p. 92. t. 8. f. 2. *Ström.*  
*sondm.* n. 3.

*Mergus.* *Bell.* av. 37. *Aldr.* av. 3. p. 240. t. 241.  
*Will. orn.* 243. t. 54. *Raj. av.* 119. n. 2.

*Habitat* intra Circulum Arcticum.

*Avis* magnitudine & statura Tordæ. *Gula* & *Collum*  
subtus alba. *Pedes* tridactyli sunt. *Rostrum* ruga  
unica obsoleta, reliquis longius. *Corpus* mutat co-  
lores.

impennis. 3. A. rostro compresso-ancipiti fulcato, macula ova-  
ta utrinque ante oculos. *Fn. svec.* 140.

Alca major. *Briss.* av. 6. p. 85. t. 7.

*Mergus americanus.* *Clus. exot.* 103.

*Goirfugel.* *Clus. auct.* 367.

*Penguin.* *Will. orn.* 244. t. 65. *Edw. av.* 147. t.

147. *Olear. mus.* 23. t. 13. f. 6. *Worm. mus.* 300.  
t. 301.

---

Alcæ impennes nequeunt volare.

*Pennatæ* aliæ, in terra stabulantes, erectæ incedunt.

t. 301. *Raj. av.* 118. n. 1. *Oelig. mus.* 1. f. 2.  
n. 1. t. 1. f. 1.

*Habitat in Europæ arcticæ alto maris.*

*Impennis compesque est, uti Diomedææ. Corpus duplo  
maius reliquis, impenne s. non volitans. Remiges se-  
cundariæ apice albo. Rostrum fulcis 8-10, nigrum.  
Nares pone rostrum. Pedes nigri.*

arctica. 4. A. rostro compresso - ancipiti sulcato fulcis quatuor,  
oculorum orbita temporibusque albis, palpebra  
superiore mucronata. *Fn. svec.* 141. \*

*Anas arctica. Clus. exot.* 104. *Raj. av.* 120. *Worm.*  
*mus.* 302. *Olear. mus. t.* 15. f. 5. *Will. orn.* 244.  
t. 65. *Raj. av.* 120. *Alb. av.* 2. p. 73. t. 78, 79.  
*Sibb. scot.* 2. p. 20. t. 15. f. 1. *Edw. av.* 358. t.  
358. f. 1.

*Lunda. Gesn. av.* 725. *Oelig. mus.* 2. f. 11. t. 11.  
f. 21. *Clus. exot.* 367.

*Pica marina. Aldr. orn.* 3. p. 215.

*Pittacus marinus. Anders. isl.* 2. p. 55. t. 1.

*Fratercula. Briss. av.* 6. p. 81. t. 6. f. 2.

*Puffinus anglicus Gesn. av.* 113. *Zool. brit. t. H. H.*  
*Habitat in Europæ borealis oceano; compes, parit. &*  
*ovum.*

*Avis nigra. Addomen, pectus, genæque alba. Sinus  
oris alba macula. Palpebra superior apice acuto car-  
noso. Rostrum rubrum, basi nigrum, compresso-an-  
ceps, figura fere Crotophagæ.*

Alle. 5. A. rostro lævi conico, abdomine toto subtus remi-  
gumque posticarum apicibus albis, pedibus nigris.  
*Fn. svec.* 142. \* *Brunnich. orn.* 106. \* *Zool. brit. t.*  
*H. 4.*

*Columba groenlandica. Alb. av. l. p.* 81. t. 85. *Edw.*  
*av.* 91. t. 91.

*Plautus columbarius s. Columba groenlandica minor.*  
*Gunn. act. nidros.* 1. p. 261. t. 6.

*Uria minor. Briss. av.* 6. p. 73.

*Mergus melanoleucus, rostro acuto brevi. Will. orn.*  
*261. t. 59. Raj. av.* 125. n. 5. *Strøm. nordm.* 255.

*Habitat in Europæ, Americæ arcticæ pelago, inter  
glaciei fragmenta.*



*Corpus magnitudine Columbæ , atrum , Pectore Abdomi-  
neque albis. Dorsum lineolis aliquot albis. Remiges  
secundariæ apice albæ. Punctum album supra oculos.  
Rostrum ruga obsoleta. Collum subtus minime album ,  
at vero in femina cinereum gula alba.*

70. PROCELLARIA. *Rostrum edentulum , sub-  
compressum : Mandibulis  
æqualibus : superiore api-  
ce adunca ; inferiore api-  
ce compresso-canaliculata.  
Naves cylindro supra basin  
rostri decumbente , trun-  
cato.*

*Pedes palmati : ungue po-  
stico fessili absque digito.*

pelagica. 1. *P. nigra , uropygio albo. Faun. svec. 143. \* Act.  
stockh. 1745. p. 93. t... \**

*Peterel. Clus. exot. 368. Will. orn. 306. Damp.  
itin. 3. p. 97. Alb. av. 3. p. 87. t. 92. Edw. av. 90.  
t. 90. f. 1.*

*Larus minimus , naribus tubulosis. Catesb. car. 3. p.  
14. t. 14.*

*Procellaria. Briss. av. 6. p. 140. t. 13. f. 1.*

*Rotie Anders. isl. 2. p. 54. f. 1.*

*Habitat in alto Oceano. Currit super undas maris , lit-  
tora fugiens. Instante procella arcte naves appropin-  
quat , unde præfagia Nautarum. Per anum & os  
trahitur ellychnium , quod accensum alitur pinguedine  
corporis & loco candelæ inservit Ferroensibus. Bruun.  
117.*

Fregata. 2. *P. nigra , subtus alba , pedibus nigris.*

*Fregata marina apus , subtus alba , superne nigra  
Barr. av. 73.*

*Hirundo americana. Rochef. it. 134. t. 135.*

*Habi-*

*Habitat in Oceano , Pelago.*

*Avis paulo minor P. pelagica.*

- glacialis. 3. *P. albicans*, dorso canescente. *Faun. svec.* 144. \*  
*Mart. act. stockh.* 1759. *Gunner. act. nidros.* 1. p.  
 182. t. 1. *Stræm. sondm.* 231\*  
*Larus marinus maximus groenlandicus.* *Anders. isl.*  
 173. n. 10.  
*Vagellus cornubiensium.* *Raj. av.* 130.  
*Eqvus marinus.* *Clus. auct.* 368. *Will. orn.* 306.  
*Malle mucke.* *Martens. spitsb.* 68. t. N. f. C.  
*Procellaria cinerea.* *Briss. av.* 6. p. 143. t. 12. f. 2.  
*Habitat in Mari glaciali s. intra tropicum arcticum ,*  
*Nidificat in Grönlandia , Spitsberga. Edit Balænas*  
*occisas mortuasve ; homines vix metuit audacissima.*  
*Narium Tubus constat unico cylindro biloculari , nec duo-*  
*bus distinctis , fuscus in rostro rufescente. Corpus al-*  
*bum cum tinctura canescenti-subincarnata , dorso toto*  
*magis canescente. Cauda rotundata , albicans. Pedes*  
*rubri.*

- æquino- 4. *P. fusca immaculata*, rostro flavo , pedibus fuscis.  
 ctialis. *Sterna major fusca humile volitans.* *Brown. jam.*  
 482,  
*Puffinus capitis b. spei.* *Briss. av.* 6. p. 137.  
*Avis diomedea.* *Redi dissert.* 1674. *Amstel.*  
*Peteril magna nigra.* *Edw. av.* 89. t. 89.  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*  
*Narium tubus constat cylindris duobus distinctis paral-*  
*lelis.*  
 capensis. 5. *P. albo fuscoque varia.* *Amæn. acad.* 4. p. 240. *Osborn.*  
*itin.* 76.  
*Procellaria nævia.* *Briss. av.* 6. p. 146.  
*Damiet. Fewill. peruv.* 211.  
*Anas alia indica.* *Gesn. av.* 803. t. 804. f. 2.  
*Peteril media maculata.* *Edw. av.* 90. t. 90. f. 2.  
*Habitat ad Cap. b. Spei ; unde præfagia Nautarum*  
*quod C. B. S. appropinquant.*

- Puffinus.* 6. *P. corpore supra nigro , subtus albo , pedibus rufis.*  
*Brünnich. orn.* 119. \*  
*Diomedea avis.* *Gesn. av.* 381. *Aldr. orn.* 3. p. 57.  
 t. 59. *Will. orn.* 251. *Raj. av.* 133.



*Puffinus anglorum.* Will. orn. 251. Raj. av. 134.  
Edw. av. 359. t. 359 Briss. av. 6. p. 131. Penn. brit.  
t. M.

*Sterna dorso fusco, ventre uropygio fronteque albidis.*  
Brown. jam. 482.

*Aquæ superficiem radens.* Will. orn. 252. Raj. av.  
133.

*Habitat in Oceano septentrionali, nidificat uno ovo in  
cuniculorum foraminibus, piscatur toto die, nec ante  
vesperam ad pullum redit. Rajus; Nidificat & in-  
cubat dorso incumbens. Stræm.*

*Corpus magnitudine Columbæ; supra nigrum, subtus al-  
bum. Remiges primores & Rectrices extrorsum fu-  
scæ, introrsum albæ. Genæ cærulescentes. Rostrum  
nigrum. Pedes nigri rubrique simul.*

71. DIOMEDEA. *Rostrum rectum: maxilla supe-  
riore apice adunca; inferiore  
truncata.*

*Nares ovatæ, patulæ, promi-  
nulæ, laterales.*

*exulans. 1. D. alis pennatis, pedibus æquilibribus tridactylis.*  
*Albatros.* Edw. av. 88. t. 88. Alb. av. 3. p. 76.  
t. 81. Grew. mus. t. 6. f. 1. Briss. av. 6. p. 126.  
*Habitat intra tropicos Pelagi & ad Cap. b. Spei,*  
*æthera altissime scandens; victitans e Triglis volantibus*  
*a Coryphæa exagitatis.*  
*Statura Pelecani Aquili, alis longissimis; naribus ovatis*  
*prominulis, non vero linearibus; cauda rotundata bre-  
vi, nec forficata. Femora denudata. Pedes æquibres.*  
*Alæ longissimæ.*

*demersa. 2. D. alis impennibus, pedibus compedibus tetrada-  
ctylis: digitis omnibus connexis.*

*Penguin.* Laet. amer 511. Will. orn. 242.

*Penguin pedibus nigris.* Edw. av. 94. t. 94.

*Anser magellanicus.* Clus. exot. 101.

*Scheniscus.* Briss. av. 97.

*Scheniscus nævius.* Briss. av. 6. p. 99. t. 9.

*Habitat in Cap. b. Spei.*

Corpus magnitudine Anatis majoris. Dorsum fusco - cinereum ; subtus album ; Linea lateralis nigricans , ante pectus arcuata. Caput subtus fuscum. Rostrum edentulum , basi striatum , apice aduncum , subtus fascia alba. Faux retrorsum dentata. Nares angustæ. Capistrum nudum , pilis rarissimis brevissimis adpersum. Alæ impennes , squamatæ pennis minutissimis , supra fuscae , subtus albo fuscoque nebulosæ , margine postico albæ. Cauda brevissima , rotundata , Rectricibus circiter 20 , supra fascia alba testricum. Pedes compedes , tetradactyli , palmati , pollice etiam antico , sed brevi , reliquis connexo.

72. PELECANUS. Rostrum edentulum , rectum :  
apice adunco , unguiculato.  
Nares rima oblitterata.  
Facies nudiuscula.  
Pedes æquilibres : digitis omnibus quatuor simul palmatis.

\* Rostro edentulo.

Onocrot. 1. P. gula faccata. Syst. nat. 23.

Orientalis. Onocrotalus. Gesn. av. 630. Olear. mus. t. 13. f. 1.  
lis. Briss. av. 6. p. 519.

Pelecanus. Bell. av. 30.

Onocrotalus s. Pelecanus. Aldr. orn. 3. p. 42. t. 48.  
49. Will. orn. 245. t. 63. Raj. av. 121. Marsil.  
danub. 6. t. 35. Edw. av. 92. t. 92. Bont. jav.  
68. Dodart. mem. 3. p. 189. t. 26.

occidentalis. β. Onocrotalus s. Pelecanus fuscus. Sloan. jam. 2. p.  
322. Raj. av. 191. Briss. av. 6. p. 524.

Onocrotalus americanus. Edw. av. 93. t. 93.

Onocrotalus pedibus cæruleis brevioribus , rostro cochleato. Fewill. peruv. 257.

Pelecanus subfuscus , gula distensili. Brown. jam. 480.

Pelecanus. Voyag. huds. 1. p. 52. t. 1.

Habitat in Africa , Asia , β. in America. Sacco gulari aquam siticulosi pullis adfert , ut etiam conterranei sitim expleant intactis pullis. Migrat hyeme in Ægyptum. Hasselq. it. 288.

Remiges nigrae.



*An americanus*  $\beta$ . *fuscus*, ab orientali  $\alpha$ . albo specie  
sufficienter distinctus?

**Aquilus.** 2. *P.* cauda forficata, corpore nigro, rostro rubro, orbitis nigris. *Amæn. acad.* 4. p. 238. \*

**Pelecanus Aquilus.** *Osborn. iter.* 292.

*Alcyon major pulla*, cauda longiore bifurca. *Brown. jam.* 483.

*Vultur marinus.* *Fewill. peruv.* 107.

*Rabihorcado.* *Nieremb. nat.* 221 *Will. orn.* 306. t. 77. *Raj. av.* 192.

*Cari pira.* *Laët. amer.* 575.

*Man of var.* *Sloan. jam.* 1. p. 30. *Edw. av.* 309. t. 309.

*Avis Rabo focardo.* *Pet. gaz.* t. 54. f. 1. *Will. orn.* 395. t. 153. *Tetr. antill.* 2. p. 269. t. 246.

**Frigata.** *Raj. av.* 153. *Alb. av.* 3 p. 75. t. 80. male.

*Habitat in Pelago vitam agens Diomedæ exulis, cui similis, longissime recedens alis amplissimis imple-  
xu sæpe 14 pedum, unde placide volat, & adeo alte, ut sæpe vix conspiciatur, remotissima a continente.*

*Femina abdomine albo. Mas totus niger, adultior carunculis 2 membranaceis coccineis sub gula. Utrisque Mandibulæ superioris apex multum aduncus.*

**Carbo.** 3. *P.* cauda rotundata, corpore nigro, rostro edentulo, capite subcristato. *Fn. svec.* 145. \*

**Pelecanus** corpore atro, subtus albicante, rectricibus quatuordecim. *Fn. svec.* 116. *Zool. brit.* t. J. I.

**Morfex.** *Gesn. av.* 136. *Aldr. orn.* 3. p. 286. *Bell. av.* 32.

**Phalacrocorax.** *Gesn. av.* 683. *Aldr. orn.* 3. p. 267. t. 269. *Briss. av.* 6. p. 511. t. 45.

**Carbo aquaticus.** *Gesn. av.* 136. t. 137.

**Corvus aquaticus** *Gesn. av.* 350. *Aldr. orn.* 3. p. 261. t. 263. *Jonst. av.* t. 47. *Will. orn.* 248. t. 63. *Raj. av.* 122. *Mars. danub.* 16. t. 36. *Alb. av.* 2. p. 74. t. 81. *Besl. mus.* 29. t. 8.

*Habitat in Europa; nidificat in altis arboribus.*

*Facies non multum denudata, sed gula usque ad oculos nuda cincta arcu flavescente. Occiput subcristatum.*

*Corpus nigrum pennis margine atris; subtus nigrum.*

*Cauda longior laxiorque quam in reliquis aquaticis, rotundata rectricibus XIV. Femorum macula exterior alba nigro punctata.*

\* \* *Mandibulis ferratis.*

Graculus. 4. *P. cauda rotundata, corpore nigro, subtus fusco, re-*  
*trixibus duodecim, rostro edentulo. Fn. svec. 146.*

*Phalacrocorax minor. Briss. av. 6. p. 516.*

*Graculus palmipes aristotelis s. Corvus aquaticus mi-*  
*nor. Aldr. orn. 3. p. 272. t. 273. Will. orn. 249.*  
*t. 63. Raj. av. 123. n. 4.*

*Corvus aquaticus. Alb. av. 2. p. 74. t. 81.*

*Cormoran. Dodart. memb. 3. p. 213. t. 31.*

*Habitat in Europæ marinis.*

*Affinis maxime P. Carbonis, sed minor, Cauda brevior,*  
*Rostro apice minus incurvato, Occipite non cristato.*  
*Aliqui ejus feminam existimant.*

Bassanus. *P. cauda cuneiformi, corpore albo, rostro serrato, re-*  
*migibusque primoribus nigris, facie cærulea. Faun.*  
*svec. 147.*

*Anser Bassanus s. scoticus. Gesn. av. 163. Aldr.*  
*orn. 3. p. 162. Will. orn. 247. t. 63. Sibb. scot.*  
*2. p. 2. t. 9. f. 2. Alb. av. 1. p. 75. t. 86.*

*Sula hojeri. Clus. exot. 367. Will. orn. 249. Raj.*  
*av. 123. n. 5.*

*Sula Bassana. Briss. av. 5 p. 503. t. 44. Ström.*  
*sondm. 233.*

*Soland. Goose. Zool. brit. t. 3. In \* descr. opt.*

*Habitat in Pelago septentrionali, vix approinquans*  
*littora per 2 milliaria; indicat Halecum adventum,*  
*quem sequitur Gentleman s. Jaen von Gent dicta.*

*Insula Scotiæ Basse, mense florentiæ, hujus nidis tota*  
*instrata, ut vix pedem ponere liceat, tantaque copia*  
*supervolitantium, ut nubium instar coelum auferat;*  
*tantusque clamor, ut alloquentes vix audiantur. Harv.*  
*exercit. animal. 11. Pulli primi anni fusci punctis*  
*albis trigonis. Ovum unicum ponit.*

*Corpus album. Remiges primores & parvæ tectrices plu-*  
*rimum nigrae. Rostrum faux faciesque nuda cærulea.*  
*Linea pone oris angulos nigra, nuda.*

Piscator. 6. *P. cauda cuneiformi, rostro serrato, corpore albo, re-*  
*migibus omnibus facieque nigris. Amæn. acad. 4.*  
*p. 239. femina.*

*Diomedea piscatoria femina. Osb. it. 86.*

*Sula candida. Briss. av. 6. p. 501.*



*Habitat in India utraque & Europa ; forte hæc , qua annulo æneo collo circumposito piscantur chinenses.*

*Mandibula superior versus basin margine quasi dente utrinque mutilata. Nares clausæ. Facies s. orbitæ in mea exsiccata nigrae sunt , utrum in vivis rubrae uti Brissoni me latet.*

Sula.

7. P. cauda cuneiformi , corpore albido , rostro dentato , remigibus primoribus apice nigricantibus , facie rubra. Anethæus major mellinus , subtus albidus , rostro serrato. *Brown. jam. 481.*

Anseri bassano congener fusca avis. *Sloan. jam. 2. p. 322. t. 271. f. 2. Raj. av. 291. n. 6.*

Sula. *Briss. av. 6. p. 495.*

Booby. *Catesb. car. 87. t. 87.*

*Habitat in Pelago indico.*

*Bassano dimidio minor. Facies nuda , rubra. Pedes rubri. Mandibula superior magis apice adunca. Remiges non tantum primores , sed & secundariæ extrorsum nigricantes. Rectricesque apice fuscescentes.*

Fiber.

8. P. cauda cuneiformi , rostro serrato , corpore fuscescente , remigibus omnibus nigricantibus , facie rubra.

Sula fusca. *Briss. av. 6. p. 499. t. 43. f. 1.*

Anseri bassano congener cinereo-albus. *Sloan. jam. 1. p. 31. t. 6. f. 1. Raj. av. 191. n. 5.*

Fiber marinus , rostro acutissimo adunco serrato. *Fewill. peruv. 98.*

*Habitat in Oceano , Africano , Americano.*

*Corpus cinereo-fuscum. Uropygium album.*

73. PLOTUS. *Rostrum rectum , acuminatum , denticulatum.*

*Facies tecta.*

*Pedes palmati omnibus digitis connexis.*

Anhinga. 1. PLOTUS.

Anhinga. *Marcgr. bras. 218. Will. orn. 250. t. 72.*

*Raj. av. 124. n. 7. Briss. av. 6. p. 477.*

*Habitat in America australi ; more Serpentum , contracto prius longiore collo , ejaculatur rostrum in Pisces.*

Col-

Collum longum. Pedes breves digitis omnibus connexis. Caput tomentosum plumis minutissimis.

4. PHAËTON. Rostrum cultratum, rectum, acuminatum, Fauce pone rostrum hianti.

Nares oblongæ.

Digitus posticus antrorsum versus.

ethereus. 1. P. rectricibus duabus longissimis, rostro ferrato, pedibus æquilibribus: digito postico connexo.

Avis tropicorum. Catesb. car. 3. p. 14. t. 14. Raj.

av. 191. n. 4. ♂ 123. n. 6. Will. orn. 250. t. 76.

Edw. av. 149. t. 149. f. 1. Sloan. jam. 1. p. 22.

Kalm. iter. 2. p. 149. Osb. iter. 291. Tetr. antill.

2. p. 276. t. 246.

Avis Rabos forcados. Allr. orn. l. 20. p. 544.

Larus leucomelanus, cauda longissima bipenni. Fewill. peruv. 116.

Lepturus. Briss. av. 6. p. 489. t. 24. f. 1.

Lepturus candidus. Briss. av. 6. p. 485. t. 42. f. 2.

Lepturus fulvus. Briss. av. 6. p. 489.

Habitat in Pelago inter tropicos. Osbeck. Unde præ-sagia Nautarum, quod Indias intrarunt.

Magnitudo Anatis, alba, supra lineis nigricantibus undulata tota; subtus immaculata. Fascia nigra per oculos. Rostrum sanguineum, compressum, rectius quam P. Piscatoris, margine retrorsum serratum. Pedes pallidi, extrorsum nigri, digito quarto etiam membrana affixo. Remiges omnes subtus albæ: primores supra latere exteriori nigre; secundariæ supra linea longitudinali nigra. Rectrices albæ in cauda cuneiformi, versus apicem lineola subsagittata fusca; omnes supra rachi nivea.

demersus. 2. P. alis impennibus, pedibus compedibus: digito postico distincto.

Penguin. Edw. av. 49. t. 49.

Catarractes. Briss. av. 6. p. 102.

Habitat ad Tropicum Capricorni.

Rostrum & Pedes rubri. Digitus posticus antrorsum versus. Nares lineares.



75. COLYMBUS. *Rostrum* edentulum, fubulatum  
rectum, acuminatum.

*Faux* dentata.

*Nares* lineares, ad basin rostrum

*Pedes* compedes.

Grylle. 1. *C. pedibus palmatis tridactylis*, corpore atro, tectibus alarum albis. *Fn. svec.* 148. \*

*Columba groenlandica.* *Mart. spitsb.* 56. t. L. f. 1.  
*Will. orn.* 245. *Raj. av.* 121. n. 6. *Alb. av.*  
p. 73. t. 88. *Edw. av.* 50. t. 50. *Andersf. isl.*  
p. 54. t. 1. *Gunn. act. nidros.* 1. p. 258. t.  
*Zool. brit.* t. H. H. 4.

*Uria minor nigra.* *Briss. av.* 6. p. 76.

*Uria minor striata.* *Briss. av.* 6. p. 78.

*Taiste.* *Ström. sondm.* 258.

*Habitat intra circulum arcticum vel in summo arctico minus alte volitans.*

*Rostrum* ♂ *Pedes* ♂ *Faux sanguinea.* *Feminæ* abdomen album. *Pullus* primo anno adspersus maculis albis & nigris. *Hyeme canescit avis capite, collo, anterioreque dorso.*

Troile. 2. *C. pedibus palmatis tridactylis*, corpore nigro, pectore abdomineque niveo, remigibus secundariis apicibus albis. *Faun. svec.* 149. \* *Act. holm.* *Briss. orn.* 108.

*Uria.* *Briss. av.* 6. p. 70. t. 6. f. 1.

*Lomvia.* *Clus. exot.* 367. *Will. orn.* 244. t. 65. *Raj. av.* 120.

*Guillemot.* *Alb. av.* 1. p. 80. t. 84. *Edw. av.* 35. t. 359. f. 1. *Zool. brit.* t. H. H. 3.

*Lumme.* *Mart. spitsb.* 57. t. M. f. A.

*Habitat ad* ♂ *intra circulum arcticum.*

septentrionalis. 3. *C. pedibus palmatis tetradactylis*, collo subtus maculosa scutiformi ferruginea.

*Colymbus Lumme* corpore supra nigricante, subtus albo, collo antice ferrugineo. *Brunn. orn.* 132.

*Colymbus arcticus* collo rufo. *Gunner. act. nidros.* p. 244. t. 2. f. 2.

Co-

*Colymbi nequeunt incedere, at citissime supra aquam currunt, & egregie urinantur.*

Colymbus caudatus, gutture nigro. *Edw. av. 97. t. 97.*

Colymbus arcticus. *Ström. sondm. I. p. 243.*

Mergus gutture rubro. *Briss. av. 6. p. III. t. II. f. I.*

*Habitat in Europæ borealis lacubus : Mas ♂ Femina individui socii. Nidificant in ipso littore absque arte. Ova 2, altero subgloboso ; natant velociter, curstant ocysime supra undas, urinantur egregie, præsagiendo tempestates volitant misereque clamitant.*

*Corpus supra fuscum punctis minutis albis. Collum supra lineolis albidis ; subtus macula scutiformi ferruginea immaculata, a jugulo ad gulam extensa.*

arcticus. 4. C. pedibus palmatis tetradactylis, capite cano, collo subtus atro-violaceo : fascia alba interrupta.

Colymbus arcticus. *Fn. svec. 150. \* It. gotl. 341. \**

Colymbus arcticus capite colloque cinereis, gutture nigro-violaceo, dorso nigro maculis quadrangulibus albis. *Brunn. orn. 133.*

Colymbus arcticus Lumme. *Will. orn. 259. t. 62.*

*Raj. av. 125. n. 7.*

Colymbus arcticus Hymber. *Gunner. act. nidros. I. p. 240. t. 2. f. I.*

Lumme. *Worm. mus. 304. t. Q. Q. Mus. haffn. I. f. 2. n. 2. t. I. n. 2.*

Mergus gutture nigro. *Briss. av. 6. p. 115. n. 4.*

Hirundinis aquaticæ species exotica. *Besl. mus. 31. t. 17.*

*Habitat in Europæ borealis lacubus ♂ mari. Rustici nostrates præcedentis feminam statuunt.*

*Caput canum. Collum supra canum immaculatum ; subtus a gula ad medium atro-violaceum : fascia gulari alba interrupta. Dorsum nigrum fasciis interruptis s. maculis albis quadratis. Alarum tectrices albo punctatæ. Rostrum omnino antecedentis.*

glacialis. 5. C. pedibus palmatis tetradactylis, capite colloque nigro-violaceo, fascia gulæ cervicisque alba interrupta.

Colymbus torquatus capite colloque nigro-virescentibus, medio colli torque ex albo nigroque, dorso maculis quadratis albis. *Brunn. orn. 134.*

Colymbus maximus ferroensis s. arcticus. *Clus. exot. 102. Worm. mus. 303. Nieremb. nat. 216.*



*Colymbus maximus stellatus.* *Sibb. scot. 2. p. 20. f. 1.*

*Mergus maximus farrensis.* *Will. orn. 259. Raj. av. 125. n. 4. β. Alb. av. 3. p. 39. t. 39. Edw. av. 146. t. 146.*

*Mergus major nævius.* *Briss. av. 6. p. 120. t. 111. f. 2.*

*Habitat in Mari arctico.*

*Major duplo duobus præcedentibus. Rostrum pallidum, duplo altius. Caput & Collum atro-violacea. Gula fascia alba interrupta. Cervix in media fascia alba lata, antice non coiens. Dorsum nigrum maculis quadratis albis. Alarum testrices punctis albis.*

*Immer, 6. C. pedibus palmatis tetradactylis, corpore supra nigrescente albo undulato, subtus toto albo.* *Brunn. orn. 129.*

*Colymbus Imber s. Immer.* *Gunner act. nidr. 1. p. 246. t. 13. Ström. sondm. 1. p. 236.*

*Habitat in Oceano glaciali; an præcedentis varietas? negat Ström.*

*Corpus supra nigrescens marginibus pennarum albis. Subtus album fascia nigra inter femora, uti tres præcedentes.*

*cristatus. 7. C. pedibus lobatis, capite rufo, collaris nigro, remigibus secundariis albis.* *Fn. svec. 151. \**

*Colymbus major cristatus s. cornutus.* *Gesn. av. 1399. Aldr. orn. 3. p. 253. t. 255. Will. orn. 257. t. 61. Raj. av. 124. Marsil. danub. 80. t. 38. Albb. av. 1. p. 71. t. 81.*

*Colymbus cornutus.* *Briss. av. 6. p. 45. t. 5. f. 111.*

*Colymbus major secundus.* *Aldr. orn. 3. p. 251.*

*Mergus alius, in lacu tigurino.* *Gesn. av. 138. t. 1399.*

*Ardea exotica aurita.* *Pet. gaz. 68. t. 43. f. 2.*

*Avis cucullatæ exoticæ admiranda species.* *Best. mus. 32. t. 8.*

*Habitat in Europa.*

*auritus. 8. C. pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato-ferugineis.* *Fn. svec. 152. \**

*Colymbus s. Podiceps minor.* *Will. orn. 258. t. 611. Sloan. jam. 2. p. 322. t. 271. f. 1. Raj. av. 125. Marj.*

*Marf. danub.* 82. t. 39. *Alb. av.* 2. p. 70. t. 67.

*Edw. av.* 145. t. 145. ♂ 96. l. 96.

*Colymbus minor.* *Aldr. orn.* 3. p. 256.

*Colymbus cornutus minor.* *Briss. av.* 6. p. 50.

*Trapazorola* f. *Mergulus.* *Gesn. av.* 140.

β. *Colymbus auritus.* *Briss. av.* 6. p. 54. *Edw. av.* 96. t. 96.

*Merguli* genus alterum. *Gesn. av.* 141.

γ. *Colymbus fluviatilis.* *Briss. av.* 6. p. 59.

*Colymbus parvus.* *Bell. av.* 38.

*Colymbus minor bellonii.* *Aldr. orn.* 3. p. 257. t. 258.

*Colymbus vel Urinatrix.* *Gesn. av.* 128.

*Mergus parvus fluviatilis.* *Gesn. av.* 141.

*Urinatricum tertium genus.* *Aldr. orn.* 3. p. 257.

*Habitat in summis Europæ & Americæ lacubus, at*  
*Nidum natantem conficit inter arundines.*

*Avis mire variat ætate, tempore anni, sexu.*

Urinator. 9. *C. pedibus lobatis, capite lævi, macula alarum alba.*  
*Colymbus major lacus lemni.* *Edw. av.* t. 360. f. 2.  
*Habitat in Europa australi.*  
*Corpus supra nigrum, subtus album. Macula alarum*  
*lata, alba. Linea nigra inter oculos & rostrum.*  
*Palpebra inferior lutea.*

dominicus. 10. *C. pedibus lobatis, capite lævi, corpore subtus con-*  
*fertim maculato.*  
*Colymbus fluviatilis dominicensis.* *Briss. av.* 6. p. 64.  
t. 5. f. 2.  
*Habitat in Dominica.*

Podiceps, 11. *C. pedibus lobatis, corpore fusco, rostro fascia fes-*  
*quialtera.*  
*Podiceps minor rostro vario.* *Cadesb. car.* 1. p. 91.  
t. 91.  
*Colymbus fluviatilis carolinensis.* *Briss. av.* 6. p. 63.  
*Habitat in America septentrionali.*



76. **LARUS.** *Rostrum* edentulum, rectum, cultratum, apice subadunco: *Mandibula* inferior infra apicem gibba.

*Nares* lineares, antice latiores, in medio rostri sitæ.

Rissa.

1. *L. albus*, dorso cano, rectricibus albis totis, pedibus tridactylis. *Brunnich. orn.* 140.

*Habitat* sub *Arctico*, in Islandia, Christiansoe.

*Loco* digiti postici gibbositas exigua. *Rostrum* flavum.

*Cauda* tota alba.

tridactylus.

2. *L. albicans*, dorso canescente, rectricum apicibus excepto extimo nigris, pedibus tridactylis. *Fn. svec.*

157. *Penn. brit. L.* 3.

*Larus hybernus.* *Alb. av.* 2. p. 80. t. 87.

*Larus cinereus.* *Bell. av.* - *Raj. av.* 128. n. 4.

*Larus fuscus* f. *hybernus.* *Will. orn.* 266. t. 66. *Raj.*

*av.* 130. n. 14. *Zool. brit. t. P. P.* 3.

*Gavia hyberna.* *Briss. av.* 6. p. 189.

*Habitat* in Europa septentrionali.

*Femora* denudata, virescentia. *Pollex* obsoletus, muticus.

canus.

3. *L. albus*, dorso cano. *Fn. svec.* 153. \*

*Larus albus.* *Alb. av.* 2. p. 77. t. 84.

*Larus cinereus minor.* *Aldr. orn.* 3. p. 73. t. 75.

*Will. orn.* 268.

*Gavia cinerea.* *Briss. av.* 6. p. 175. t. 16. f. 1.

*Habitat* in Europa.

*Rostrum* flavum. *Pedes* fulvi.

cinerarius.

4. *L. albus*, dorso cano, macula pone oculos fusca.

*Gavia cinerea minor.* *Briss. av.* 6. p. 178. t. 17. f. 1.

*Larus cinereus major.* *Aldr. orn.* 3. p. 72. t. 74.

*Larus albus major.* *Will. orn.* 264. t. 129. n. 9.

*Larus marinus albus.* *Gesn. av.* 589.

*Habitat* in Europa.

*Differt* a *L. cano* imprimis macula inter oculos aures fusca.

5. *L.*

*Pulli* primi anni plerumque in his grisei sunt; unde speciei facilis multiplicatio. *Lari* agitati evomunt vel explodunt ingestum cibum.

- nævius* 5. *L. albus*, dorso cinereo, rectricibus apice nigris.  
*Gavia cinerea nævia*. *Briss. av.* 6. p. 185. t. 17. f. 2.  
*Larus albo cinereus*, torque cinereo *Aldr. orn.* 3.  
p. 73. t. 77. *Will. orn.* 266. t. 66.  
*Larus cinereus major*. *Bell. av.* 35. *Marsf. dan.* 5.  
p. 86. t. 41.  
*Habitat in Mari Europæo.*  
*Rostrum nigrum. Pedes olivacei. Penna extima rectri-*  
*cum tota alba est.*
- marinus.* 6. *L. albus*, dorso nigro. *It. gottl.* 214. *It. wegot.* 156.  
*Fn. suec.* 155.  
*Larus ingens marinus.* *Clus. exot.* 104. *Alb. av.* 3.  
p. 89. t. 94.  
*Larus maximus ex albo & nigro varius.* *Will. orn.*  
261. *Raj. av.* 127. *Zool. brit. t. L. L.*  
*Larus niger.* *Briss. av.* 6. p. 158.  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo Anseris. Remiges apice albo. Rostrum*  
*Pedesque rubri.*
- fuscus.* 7. *L. albus* dorso fusco. *Fn. suec.* 154.\*  
*Larus cinereus maximus.* *Will. orn.* 262. *Raj. av.*  
127. n. 2. *Marsf. dan.* 5. p. 84. t. 40.  
*Larus griseus.* *Briss. av.* 6. p. 162.  
*Habitat in Europa.*  
*Rostrum Pedesque flavi.*
- atricilla.* 8. *L. albus*, capite nigricante, rostro rubro, pedibus nigris.  
*Larus cinereus, major baltneri.* *Will. orn.* 263. *Raj.*  
*av.* 129. n. 8.  
*Gavia ridibunda.* *Briss. av.* 6. p. 192. t. 18. f. 1.  
*Larus major.* *Catesb. car.* 1. p. 89. t. 89.  
*Habitat in America, Europa.*  
*Rostrum sanguineum. Pedes nigri. Corpus cinereum,*  
*subtus album.*
- ridibundus.* 9. *L. albidus*, capite nigricante, rostro pedibusque rubris.  
*Larus cinereus ornithologi.* *Will. orn.* 264. t. 66.  
*Raj. av.* 128. n. 5.  
*Larus capite fusco.* *Will. av.* 3. p. 56. t. 86.  
*Gavia ridibunda phoenicopos.* *Briss. av.* 6. p. 196.  
*Cephus turneri.* *Gesn. av.* 249.  
*Habitat in Mari Europæo.*  
*Voce cachinnos æmulatur.*



parasiti- 10. *L. rectricibus* duabus intermediis longissimis *Faun.*  
cus. *svec.* 156. \*

*Sterna rectricibus* maximis nigris. *It. wgoth.* 182.  
*Aët. Stokh.* 1753. p. 291.

*Larus subfuscus* major, vertice nigro, ventre albido,  
rectricibus intermediis longissimis. *Brown. jam.* 482.

*Stercorarius longicaudatus.* *Briss. av.* 6. p. 155. 150.

*Avis norvegica* Kyuffa. *Oel. mus.* 1. f. 11. n. 20.

Truen s. Fur. *Barth. aët.* 1. p. 91.

*Coprotheres.* *Raj. av.* 127. n. 2. *Martens. spitz.* 63.  
t. L. f. D.

*Avis arctica.* *Edw. av.* 148. t. 148.

*Habitat intra tropicum* Cancrī : Europæ, Americæ,  
Asiæ.

*Piscaturæ inepta* ipsa agitat congeneres, ut vomitu ab iis  
ejectum cibum arripiat.

*Rachis remigum rectricumque*, imprimis subtus, nivea.

Catarractes. 11. *L. griseus*, remigibus rectricibusque basi albis,  
cauda subæquali.

*Catharacta Skua* corpore supra e fusco luteoque longi-  
tudinaliter maculato, macula alari alba, abdomine  
pallide lutescente immaculato, cauda subæquali.

*Brunnich. orn.* 125. \*

Catarractes. *Gesn. av.* 246. *Aldr. orn.* 3. p. 84.

*Will. orn.* 265. t. 67. *Raj. av.* 129.

Catarractes noster. *Will. orn.* 265. *Raj. av.* 128.

*Sibb. scot.* 2. p. 20. t. 14. f. 2.

*Larus fuscus.* *Briss. av.* 6. p. 165. *Alb. av.* 2. p. 55.  
t. 85.

*Skua hoyeri.* *Clus. exot.* 369. *Barth. aët.* 1. p. 91.

*Raj. av.* 128.

*Avis arctica* femina. *Edw. av.* 149. t. 149. f. 2.

*Habitat circa polum arcticum.* a D. Brunnichio.

*Rostrum* cerâ ultra medium tectum in Catarracte & pa-  
rasitico, sed nares utraque perviæ & perspicuæ, ut  
in Laris. Magnitudo Anseris s. præcedentis dupla.  
*Remiges omnes basi albæ*, uti & Rectrices. Cor-  
pus scolopacinum. Abdomen totum testaceum, im-  
maculatum.

77. STERNA. *Rostrum* edentulum, subulatum, subrectum, acutum, compressiusculum.

*Nares* lineares, ad basin rostri sitæ.

stolida. 1. *S. cauda cuneiformi*, corpore nigro, fronte albicante, superciliis atris. *Amæn. acad.* 4. p. 240.

*Hirundo marina major*, capite albo. *Sloan. jam.* 1. p. 31. t. 6. f. 2. *Catesb. car.* 1. p. 88. t. 88.

*Anæthetus minor fuscus*, vertice cinereo, rostro glabro. *Brown. jam.* 481.

*Larus gavia fasca.* *Briss. av.* 6. p. 199. t. 18. f. 2.

*Passer stultus.* *Nieremb. nat.* 207. *Will. orn.* 297. *Raj. av.* 154.

*Habitat in Americæ Pelago, vix homines adventantes metuens.*

*Rostrum Pedesque nigri.*

*Hirundo.* 2. *S. cauda forficata*: rectri-ibus duabus extimis, albo nigroque dimidiatis. *Faun. svec.* 158. \* *Penn. brit.* t. L.

*Sterna.* *Gesn. av.* 53. *Aldr. orn.* 3. p. 78. *Jonst. av.* 130. t. 46.

*Sterna major.* *Briss. av.* 61. p. 203. t. 19. f. 1.

*Hirundo marina major.* *Raj. av.* 191. n. 7.

*Hirundo marina.* *Will. orn.* 258. t. 68. *Raj. av.* 131. *Alb. av.* 2. p. 79. t. 90.

*Larus albicans.* *Marsl. dan.* 5. p. 88. t. 42.

*Habitat in Europa. Mas & Femina indissolubiles socii monogami.*

*Pileus niger a rostro ad nucham. Rostrum Pedesque rubri.*

nigra. 3. *S. cauda subforficata*, corpore cano, capite rostroque-nigro, pedibus rubris. *Fn. svec.* 159. \*

*Sterna fusca.* *Raj. av.* 131.

*Hirundo marina minor.* *Alb. av.* 2. p. 82. t. 89.

*Larus cinereus minor.* *Aldr. orn.* 3. p. 71. *Will. orn.* 265.

*Habitat in Europa; vivit in societate.*

*Rostrum Pedesque rubri.*



minuta. 4. *S. cauda forficata*, corpore albo, dorso cano, fronte superciliisque albis.

*Larus piscator.* *Gesn. av.* 587. *t.* 588. *Aldr. orn.* 3. *p.* 80. *t.* 79. *Jonst. av. t.* 46. *Will. orn.* 269. *t.* 68. *Raj. av.* 131. *n.* 2.

*Habitat in Europa australiore. D. D. Kramer.*

*Magnitudo minima, vix Hirundinis domesticæ. Caput pileo nigro; fronte alba bifida, unde lobus albedinis utrinque supra oculos. Dorsum cinereum. Alba sunt Pectus, Abdomen, Collumque subtus, Caudaque bifida. Rostrum Pedesque rubri.*

nævia. 5. *S. cauda emarginata* corpore variegato, macula aurium nigra.

*Sterna nævia. Briss. av.* 6. *p.* 216. *t.* 20. *f.* 2.

*Rallus lariformis. Syst. nat.* 10. *p.* 153.

*Larus cinereus fissipes*, rostro & pedibus rufescentibus. *Mars. dan.* 5. *p.* 29. *t.* 44.

*Larus fissipes. Alb. av.* 2. *p.* 75. *t.* 82.

*Habitat in Europa australiore.*

*Rostrum nigricans. Pedes virescentes.*

fuscata. 6. *S. cauda emarginata*, corpore nigricante immaculato, pedibus rubris, rostro fusco.

*Sterna fusca. Briss. av.* 6. *p.* 220. *t.* 21. *f.* 1.

*Habitat in Insula Dominicanensi.*

fissipes. 7. *S. cauda emarginata*, corpore nigro, dorso cinereo, abdomine albo, pedibus rubicundis.

*Sterna nigra. Briss. av.* 6. *p.* 211. *t.* 20. *f.* 1.

*Larus niger. Gesn. av.* 588. *Aldr. orn.* 3. *p.* 81.

*Will. orn.* 269. *t.* 68. *Raj. av.* 131.

*Larus niger fissipes. Aldr. orn.* 3. *p.* 82. ♂ 270. *t.* 68. *Will. orn.* 270. *Raj. av.* 132.

*Habitat in Europa australiore.*

*Pedes magis fissi, minusque palmati, quam in reliquis.*

78. RYNCHOPS. *Rostrum rectum: mandibula superiore multo brevior; inferiore apice truncata.*

nigra. 1. *R. nigricans*, subtus alba, rostro basi rubro.

*Rygchopsalia* dorso nigro , ventre albo. *Bar. av.* 20.

*Briss. av.* 6. p. 223. t. 21. f. 2.

*Larus major* , rostro inæquali. *Catesb. car.* 1. p. 90.  
t. 90.

*Plotus* rostro conico inæquali. *Klein. av.* 142.

*Avis carolina* , rostro cultriformi. *Pet. gaz.* t. 76.  
f. 2. *mus.* 541.

*Avis maderasp. major* , novaculæ facie *Raj. av.* 194.  
t. 1. f. 5.

*Habitat in America : volando aquæ superficiem radit ,  
ex illa insecta pisciculosque , mandibula inferiore in-  
troducta , extrahit ; victitat etiam Conchiliis.*

fulva.

2. *R. fulva* , rostro nigro. †

*Ryngchopsalia fulva* , rostro nigro. *Barr. av.* 20.

*Habitat in America.*

*Varietas forte præcedentis. Briss.*

*Genus proxima affinitate Laris junctum.*



## IV. GRALLÆ.

*Rostrum subcylindricum, obtusiusculum.*

*Lingua integra, carnosæ.*

*Femora supra genua denudata.*

79. PHOENICOPTERUS. *Rostrum denudatum, infraçto-incurvatum, denticulatum.*

*Nares lineares.*

*Pedes palmati, tetradaçtyle.*

ruber.

1. *P. ruber, remigibus nigris.*

*Phœnicopterus. Bell. av. 299. Gesn. av. 689. t. 690.*

*Aldr. orn. 3. p. 319. t. 321, 322. Will. orn. 360.*

*t. 60. Raj. av. 190 & 117. Tetr. itin. 300.*

*Worm. mus. 200. Grew. mus. 67. t. 5. Sloan. jam.*

*2. p. 321. Act. angl. 350. p. p. 523. Seb. mus. 1.*

*p. 123. t. 67. f. 1. Catesb. car. 1. p. 73. t. 73,*

*74. Alb. av. 2. p. 71. t. 77. Briss. av. 6. p. 532.*

*t. 47. f. 1.*

*Habitat in Africa, America, rarius in Europa. Dum edat, collum ita contorquet, ut mandibulæ superioris dorsum planum terram attingat, caputque utrinque motitat & sic cibum arripit. Nidum struit in aquis super rupes, ut pedes, dum incubat, exsertos habeat, uno in uno latere, altero in altero. Dat mihi penna rubens nomen, sed lingua gulosis: Apicio, Caligulæ, Vitelio, Heliogabalo, expetita fuit, testantibus Plinio, Martiali, Svetonio, Lambridio.*

*Colores variant secundum ætates. Rostrum anserinum, cute vestitum, incarnatum apice nigro. Mandibula Superior angustior, antice plana, incurva, utrinque marginata. M. inferior in medio triplo latior, sed canaliculato-compressa, respondens superiori, apice subtus plicata utrinque sulcis sex. Margo utriusque lamellato-denticulatus. Medium inter Anseres & Grallas, si quis, ad præcedentem ordinem referat, forte non errat.*

80. PLATALEA. *Rostrum* planiusculum : apice dilatato , orbiculato , plano.  
*Pedes* tetradactyli, semipalmati.

Leucorodia. 1. *P.* corpore albo , gula nigra , occipite subcristato. *Mus.*  
*Ad Fr.* 2. p. 26. \*

*Anas* rostro plano , apice dilatato rotundatoque. *Faun.*  
*svec.* 160. \*

Platea s. Pelecanus. *Gesn.* av. 666. *Jonst.* av. 103.  
*t.* 64. *Will.* orn. 212. *t.* 52. *Raj.* av. 102. *Worm.*  
*mus.* 1. f. 2. *t.* 11. f. 10. *Marsil.* dan. 5. p. 28.  
*t.* 12. *Briss.* av. 5. p. 352.

Leucorodias. *Aldr.* orn. l. 20. c. 13. *Aldr.* orn. 3.  
*p.* 384. *t.* 385.

Platina s. Cochlearia. *Olear.* *mus.* 23. *t.* 13. f. 4.  
*Besl.* *mus.* *t.* 9. f. 4.

Albareola. *Alb.* av. 2. p. 61. *t.* 66.

*Habitat* in Europa , *nidificat* in Arboribus altissimis.

*Rostrum* & *Pedes* nigri. *Pennæ* occipitis elongatæ in  
*cristam.* *Orbitæ* oculorum & gula nuda nigra.

Ajaja. 2. *P.* corpore sanguineo.

Platea rosea. *Briss.* av. 5. p. 356. *t.* 30.

Platea incarnata. *Sloan.* *jam.* 2. p. 316. *Raj.* av. 189.  
*n.* 5.

Platea brasiliensis Ajaja dicta. *Marcgr.* *bras.* 204.  
*Raj.* av. 102. *Will.* orn. 213.

β. Tlahuquechul s. Platea mexicana. *Hern.* *mex.* 49.  
*Raj.* av. 102. *Will.* orn. 213.

*Avis* vivivora. *Nieremb.* *nat.* 212.

Platea coccinea. *Briss.* av. 5. p. 539.

*Habitat* in America Australi.

*Facies* denudata alba est.

pygmea. 3. *P.* corpore supra fusco , subtus albo. *Mus.* *Ad. Fr.*  
2. p. 26. \*

*Habitat* Surinami.

*Magnitudo* *Passeris.*



**81. PALAMEDEA.** *Rostrum* conicum: mandibula superiore adunca.

*Nares*. . .

*Pedes* tetradactyli, fissi.

**cornuta.** 1. *P. alulis* bispinosis, fronteque cornuta.

*Anhima.* *Marcgr. bras.* 215. *Jonst. av. t.* 61. *Will. orn.* 202. *t.* 47. *Laet. amer.* 13. *Cond. amaz.* 174. *Briss. av. 5. p.* 518.

*Habitat in Brasilia, Guiania; mas & femina semper juncti incedunt; nidus e luto forma furni supra terram; terribili voce clamitans.*

*Cornu in fronte ad basin rostri recurvatum. Spinæ 2 ad Alulam. Corpus magnitudine Cygni.*

**cristata.** 2. *P. inermis*, fronte cristata. †

*Cariama.* 2. *Marcgr. bras.* 203. *Will. orn.* 202. *t.* 51.

*Raj. av. 96. n.* 6. *Briss. av. 5. p.* 516.

*Habitat in Brasilia. Clamor longe auditur.*

*Magnitudo Ardeæ. Rostrum & Pedes flavescentes. Crista frontis erecta. Pollex obsoletus terram non attingens.*

**82. MYCTERIA.** *Rostrum* subadscendens, acutum: Mandibula superiore triquetra rectissima; Mandibula inferiore trigona acuminata adscendente.

*Frons* calva.

*Nares* lineares.

*Lingua* nulla. *Marcgr.*

*Pedes* tetradactyli.

**americana.** 1. **MYCTERIA.**

*na.*

*Jabiru-guacu.* *Marcgr. bras.* 201. *Pis. bras.* 87. *Raj. av. 96. Will. orn.* 202. *t.* 47. *f.* 2, 4.

*Ciconia brasiliensis.* *Briss. av. 5. p.* 371.

*Habitat in America calidior.*

*Magni-*

*Magnitudo Ciconiæ, alba, remigibus rectricibusque nigro - purpurascentibus.*

Conf. *Grew. mus. t. 5. f. 1.*

83. CANCROMA. *Rostrum gibbosum: mandibula superiore cymbæ refupinatæ forma.*

Cochlea- 1. C. ventre rufescente.

ria.

Cochlearius. *Briss. av. 5. p. 506.*

*Habitat in Guiana.*

Cancro 2. C. ventre candicante.

phaga.

Cochlearius fuscus. *Briss. av. 5. p. 509.*

Tamatia. *Marcgr. bras. 208. Jonst. av. t. 59.*

*Will. orn. 238. Raj. av. 116. n. 12.*

*Habitat in Brasilia.*

84. ARDEA. *Rostrum rectum, acutum, longum, subcompressum, fulco e naribus versus apicem exaratum.*

*Nares lineares.*

*Pedes tetradactyli.*

\* *Cristatæ: rostro vix capite longiore.*

payonina, 1. A. crista setosa erecta, temporibus palearibusque binis nudis.

*Grus balearica. Aldr. orn. 3. p. 361. t. 362, 363.*

*Will. orn. 201. t. 48. Raj. av. 95. Dodart, mem.*

*3. p. 199. t. 28. Besl. mus. 36. t. 9.*

*Grus cristata africana. Edw. av. 192. t. 192.*

*Pavo marinus. Clus. exot. 105.*

*Grus capensis fusca, capite aureo galeato. Pet. gaz. t. 76. f. 9.*

*Balearica. Briss. av. 5. p. 511. t. 41.*

*Habitat in Africa: in Balearibus.*

*Caput nigrum. Crista flavescens: pennis apice nigris*

*Alæ albæ. Cauda nigra, æqualis.*



- Virgo. 2. A. superciliis albis postice retrorsumque longe cristatis.  
 Virgo numidica. *Edw. av. 134. t. 134. Dodart. mem. 3. p. 3. t. 35.*  
 Grus numidica. *Alb. av. 3. p. 78. t. 83. Briss. av. 5. p. 388.*  
*Habitat in Oriente.*  
 Corpus magnitudine Ciconiæ, cæruleo-cinereum; capite remigibusque primariis apice nigris. Pennæ paleares nigrae, pendulae. Oculi rubri pupilla cinerea. Pone oculos utrinque crista pennacea recurvata longa alba. Pedes nigri. Rostrum basi viride, medio luteum, apice rubrum.
- \* \* Grues; capite calvo.
- canaden- 3. A. fincipite nudo papilloso, corpore cinereo, alis ex-  
 sis. tus testaceis.  
 Grus fusca canadensis. *Edw. av. 133. t. 133.*  
 Grus freti hudsonis. *Briss. av. 5. p. 385.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- Grus. 4. A. occipite nudo papilloso, pileo remigibusque nigris, corpore cinereo, tectricibus intimis laceris. *Faun. svec. 161. \**  
 Grus. *Bell. av. 41. 6. Gesn. av. 528. t. 529. Aldr. orn. 3. p. 324. t. 329. Will. orn. 200. t. 48. Raj. av. 95. Mars. dan. 5. p. 6. t. 1. Alb. av. 2. p. 60. t. 65. Briss. av. 5. p. 374. t. 33.*  
*Habitat in Europæ, Africæ campis subhumidis; visitat Granis; Hybernatur in Lithuania, Podolia, Helesponto, Oriente. Trans pontum fugat & terris immittit apricis. Virg. Quiescit super unicum pedem.*
- america- 5. A. vertice nucha temporibusque nudis papillofis, fronte nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo.  
 na. Grus americana alba. *Catesb. carol. 1. p. 75. t. 75. Edw. av. 132. t. 132. Briss. av. 5. p. 382.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
 Caput subtus ad maxillam inferiorem rubrum est. Rostrum flavicans apice serratum. Pedes nigri. Rectrices candidæ.

6. A.

Ardeæ distinctæ fuere Rostro a naribus sulco exarato: Mandibulis apice subferratis, ut in *A. americana* & ungue intermedio extrorsum dilatato-serrato

Antigo. 6. A. capite nudo collarique papilloso rubris, corpore cinereo, remigibus primoribus nigris.

Grus major indica. *Edw. av. 45. t. 45.*

Grus orientalis indica. *Briss. av. 5. p. 378.*

*Habitat in Asia.*

*Pone oculos macula parva alba, & vertex albus. Rostrum flavo-virescens. Pedes rubri. Rectrices cinereæ.*

\* \* \* *Ciconiæ: orbitis nudis.*

Ciconia. 7. A. alba, orbitis nudis remigibusque nigris, rostro pedibus cuteque sanguineis. *Fn. svec. 162. \**

Ciconia. *Bell. av. 45. a. Gesn. av. 262. Aldr. orn. 3. p. 291. Jonst. av. 147. t. 50. Marfil. danub. 5. p. 26. t. 11.*

Ciconia alba. *Will. orn. 210. t. 52. Raj. av. 97. Alb. av. 2. p. 59. t. 64. Briss. av. 5. p. 365. t. 32.*

*Habitat in Europa, Asia, Africa; vix in Italia. Viſitat amphibiiis, intactis Bufonibus; huic honos Serpentum exitio tantus ut nefas occidere; noctu stridet in nido ad pagos in altis, passeribus resonante, ubi glomerat immenso de turre Ciconia rostro; migrat trans pontum in Ægyptum, Æthiopiam; æstivat inter Sveciam & Italiam.*

*Cute ipsa corporis sub pennis sanguinea, uti Rostrum Pedes & Ungues.*

nigra. 8. A. nigra, orbitis nudis, pectore abdomineque albo; *Faun. svec. 163. \**

Ciconia nigra. *Bell. av. 145. Gesn. av. 273. Aldr. orn. 3. p. 310. t. 371. Will. orn. 211. t. 52. Alb. av. 3. p. 77. t. 82. Briss. av. 5. p. 362. t. 31.*

*Habitat in Europa boreali. Migrat æstate supra Sveciam, viſitat Ranis.*

*Rostrum Pedesque rubri. Corpus nigrum, at collo & lateribus capitis azureo nitentibus. Rostrum Pedes, Orbitæque nude sunt sanguineæ. Pennæ occipitis & sub collo longiores. Pectus Abdomen & Crissum alba.*

\* \* \* \* *Ardeæ: ungue intermedio introrsum ferrato.*

Nycti- 9. A. crista occipitis tripenni alba horizontali, dorso nigro, abdomine flavescente.

Ardea



Ardea cinereo nigro alboque varia, crista horizontalis  
ex tribus pennis longitudine rostri. *Kram. auct.*  
347. \*

Nycticorax. *Bell. av. 44. Gesn. av. 527. t. 622.*  
*Aldr. orn. 3. 271. t. 272. Briss. av. 5. p. 499.*  
t. 39.

Ardea cinerea minor. *Will. orn. 204. t. 49. Raj. cat.*  
99. n. 3. *Mars. dan. 5. p. 10. t. 3. Alb. av. 2.*  
62. t. 67. *Aldr. orn. 3. p. 380. t. 381.*

*Habitat in Europa australi.*

Frons fascia alba. Dorsum viride. Abdomen album  
Pennæ cristæ 3, strictæ, albæ. Rostrum basi flavicans.  
Lora viridi-flavicans, uti Pedes. Remigibus  
Rectricesque cinereæ.

purpurea. 10. A. occipite nigro, crista dependente pennis duabus  
elongatis, corpore olivaceo, subtus purpurascens  
Ardea cristata purpurascens. *Briss. av. 5. p. 424.*  
36. f. 2.

*Habitat in Oriente.*

Corpus cinereo - olivaceum. Pectus & Abdomen  
castaneo - purpurascens carina nigra. Caput superius  
splendide nigrum. Crista concolor, in qua pennæ  
longæ. Collum rufum striis 3 nigris. Remiges cinereo-nigricantes.  
Cauda cinerea subtus. Rostrum subtus & Lora flavicans. Pedes virescentes. *Briss.*

cinerea. 11. A. occipite nigro lævi, dorso cærulescente, subtus  
albida, pectore maculis oblongis nigris. *Faun. suec.*  
165. \*

Ardea. *Gesn. av. 207. Aldr. av. 3. p. 365. Briss.*  
av. 5. p. 392. t. 34.

Ardea cinerea major. *Bell. av. 42. Aldr. orn. 3.*  
377. t. 378. *Gesn. av. 212. Jonst. av. 151. t. 51.*  
*Mars. dan. 5. p. 8. t. 2. Alb. av. 3. p. 72. t. 77.*

*Habitat in Europa; nidificant in arboribus plures simul.*  
*Supra nubes volitans indicat procellas.*

Lora flavescens. Remiges primores nigri. Collum  
subtus linea nigra. Pedes virescentes. Rostrum  
flavicans.

major. 12. A. occipite crista nigra dependente, corpore cinereo  
collo subtus linea fasciæque pectorali nigris.

Ardea cinerea major. *Will. orn. 203. t. 49. Raj.*  
av. 98.

Ardea alia. *Gesn. av. 219. t. 220. Aldr. orn. 3. p. 383.*

Ardea cristata. *Briss. av. 5. p. 396. t. 35. Alb. av. 1. p. 59. t. 67.*

*Habitat in Europa.*

*Affinis A cinereæ, sed verticis pennæ longæ nigræ. Corpus cinereum, subtus album. Frons pennis longis albis. Crista verticis nigra, postice propendens. Lora flavicantia. Rostrum flavicans. Pedes virescentes. Collum subtus nigro maculatum fascia pectorali nigra. Remiges primores nigræ. Rectrices cinereæ. Briss.*

Ardea alia. 13. A. occipite cristato, corpore albo, rostro nigro loris pedibusque virescentibus. *Briss. av. 5. p. 431.*

Ardea alba minor. *Aldr. orn. 3. p. 389. t. 391. Will. orn. 205. Raj. av. 99. Mars. dan. 5. p. 14. t. 5.*

Ardea alba minor secunda. *Will. orn. 206.*

Leucorodias. *Aldr. orn. 3. p. 392. t. 395.*

Garzetta. *Gesn. av. 214.*

Egretta. *Bell. av. 43. Gesn. av. 795. Aldr. orn. 3. p. 392.*

*Habitat in Oriente.*

Cocoi. 14. A. occipite crista dependente dorsoque cinereis, collo subtus nigro maculato, capitis lateribus nigris.

Ardea cærulescens. *Alb. av. 3. p. 32. t. 79.*

Ardea cayanensis cristata. *Briss. av. 5. t. 400.*

Ardea secunda. *Tetr. antill. 2. p. 273. t. 246.*

Cocoi. *Marcgr. bras. 209. Pis. bras. 89. Will. orn. 209. t. 51. Raj. av. 100 n. 15.*

*Habitat in Cayana.*

*Corpus totum cinereum. Caput ad latera nigrum. Occiput crista cinerea. Remiges Rectricesque cinereæ. Lora cinerea. Rostrum flavo-virens. Pedes cinerei.*

Leucorodias. 15. A. occipite cristato, dorso fusco, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris.

Ardea cristata maxima americana, *Catesb. car. 3. p. 10. t. 10.*

Ardea virginiana cristata. *Briss. av. 5. p. 416.*

*Habitat in America.*

*Tempora alba. Capitis pennæ longissimæ, nigræ, unde postice crista evadit. Collum subtus albido testaceum, fusco-maculatum. Corpus supra fuscum.*

*Ro-*



*Rostrum latera* & *Lora flavicantia. Pedes fusci. Remiges nigrae. Rectrices fusca.*

violacea. 16. *A. occipite luteo crista alba, corpore albo nigroque striato, subtus cærulescente, pedibus luteis.*

*Ardea cærulea. Sloan. jam. 2. p. 314. t. 264. f. 55.*

*Raj. av. 189.*

*Ardea stellaris cristata americana. Catesb. car. 1. p. 179. t. 79.*

*Cancrophagus bahamensis. Briss. av. 5. p. 481.*

*Habitat in America septentrionali & australi.*

*Rostrum nigrum. Lora viridia. Pedes lutei.*

cærulea. 17. *A. occipite cristato, corpore cæruleo.*

*Ardea major grisea cristata, capite nigro, vertice & ciliis albicantibus. Brown. jam. 478.*

*Ardea cærulea nigra. Catesb. car. 1. p. 76. t. 766.*

*Sloan. jam. 2. p. 315. t. 263. f. 3. Raj. av. 1899.*

*Cancrophagus cæruleus. Briss. av. 5. p. 484.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Rostrum & Lora cærulea. Pedes virides.*

Hudsonias.

18. *A. vertice cristato nigro, corpore fuscescente, subtus albido, collo subtus nigro-rufescente maculato.*

*Ardea americana septentrionalis. Edw. av. 3. p. 133. t. 135.*

*Ardea freti hudsonis. Briss. av. 5. p. 407.*

*Habitat ad fretum Hudsonis.*

*Capitis pileus niger cristatus. Collum subtus fuscum saturatius fasciatum. Corpus supra cinereo-fuscum subtus albidum. Femora rufescentia. Rectrices fusca. Rostrum subtus fulvum. Lora flavo-virentia. Pedes flavi.*

striata.

19. *A. occipite subcristato, dorso cano striato, collo subtus ferrugineo, remigibus secundariis apice albis. Rolander.*

*Habitat Surinami.*

*Vertex niger nucha subcristata. Remiges fusca, secundariae tantum margine apicis albæ.*

virescens. 20. *A. occipite subcristato, dorso viridi-nitente, pectore rufescente, loris luteis, rectricibus viridi-aureis.*

*Ardea minor. Catesb. car. 1. p. 80. t. 80.*

*Cancrophagus viridis.* Briss. av. 5. p. 486. t. 38. f. 1.  
*Habitat in America.*

*Rostrum subtus flavicans. Pedes fuscii. Remiges viridi-aureæ : secundariæ ferrugineo-marginatæ.*

stellaris. 21. A. capite læviusculo, supra testacea maculis transversis, subtus pallidior maculis oblongis fuscis. Fn. svec. 164. \*

*Ardea vertice nigro, pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus.* Faun. svec. 1. n. 134.

*Ardea stellaris minor.* Bell. av. 42. Gesn. av. 314. t. 215. Aldr. orn. 3. p. 403. t. 405. Will. orn. 207. t. 50, 52. Raj. av. 100. n. 11. Marsf. dan. 5. p. 16. t. 6. Alb. av. 1. p. 65. t. 68.

*Ardea Botaurus.* Briss. av. 5. p. 444. t. 37. f. 1.

*Habitat in Europa. Venatus falconibus magnatibus placet; Mugitus stentorii impares; terrefacta spiritaliter æthera scandit.*

*Rostrum subtus virescens. Pedes virides. Lora viridia.*

grisea. 22. A. capite lævi fusco, corpore fuscescente, subtus albo, remigibus primoribus apice macula alba.

*Ardea grisea.* Briss. av. 5. p. 412. t. 36. f. 1.

*Habitat in Oriente.*

*Corpus griseo-fuscum, magnitudine Cornicis. Vertex fuscus. Collum subtus linea ferruginea. Remiges primores 18 apice alba macula. Rectrices apice albo marginatæ. Pedes fuscii. Lora alba.*

brasiliensis. 23. A. capite lævi, corpore nigricante flavo-punctato, remigibus reëtricibus rostro pedibusque nigricantibus.

*Ardea brasiliensis.* Briss. av. 5. p. 441.

Soco. Marcgr. bras. 199. Will. orn. 209. t. 51.

Raj. av. 100. n. 14.

*Habitat in America meridionali.*

*Collum subtus album maculis longitudinalibus nigris fuscisque.*

alba. 24. A. capite lævi, corpore albo, rostro fulvo, pedibus nigris. Fn. svec. 166.

*Ardea candida.* Briss. av. 5. p. 428.

*Ardea alba.* Gesn. av. 213. Aldr. orn. 3. p. 389. t. 390.



*Ardea alba major.* Will. orn. 205. t. 43. Raj. av. 99. n. 4. Marsf. dan. 5. p. 12. t. 4.  
*Habitat in Europa.*  
*Lora viridia.*

æquino- 25. *A. capite lævi, corpore albo, remigibus duabus pri-*  
 etialis. *mis margine exteriori fuscis.* Rolander.  
*Ardea alba minor carolinensis.* Catesb. car. 1. p. 77.  
 t. 77?  
*Ardea alba, rostro pedibusque viridibus.* Briss. av. 5.  
 p. 435.  
*Habitat in America.*  
*Lora rubra.*

minuta. 26. *A. capite lævi, corpore fusco, subtus rufescente, re-*  
*ctricibus nigro-virescentibus, loris flavicantibus.*  
*Ardeola nævia.* Briss. av. 5. p. 500. t. 40. f. 2.  
*Ardea stellaris parva fusca.* Edw. av. 135. t. 275.  
*Russ. alepp. 71. t. 10.*  
 β. *Ardeola.* Briss. av. 5. p. 497. t. 40. f. 1.  
*Habitat in Helvetia, Aleppo.*  
*Magnitudo Turdi. Alter sexus supra fusco-virescens.*  
*Pedes virescentes. Rostri mandibula inferior flava.*

85. **TANTALUS.** *Rostrum longum, subulatum,*  
*teretiusculum, subarcuatum.*  
*Facies nuda ultra oculos.*  
*Lingua brevis, lata.*  
*Saccus jugularis nudus.*  
*Nares ovatae.*  
*Pedes tetradactyli, basi palmati.*

Locula- 1. **T.** *facie cærulescente, rostro rubescente, pedibus re-*  
 tor. *migibus rectricibusque nigris, corpore albo.*  
*Pelicanus americanus.* Catesb. car. 1. p. 81 t. 81.  
*Numenius americanus major.* Briss. av. 5. p. 335.  
*Tacab, Mise persis.* Chardin. it. 3. p. 40  
*Caricaca.* Marcgr. bras. 191. Will. orn. 218. t. 54.  
 Raj. av. 103. n. 4. March. tom. 3. p. 326.  
*Habitat in America: Brasilia, Cayana, Carolina; vi-*  
*sitat amphibis, piscibus.*

Falcinel- 2. T. facie nigra, pedibus cæruleis, alis caudaque viola-  
lus  
ceis, corpore castaneo.

Numenius rostro arcuato, corpore castaneo, pedibus  
obscure virentibus. *Kram. austr.* 350.

Numenius viridis. *Briss. av.* 5. p. 326. t. 27. f. 2.

Falcinellus. *Gesn. av.* 220. *Will. orn.* 218. t. 54.

*Raj. av.* 103. n. 3.

Falcinellus s. avis falcata. *Aldr. orn.* 3. p. 3. 422.  
t. 423. *Mars. danub.* 5. p. 42. t. 19.

*Habitat in Austria, Italia, circa lacus.*

Corpus castaneum maculis parvis fuscis albisque in ca-  
pite & collo antico. Facies nuda nigra. Rostrum  
nigrum. Pedes cyanei. Alæ, Rectrices, Uropygium  
violacea.

minutus. 3 T. facie rostro pedibusque virescentibus, corpore fer-  
rugineo, subtus albo.

Ibis minor. *Edw. av.* t. 356.

*Habitat - - -*

*Facies virescens. Pectus abdomen femora uropygium alba.*

Ibis. 4. T. facie rubra, rostro luteo, pedibus griseis, remigi-  
bus nigris, corpore rufescenti-albido.

Ardea capite lævi, corpore albo, rostro flavescente  
apice pedibusque nigris. *Syst. nat.* 10. p. 144.

Ardea Ibis tota alba, pedibus atris, unguibus arcuatis  
maximis. *Hasselq. itin.* 248.

Ibis candida. *Dodard. act.* 3. p. 61. t. 13. *Briss. av.*  
5 p. 349.

*Habitat in Ægypto, regionis purificator post inundatio-  
nem transactam.*

*Obs.* Ibis nigra *Raj. av.* 98. *Bell. it.* 2. c. 32. rarius est,  
hinc *Plinius X.* 30. Ibis circa pelusium tantum ni-  
gra est, cæteris omnibus locis candida.

ruber. 5. T. facie rostro pedibusque rubris, corpore sanguineo,  
alarum apicibus nigris.

Porphyrio amboinenis s. Ardea rubra corallina. *Seb.*  
*mus.* 1. p. 98. t. 62. f. 3.

Numenius brasiliensis coccineus. *Briss. av.* 5. p. 344.  
t. 29. f. 1, 2.

Numenius ruber. *Catesb. car.* 1. p. 84. t. 84.

Numenius indicus. *Clus. exot.* 366.

Porphyrio. *Seb. mus.* 1. p. 98. t. 82. f. 3.



Guara. *Marcgr. bras.* 263. *Will. orn.* 219. t. 54. *Raj. av.* 104. n. 6. *Laet. amer.* 575. *Worm. mus.* 308.  
*Habitat in America.*

albus. 6. T. facie rostro pedibusque rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus.  
*Numenius albus. Catesb. car.* 1. p. 82. t. 82.  
*Numenius brasiliensis candidus. Briss. av.* 5. p. 339.  
*Habitat in America.*

fuscus. 7. T. facie rostro pedibusque rubris, corpore fusco, subtus albo.  
*Numenius brasiliensis fuscus. Briss. av.* 5. p. 341.  
*Numenius fuscus. Catesb. car.* 1. p. 83. t. 83.  
*Habitat in America.*  
*Remiges Rectricesque fusæ.*

86. SCOLOPAX. *Rostrum teretiusculum, obtusum, capite longius.*  
*Nares lineares.*  
*Facies tecta.*  
*Pedes tetradactyli: postico pluribus articulisistente.*

Guarauna. 1. S. rostro arcuato flavicante, pedibus fuscis, capite fusco albo-striato.  
*Numenius americanus fuscus. Briss. av.* 5. p. 330.  
*Guarauna. Macgr. bras.* 204. *Will. orn.* 25. t. 53.  
*Raj. av.* 104.  
*Habitat in America australi.*  
*Rectrices fusæ, viridi-micantes.*

madagascariensis. 2. S. rostro arcuato pedibusque rufescentibus, maculis dorfi rhomboidalibus.  
*Numenius madagascariensis. Briss. av.* 5. p. 321. t. 28.  
*Habitat in Madagascar.*

Arquata. 3. S. rostro arcuato, pedibus cærulescentibus, alis nigris maculis niveis. *Fn. jvec.* 168. \* *It. scan.* 333.  
 Cor-

---

*Species Scolopacum, Tringarum &c. difficillime distinguuntur, ætate sexque mutabiles, colore parum distinctæ; quæ pedibus sunt rubris a reliquis probe separandæ, cum pedes non varient.*

Corlis. *Bell. av.* 47.

Numenius f. Arquata. *Gesn. av.* 222. *Aldr. orn.* 1. 20. c. 21. *Will. orn.* 216. t. 54. f. 1, 2. *Raj. av.* 103. *Alb. av.* 1. p. 75. t. 79. *Marsf. danub.* . . t. 17.

Numenius. *Briss. av.* 5. p. 311.  
*Habitat in Europa.*

Phæopus 4. S. rostro arcuato, pedibus cærulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus. *Fn. svec.* 169. \*

Phæopus altera f. Arquata minor. *Gesn. av.* 500. *Aldr. orn.* 3. p. 458. t. 460. *Will. orn.* 217.

Arquata minor nostras. *Raj. av.* 103. n. 2. *Will. orn.* 217. *Edw. av.* 204. t. 307?

Numenius minor. *Briss. av.* 5. p. 317. t. 27. f. 1.

*Habitat in Europa. Sursum recta evolans, clamando tempestates prænuncians.*

Corpus varium, subtus albens. Caput linea variegata. Lora candida (aliter Edwardi.) Rostrum nigrum, basi inferiore albida. Pedes griseo-virescentes. Uropygium candidum.

fusca. 5. S. rostro apice inflexo, corpore nigro albo nebuloso uropygio alisque subtus albis. †

Limosa fusca. *Briss. av.* 5. p. 276. t. 23. f. 2.

*Habitat ad Europæ littora.*

*Rostrum nigrum basi albida. Pedes fusci. Remigis primæ scapus albus.*

rustico- 6. S. rostro recto basi rufescente, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capitis nigra. *Fn. svec.* 170 \*

Numenius rostri apice lævi, capite linea utrinque nigra, rectricibus nigris apice albis. *Fn. svec.* 1. n. 141.

Gallina rustica. *Gesn. av.* 477.

Rusticola f. Perdix rustica major. *Gesn. av.* 501. t. 502.

Scolopax f. Perdix rustica. *Gesn. av.* 502. *Aldr. orn.* 3. p. 471. t. 473.

Scolopax. *Bell. av.* 272. *Will. orn.* 213. t. 53. *Raj. av.* 104. n. 1. *Alb. av.* 1. p. 67. t. 70. *Briss. av.* 5. p. 292.

Wood-Cock. *Born. cornv.* 245. t. 24. f. 12.

*Habitat in Europa; hybernatur in Anglia, victitat Lumbricis. Noctu volitat reditque iterato eadem via ærea, sed depressiore, ungues pollicum obsoleti. Lora*



*nigra. Rostrum basi rufum. Corpus totum maculatum. Uropygium varium. Collum subtus ferrugineum lineis transversis 4 nigricantibus. Pedes fusi.*

Gallinago. 7. *S. rostro recto tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis fuscis quaternis.*

*Numenius capite lineis 4 fuscis, rostro tuberculoso, femoribus seminudis. Faun. suec. 1. n. 142.*

*Gallinago minor. Bell. av. 54. Gesn. av. 505. Aldr. orn. 3. p. 484, 476. t. 477. Will. orn. 214. 1153. Raj. av. 105. Alb. av. 1. p. 68. t. 71. Mart. danub. 5. p. 34. t. 15.*

*Habitat in Europa; hæc Capella cœlestis, cujus mensura tam alte celerrimeque volitat cadendo, ut audiri vix vero oculis attingi possit, dum femina sedet humi.*

*Caput lineis 3 ferrugineis. Lora fusca. Gula ferruginea. Pectus & Abdomen alba immaculata. Remiges & Alæ basi nigræ. Rostrum pedesque fusi. Uropygium varium.*

Gallinago. 8. *S. rostro recto tuberculato, pedibus virescentibus, remigibus fuscis, uropygio violaceo-vario.*

*Gallinago minima. Bell. av. 217. Will. orn. 211. Raj. av. 105. Alb. av. 3. p. 36. t. 85.*

*Gallinago minor. Briss. av. 5. p. 304. t. 26. f.*

*Cinclus quartus. Aldr. orn. 3. p. 493.*

*Habitat in Europæ paludibus.*

*Corpus varium e testaceo nigro violaceo viridique mixtum. Caput lineis luteis nigrisque a rostro ad occiput ductis. Lora nigricantia. Rostrum fuscum. Pedes virescentes. Pectus maculatum. Uropygium violaceum, albo-varium.*

Fedoa. 9. *S. rostro recto flavicante, pedibus fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctatis.*

*Fedoa americana. Edw. av. 137. t. 137.*

*Limosa americana rufa. Briss. av. 5. p. 287.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Corpus griseum. Remiges primores fusce. Linea pericilliorum alba. Genæ & Gula candida. Uropygium rufum nigro fasciatum.*

- Glottis. 10. S. rostro recto basi inferiore rubro, corpore subtus niveo, pedibus virescentibus. *Fn. svec.* 171. \*
- Numenius pedibus virescentibus, uropygio albo, remigibus lineis albis fuscisque undulatis. *Faun. svec.* 1. n. 142.
- Pluvialis major. *Aldr. orn.* 3. p. 535. *Will. orn.* 220. t. 55. *Raj. av.* 106. *Mars. dan.* 5. p. 48. t. 22. *Alb. av.* 2. p. 43. t. 69.
- Limosa. *Gesn. av.* 519.
- Limosa venetorum. *Aldr. orn.* 3. p. 434. t. 435.
- Limosa grisea major. *Briss. av.* 5. p. 272. t. 24. f. 2.
- Glottis. *Gesn. av.* 520.
- Habitat in Europa.*
- Alba immaculata sunt Pectus, Abdomen, Hypochondria, Crissum, tectrices alarum.. Rectrices albæ fusco fasciatae. Remiges primores scapo albo. Pedes virescentes.
- Calidris. 11. S. rostro recto rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis. *Fn. svec.* 167. \*
- Totanus. *Bell. av.* 46. *Briss. av.* 5. p. 188. t. 17. f. 1.
- Calidris Bellonii. *Aldr. orn.* 3. p. 431. t. 433.
- Gallinula erythropus. (*Gesn. av.* 504) major. *Will. orn.* 221. *Raj. av.* 107. *Mars. dan.* 5. p. 50. t. 23.
- Habitat in Europa.*
- Rostrum rubicundum. Pedes rubri. Uropygium varium.
- Totanus. 12. S. rostro subrecto, pedibus fuscis, superciliis pectore abdomine uropygioque albis.
- Crex. *Bell. it.* 103. *Aldr. orn.* 3. p. 428. *Will. orn.* 220. *Raj. av.* 106.
- Totanus. *Gesn. av.* 518. *Aldr. orn.* 3. p. 428.
- Limosa grisea. *Briss. av.* 5. p. 267. t. 23. f. 1.
- Corlieu. *Alb. av.* 2. p. 45. t. 71.
- Habitat ad Europæ littora.*
- Corpus griseo-fuscum nigro maculatum. Pectus Columque subtus lineolis fuscis. Remex primus scapo albo. Rostrum fuscum.
- Limosa. 13. S. rostro subrecurvato basi rubro, pedibus fuscis, remigibus macula alba: quatuor primis immaculatis. *Faun. svec.* 172. \*



Numenius uropygio albo, rectricibus nigris basi albis, remigibus transversa alba macula: exceptis quatuor primis. *Fn. svec. 1. n. 144.*

Totanus. *Aldr. orn. 3. p. 431. t. 430.*

Fedoa secunda. *Will. orn. 216. t. 53. Raj. av. 105.*

Barge. *Bell. av. 48. Aldr. orn. 3. p. 434. t. 436.*

Limosa. *Briss. av. 5. p. 262.*

Gallinago cinerea major. *Mars. dan. 5. p. 30. t. 13, 14.*

*Habitat in Europa.*

Dorsum fuscum. Genæ rufescentes. Remiges nigricantes: 1 - 3 scapo albo; 5 - 13 a basi in medium albæ. Rectrices basi albæ, magis exteriores. Rostrii basis rubra, quam ambiunt pennæ albo-rufescentes.

capensis. 14. S. rostro recto lineaque verticis rufescentibus, fasciâ pectorali nigra, linea utrinque dorsali alba.

Gallinago capitis b. spei. *Briss. app. 141. t. 6.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

Dorsum cinereum, nigro undulatum. Lineola albidorufescens a rostro ad occiput. Orbitæ albæ postice in fasciam productæ. Collum antice rufum. Pectus fascia nigra, a qua fascia alba utrinque per dorsum ducta ad uropygium. Abdomen album. Pedes nigri.

lapponi- 15. S. rostro subrecurvato flavescente, pedibusque nigris, ca. subtus tota rufo ferruginea. *Faun. svec. 174.*

Recurvirostra pectore croceo. *Fn. svec. 1. n. 138.*

Fedoa americana, pectore rufo. *Edw. av. 2. p. 138. t. 138.*

Limosa rufa. *Briss. av. 5. p. 281. t. 25. f. 1.*

*Habitat in Lapponia. Rudbeck. in Europæ maritimis Briss. in America septentrionali. Edw.*

Corpus nigricans maculis pennarum ferrugineis; subtus ferrugineum immaculatum. Uropygium albidoferrugineum, maculis oblongis nigris. Supercilia ferruginea a rostro, supra oculos, per collum descendunt. Rectrices fuscae, albo-fasciatae. Rostrum subadscendens, rubescens, apice nigricans. Pedes fusci.

Ægocephala. 16. S. rostro recto, pedibus virescentibus, capite colloque rufescentibus, remigibus tribus nigris basi albis.

Barge s. Ægocephalus. *Will. orn. 515. Raj. av. 105. n. 4. Alb. av. 2. p. 64. t. 70. Mars. dan. 5. p. 36. t. 16.*

Godwel. *Zool. brit. t. B. B.*

*Limosa rufa major. Briss. av. 5. p. 284.*

*Habitat in Europa australi.*

*Corpus rufescens, subtus sordide albens maculis transversis fuscis. Remiges primores scapo albo. Rectrices nigricantes, albo-striatæ. Uropygium album maculis nigricantibus. Supercilia albo-rufescentia. Rostrum basi rubescens.*

alba. 17. *S. rostro subadscendente aurantio, corpore albo, remigibus rectricibusque flavicantibus, pedibus fuscis. Fedoa canadensis, rostro recurvo. Edw. av. 3. p. 139. t. 139.*

*Limosa candida. Briss. av. 5. p. 290.*

*Habitat in America boreali.*

*Alarum inferiores rectrices dilute fuscae. Remiges primores albo-flavescentes. Rostrum aurantium apice nigro, nonnihil adscendens.*

candida. 18. *S. rostro recto pedibusque aurantiis, corpore albicante, rectricibus candidis griseo fasciatis.*

*Totanus canadensis. Edw. av. 139. t. 139. f. 1.*

*Totanus candidus. Briss. av. 5. p. 207.*

*Habitat in America septentrionali.*

87. TRINGA. *Rostrum teretiusculum, longitudine capitis.*

*Nares lineares.*

*Pedes tetradactyli: postico uniarticulato, a terra elevato.*

Pugnax. 1. *T. rostro pedibusque rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis.*

*Fn. svec. 175. \**

*Avis pugnax. Aldr. orn. 3. p. 523. t. 526. Jonst.*

*av. 152. t. 51, 52. Will. orn. 244. t. 56. Raj.*

*av. 107. Mars. dan. 52. t. 24. Alb. av. 1. p. 69.*

*t. 72, 73. Briss. av. 5. p. 240. t. 22.*



*Habitat in Europa minus boreali. Mares pugnacissimi, pennis colli vernalibus dissimiles.*

- Vanel- 2. T. pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.  
lus. *Faun. svec. 176. \**  
Capella f. Vanellus. *Bell. av. 49. a. Gesn. av. 764.*  
*Aldr. orn. 3. p. 523. t. 526. Will. orn. 228. t.*  
*57. Jonst. av. 164. t. 53, 27. Raj. av. 110.*  
*Alb. av. 1. p. 70. t. 74. Briss. av. 5. p. 94. t.*  
*8. f. 1.*

*Habitat in Europæ, Africæ pratis apricis depressis.*  
*Migrat forte in Ægyptum. Ova Belgis in deliciis.*  
*Pellit cornices excæcantes agnos, privilegio munita*  
*a Gotlandis. Rostrum nigrum. Pedes rubri. Uro-*  
*pygium virescens.*

- Gambet- 3. T. rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque  
ta. variegato, subtus albo. *Fn. svec. 177. \**  
Gambetta. *Will. orn. 222. Raj. av. 117. n. 2.*  
Calidris nigra f. Gambetta. *Aldr. orn. 3. p. 434. t.*  
*432.*

*Chevalier. Gesn. av. 795. Alb. av. 2. p. 43. t. 68.*

*Totanus ruber. Briss. av. 5. p. 192.*

*Totanus alter. Will. orn. 221. Raj. av. 106. n. 11.*

*Habitat in Europa.*

*Rostrum rubicundum. Pedes rubri. Uropygium album.*

- Interpres. 4. T. pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque  
vario, pectore abdomineque albo. *It. gotl. 217.*  
*Faun. svec. 178.*

*Arenaria. Briss. av. 5. p. 132.*

*Morinellus marinus. Will. orn. 231. t. 58. Raj. av.*  
*112.*

*Morinellus canadensis. Edw. av. 141. t. 141.*

*Habitat in Europa & America septentrionali.*

*Rostrum nigrum. Pedes rubri.*

- friata. 5. T. rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis fu-  
sco-fasciatis, remigibus plurimis albis.

*Totanus striatus. Briss. av. 5. p. 196. t. 18. f. 1.*

*Habitat in Europæ maris littoribus, recedente un-*  
*da colligens relicta celeriterque recurvens, ne pedes*  
*malescant.*

Corpus griseo fuscoque variegatum ; subtus album, tenuis longitudinalibus & transversalibus. Uropygium album.

Morinel-6. T. pedibus rubris, rectricibus nigricantibus basi albis, corpore griseo, pectore nigro.

Morinellus marinus. *Catesb. car.* 1. p. 72. t. 72.

Arenaria cinerea. *Briss. av.* 5. p. 137. t. 11. f. 2.

*Habitat ad maris littora Americæ septentrionalis; & Europæ. Gula & abdomen alba. Rostrum & Remiges nigra.*

macula- 7. T. rostro basi pedibusque incarnatis, corpore undique  
ria. maculato, superciliis fasciæque gemina alarum albis.

Tringa maculata. *Edw. av.* 2. p. 139. t. 277. f. 2.

Turdus aquaticus. *Briss. av.* 5. p. 255.

*Habitat in Europa & America septentrionali.*

lobata. 8. T. rostro subulato apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore albo undulato. *Faun. svec.* 179. \*

Tringa grisea. *Briss. av.* 2. p. 206. t. 308. *Ast. angl.* 50. p. 255. t. 6. *Edw. av.* 206. t. 308.

Phalaropus. *Briss. av.* 6. p. 12.

*Habitat in Anglia septentrionali, Lapponia.*

*Rostrum tenuissimum est; procellosa tempestate gregaria lacubus innatat, tranquilla in paludibus solitaria.*

hyperbo- 9. T. rostro subulato apice inflexo, pedibus pennatis,  
rea. pectore cinereo, colli lateribus ferrugineis. *Faun. svec.* 179. *descr. posterior.* *Brunn. orn.* 172. \*

Tringa fuscus canadensis. *Edw. av.* 143. t. 143.

Larus fidipes alter. *Will. orn.* 270. *Raj. av.* 132. n. 7.

Phalaropus cinereus. *Briss. av.* 6. p. 15.

*Habitat ad fretum Hudsonis, inque Lapponia.*

fulicaria. 10. T. pedibus pinnatis, rostro recto flavo, corpore griseo, subtus rufo.

Phalaropus rufescens. *Briss. av.* 6. p. 20.

Tringa fusca canadensis, membranæ ad digitorum articulos. *Edw. av.* 142. t. 142.

*Habitat in America.*

alpina. 11. T. testaceo-fusca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuscescentibus. *Fn. svec.* 180. \*

Cinclus torquatus. *Briss. av.* 5. p. 216. t. 19. f. 2.



*Habitat in Lapponia. Adlerheim.*

*Magnitudo Sturni; Abdomen album. Rectrices 2 intermediae paullo longiores.*

helvetica. 12. T. rostro pedibusque nigris, subtus nigra, abdomine albo, rectricibus albis nigro fasciatis. †

*Vanellus helveticus. Briss. av. 5. p. 106. t. 10. f. 1.*

*Habitat in Helvetia.*

*Corpus nigricans maculis albis. Frons alba. Gula, Collum subtus, pectusque nigra. Cauda alba fasciis angustis nigris. Uropygium variegatum. Videtur multum affinis T. alpinae.*

Ocro-  
phus.

13. T. rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi, abdomine rectricibusque extimis albis. *Fn. svec. 180. \**

*Tringa. Gesn. av. 501. Aldr. orn. 3. p. 480. t. 481, 482. Will. orn. 222. t. 55, 56. Raj. av. 108. Briss. av. 5. p. 177. t. 16. f. 1.*

*Tringa alba s. tertia. Aldr. orn. 3. p. 480. t. 483. Will. orn. 223. Raj. av. 109.*

*Cinclus tertius. Aldr. orn. 3. p. 490. t. 492. Will. orn. 227. Raj. av. 110.*

*Cinclus. Aldr. orn. 3. p. 480.*

*Gallinula aquatica: 8 genus. Gesn. av. 511.*

*Gallinula aquatica: species secunda de novo. Gesn. av. 516.*

*Gallinula Rodopus s. phœnicopus. Will. orn. 223.*

*Ocropus medius. Gesn. ic. 107. Aldr. orn. 3. p. 461. t. 463.*

*Rhodopus s. Ocropus. Gesn. av. 508, 511. Aldr. orn. 3. p. 456. t. 457.*

β. *Tringa Glareola* rostro lævi, pedibus virescentibus, corpore fusco albo-punctato, pectore albido. *Fn. svec. 185.*

*Habitat in Europa; pariendi tempore Mās & Femina individui comites.*

*Rostrum virescens. Pedes virescenti-plumbei. Uropygium varium. Supercilia alba.*

Hypoleu- 14. T. rostro lævi, pedibus lividis, corpore cinereo litu-  
cos. ris nigris: subtus albo. *Faun. svec. 181. \**

*Tringa minor. Will. orn. 223. t. 55. Raj. av. 108.*

*Gallinula hypoleucos. Gesn. av. 509. Aldr. orn. 3. p. 469.*

*Motacillæ* genus. *Aldr. orn.* 3. p. 119. t. 123.

*Motacillæ* f. *Cincli* genus. *Aldr. orn.* 3. p. 485. t. 486.

*Guinetta*. *Briss. av.* 5. p. 183. t. 16. f. 2.

*Habitat in Europa.*

*Rostrum fuscum. Pedes virescentes. Uropygium varium. Rectrices 3 laterales albæ, mediæ fusæ, nullæ maculatæ.*

*Canutus*, 15. *T. rostro lævi, pedibus cinerascens, remigibus primoribus ferratis, rectrice extima alba immaculata. Fn. svec.* 183. \*

*Tringa cinerea, remigibus secundariis basi albis, rectricibus quatuor mediis immaculatis. Faun. svec.* 1. n. 150.

*Canutus. Raj. av.* 108. *Edw. av.* 137. t. 278. *Briss. av.* 5. p. 258. *Edw. av.* 276.

*Knot agri lincolniensis. Will. orn.* 224. t. 66.

*Habitat in Europa.*

*Supercilia, fascia alarum, rectrix extima alba. Uropygium album lunulis fuscis. Rostrum pedesque fusci.*

*Arenaria*. 16. *T. rostro pedibusque nigris, corpore griseo, subtus toto facieque albis, loris griseis.*

*Arenaria. Will. orn.* 225. *Raj. av.* 109. *Alb. av.* 2. p. 48. t. 74.

*Calidris grisea minor. Briss. av.* 5. p. 236. t. 20. f. 2.

*Habitat in Europa ad littora arenosa, gregaria.*

*littorea*. 17. *T. rostro lævi, pedibusque cinereis, remigibusque fuscis, rachi primæ nivea. Fn. svec.* 185. \*

*Chalidris nigra. Bell. av.* 208. *Aldr. orn.* 3. p. 432. *Alb. av.* 3. p. 37. t. 89.

*Totanus cinereus. Briss. av.* 5. p. 203. t. 17. f. 2.

*Habitat in Europa.*

*Vertex nigricans.*

*Cinclus*. 18. *T. rostro pedibusque nigris, loris albis, corpore uropygioque griseis fuscisque.*

*Tringa Cinclus. Briss. av.* 5. p. 211. t. 19. f. 1.

*Cinclus. Gesn. av.* 616. i. 617. *Aldr. orn.* 3. p. 490. t. 491, 493. *Raj. av.* 110.

*Schoeniclos f. Junco bellonii. Aldr. orn.* 3. p. 487. t. 489.



*Alauda marina.* Bell. av. 50.

The Stint. Will. orn. 226.

Sanderling. Alb. av. 3. p. 37. t. 88.

*Habitat ad Europæ littora gregaria.*

*Corpus magnitudine Alaudæ, subtus albicans. Collum subtus albidum maculis fuscis. Remiges primores scapo albo versus apicem. Rectrices intermedia binæ acuminatæ.*

**Calidris.** 19. T. rostro pedibusque nigricantibus, corpore subtus olivaceo, uropygio variegato.

*Calidris.* Briss. av. 5. p. 226. t. 20. f. 1.

*Rusticola sylvatica.* Gesn. av. 505. t. 504. Aldr. orn. 3. p. 476. t. 477.

*Habitat in Europa.*

*Rostri basis grisea.*

**pufilla.** 20. T. rostro pedibusque fuscis, corpore subtus rufescente, rectricibus extimis scapo albo, uropygio variegato.

*Cinclus dominicensis minor.* Briss. av. 5. p. 222. t. 25. f. 2.

*Habitat in Domingo.*

*Corpus magnitudine passeris, fusco ferrugineoque varium, subtus albidio rufescens. Rectrices 3 extimæ rachi alba; intermedia acuminatæ.*

**varia.** 21. T. rostro pedibusque nigris, corpore fusco albo-variegato, abdomine albo, rectricibus albis fusco fasciatis. †

*Vanellus varius.* Briss. av. 5. p. 103. t. 9. f. 2.

*Pardali belloni congener.* Aldr. orn. 3. p. 530.

*Habitat in Europa.*

*Uropygium variegatum. Rectrix extima alba; tenia lateris interioris fascia longitudinali.*

**fusca.** 22. T. rostro pedibusque fuscis, corpore fusco immaculato.

*Glareola senegalensis.* Briss. av. 5. p. 148.

*Habitat in Senegalia.*

**Squatarola,** 23. T. rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albidio. *Fn. svec.* 186. \*

*Pluvialis cinerea.* Bell. av. 62. Aldr. orn. 3. p. 533. t. 534. Will. orn. 229. t. 57. Raj. av. 111. Alb. av. 1. p. 72. t. 76.

Pardalus. *Gesn. av.* 639.

Vanellus griseus. *Briss. av.* 5. p. 100. t. 9. f. 1.

*Habitat in Europa.*

*Remiges nigricantes, exceptis 2 primis, puncto albo notatæ. Rectrices albæ fasciis fuscis plurimis, at extrema tantum fascia unica. Uropygium album.*

# 88. CHARADRIUS. *Rostrum teretiusculum, obtusum.*

*Nares lineares.*

*Pedes cursorii, tridactyli.*

Hiaticu-  
la

1. *C. pectore nigro, fronte nigricante fasciola alba, vertice fusco, pedibus luteis. Fn. svec.* 187. \*

*Charadrius f. Hiaticula. Aldr. orn.* 3. p. 536. t. 537.

*Jonst. av.* 166. t. 53. *Will. orn.* 230. t. 57. *Raj.*

*av.* 112. *Sloan. jam.* 2. p. 319. t. 169. f. 2. *Alb.*

*av.* 1. p. 76. t. 80.

*Pluvialis torquata minor. Briss. av.* 5. p. 53. t. 5. f. 2.

*Matuitui. Marcgr. bras.* 199.

*Habitat in Europa & America, ad ripas cursitans.*

*Rostrum Pedesque rubri.*

alexan-  
drinus.

2. *C. fuscus, fronte collarique dorsali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.*

*Charadrius alexandrinus. Hasselq. it.* 255. n. 30.

*Charadrius griseus, fronte, linea superciliari, collari dorsali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus fusco-cærulescentibus.*

*Brumm. orn.* 77. \*

*Habitat ad Ægypti ex Nilo canalem.*

*Diversus a C. ægyptio. Rostrum Pedesque nigri. Rectrices 1, 2 utrinque candidæ; 3, 4 utrinque sordide albæ apicibus fuscis: 5, 6 fusco-nigricantes, reliquis paulo longiores. Remiges e griseo nigricantes. 1 rachi alba; 5-8 macula alba oblonga in margine exteriori; secundariæ apice albæ. Tectrices apice albæ. B.*

vocife-  
rus.

3. *C. fasciis pectoris colli frontis genarumque nigris, cauda lutea fascia nigra, pedibus flavis.*

Plu-



Pluvialis vociferus. *Catesb. car.* 1. p. 71. t. 71.

Pluvialis virginiana torquata. *Briss. av.* 5. p. 68.

*Habitat in America septentrionali.*

*Rostrum nigrum. Pedes lutei.*

ægyptius. 4. C. fascia pectorali nigra, superciliis albis, rectricibus apice albis fascia nigra, pedibus cæruleis.

Charadrius ægyptius. *Hasselq. iter.* 256. n. 31.

*Habitat in Ægypti apricis.*

Morinel- 5. C. pectore ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque  
lus. lineari alba, pedibus nigris. *Fn. svec.* 188. \*

Charadrius pectore ferrugineo, linea alba transversa collum pectusque distinguente. *Faun. svec.* 1. n. 158. *Mas.*

Morinellus. *Gesn. av.* 615. *Aldr. orn.* 3. p. 540.

*Will. orn.* 230. t. 55, 57. *Raj. av.* 111. *Alb. av.* 2. p. 57. t. 61, 62.

Pluvialis minor. f. Morinellus. *Briss. av.* 5. p. 54. t. 4. f. 2.

β. C. Charadrius pectore cinereo, abdomine rufescente, vertice fusco. *Fn. svec.* 1. n. 160. *Femina.*

*Habitat in Europa campestri, ad Alpes migrans, per Uspsiam medio maji, septentrionem versus.*

*Mas ad scrobiculum abdominis niger; feminae non vitæ alba cingit caput. Vertex, Rostrum, Pedesque nigricantia.*

aprica- 6. C. pectore abdomineque nigro, corpore fusco albo luteoque punctato, pedibus cinereis. *Fn. svec.* 189. \*

Charadrius nigro-lutescente variegatus, pectore nigro.

*It. æl.* 72. *Fn. svec.* 1. n. 156.

Pluvialis viridis maculatus, ventre nigro. *Ediv. av.* 140. t. 140.

Pluvialis aurea freti hudsonis. *Briss. av.* 5. p. 51.

*Habitat in Oelandia, Canada.*

*Frons, Supercilia, Palpebra inferior, Hypochondria, Crissumque alba. Gula, Abdomen, linea sub collo nigra. Rostrum Pedesque nigricantia.*

Pluvialis. 7. C. corpore nigro viridique maculato, subtus albido, pedibus cinereis. *Fn. svec.* 190.

Pluvialis viridis. *Will. orn.* 229. t. 57. *Raj. av.* 111.

*Marsf. dan.* 5. t. 25. *Sloan. jam.* 2. p. 113. t. 269.

f. 1. *Alb. av.* 1. p. 71. t. 75.

Pluvialis aurea. *Briss. av. 5. p. 43. t. 4. f. 1.*

Pluvialis. *Gesn. av. 714. Aldr. orn. 3. p. 528. t. 531.*

*Habitat in Europa.*

*Rostrum Pedesque nigricantes. Pectus griseum maculis flavescentibus.*

torqua-  
tus.

8. *C. pectore nigro-variegato, fronte alba, vertice col-  
larique nigro, rostro pedibusque cærulescentibus.*

*Pluvialis dominicensis torquata. Briss. av. 5. p. 70.  
t. 6. f. 2.*

*Habitat in Dominica.*

*Facies ♂ magnitudo Hiaticulæ. Uropygium rufum.  
Rectrices 3 extimæ apice albæ.*

Calidris. 9. *C. rostro pedibusque nigris, loris uropygioque subgri-  
seis, corpore subtus albo immaculato.*

*Calidris grisea minor. Briss. av. 5. p. 236. t. 20. f. 2.*

*Habitat ad littora Europæ.*

*Corpus griseo varium. Facies, Collum, Pectus & Ab-  
domen nivea. Remiges primores scapo candido.*

Oedicnemus. 10. *C. griseus, remigibus primoribus duabus nigris me-  
dio albis, rostro acuto, pedibus cinereis. Zool. brit.  
t. D. 1.*

*Oedicnemus. Bell. av. . . 51. Aldr. orn. 2. p. 98.  
t. 99, 100. Will. orn. 227. t. 77. Raj. av. 108.  
n. 4. Alb. av. 1. p. 66. t. 69.*

*Fedoa tertia. Will. orn. 216. Raj. av. 105.*

*Charadrius. Gesn. av. 256.*

*Charadrius Kervari. Hasselq. iter. 210. n. 32. an?*

*Pluvialis major, Oedicnemus. Briss. av. 5. p. 77. t.  
7. f. 1.*

*Habitat in Anglia, Oriente.*

*Pedes Rostrumque nigra. Palpebra inferior nuda luteola,  
Lineola supra infraque oculos flava. Linea fusca  
a rostro sub oculis ad aures.*

Himantopus. 11. *C. albus, dorso nigro, rostro nigro capite longiore,  
pedibus rubris longissimis.*

*Charadrius autumnalis. Hasselq. iter. 253. n. 29.*

*Himantopus. Sibb. scot 18. t. 11, 13. Raj. av. 106.  
Aldr. orn. 3. p. 443. t. 445, 446. Gesn. av. 547.  
Bell. av. 53. Will. orn. 219. t. 54. Mars. dan.  
5. p. 46. t. 21. Briss. av. 5. 33. t. 3. f. 1.*



*Habitat in Europa australiore, ad maris littora.*

*Rostrum nigrum, apice crassius. Oculi rubri pupilla alba. Corpus album, sed nigricans dorso, occipite, rectricibus alarum.*

spinofus. 12. *C. remigibus pectore pedibusque atris, occipite cristato, rectricibus dimidiato-albis, alulis spinosis.*

*Charadrius spinofus. Hasselq. itin. 260, 261. \**

*Pluvialis senegalensis armata. Briss. av. 5. p. 86. t. 7. f. 2.*

β. *Pluvialis indicus, pectore nigro. Edw. av. 47. t. 47. ♂ t. 280.*

*Pluvialis persica cristata. Briss. av. 5. p. 84.*

*Lapwing. Russel. alepp. 72. t. 11.*

*Habitat in Ægypto.*

*Humeri spinosi, ut in Parris, singulares sunt. Rostrum nigrum. Rectrices albæ, apice nigræ.*

89. **RECURVIROSTRA.** *Rostrum depresso-planum, subulatum, recurvatum, acuminatum, apice flexili.*

*Pedes plamati, tridactyli.*

Avocet- 1. *R. albo nigroque varia. It. æl. 89. Faun. svec. 191. ta*

*Avocetta f. Recurvirostra. Gesn. av. 231. t. 232.*

*Aldr. orn. 3. p. 288. t. 287. Will. orn. 240. t.*

*60. Raj. av. 117. Briss. av. 6. p. 538. t. 47.*

*f. 2. Mars. dan. 5. p. 72. t. 34. Alb. av. 1. p. 96. t. 101.*

*Habitat in Europa australiore; Viçtitat Cancro pulice locustaque. Migrat in Italiam, rarissima in Svecia; semper ad maris littora.*

*Dorsum, Uropygium, Rectrices alba, ut ♂ macula parva sub oculo. Rostrum nigrum. Pedes cærulescentes.*

90. HÆMATOPUS. *Rostrum* compressum : apice cuneo æquali.

*Nares* lineares.

*Pedes* cursorii, tridactyli, fissi.

Ostrale- 1. HÆMATOPUS. *It. æl.* 83. *Fn. svec.* 192. \* *Bell. av.* 18. *Gesn. av.* 546. *Aldr. orn.* 3. p. 447 *Will.*

*orn.* 220. t. 56. *Raj. av.* 105. *Alb. av.* 1. p. 74. t. 78. *Catesb. car.* 1. p. 85. t. 85.

Ostralega Pica marina. *Briss. av.* 5. n. 38. t. 3. f. 2.

*Habitat in* Europa, America septentrionali, *curritans in littoribus marinis, viçtitans conchis, ubi videt venatorem hostemve, clamitando Anseribus indicat & recedere suadet. Senior præcociorve a migratione reditus, ejusmodi ver indicat.*

*Rostrum Pedesque rubri.*

91. FULICA. *Rostrum* convexum : Mandibula superiore margine supra inferiorem fornicata ; Mandibula inferior, pone apicem gibba.

*Nares* oblongæ.

*Frons* calva.

*Pedes* tetradactyli, subpinnati.

fusca.

1. F. fronte flavescente, armillis concoloribus, pedibus simplicibus, corpore fuscescente.

*Gallinula minor. Briss. av.* 6. p. 6.

*Gallinula alia chloropus fulicæ similis. Aldr. orn.* 3. p. 496. t. 497. *Will. orn.* 294.

*Rallus italorum. Gesn. av.* 392. *Aldr. orn.* 3. p. 98. *Will. orn.* 238. *Raj. av.* 116.

*Habitat in* Europa.

*Corpus fusco-olivaceum ; subius cinereum, albo-undulatum.*

atra.

2. F. fronte incarnata, armillis luteis, pedibus pinnatis, corpore nigricante.

*Fulica. Bell. av.* 36 *Gesn. av.* 91. *Aldr. orn.* 3. p. 91. t. 95. *Will. orn.* 239. *Raj. av.* 116. *Murj-*

R

dan.



dan. 5. p. 70. t. 33. Alb. av. 1. p. 79. t. 83.

Briss. av. 6. p. 23. t. 2. f. 1.

Phalaris Gesn. av. 130. Aldr. orn. 3. p. 260.

*Habitat in Europæ aquosis, natat curritque supra aquas, nidificat inter arundinem nido ex ejus foliis confectio & arundinibus affixo. Edit semina, herbas. Hybernatur in Gallia.*

aterrima. 3. F. fronte alba, armillis rubris, pedibus pinnatis, corpore nigricante.

Fulica major. Will. orn. 239. t. 51. Raj. av. 117.

Briss. av. 6. p. 28. t. 2. f. 2.

Fulica alia, Diabolus marinus. Aldr. orn. 3. p. 98.

*Habitat in Europæ maritimis.*

*Simillima præcedenti, sed major, fronte & armillis distinguenda.*

chloropus. 4. F. fronte fulva, armillis rubris, pedibus simplicibus corpore nigricante.

Fulica cinereo-fusca, rostro viridi basin versus coccineo frontequè coccinea. Kram. austr. 358 \*

Gallinula chloropus major. Aldr. orn. 3. p. 449. t. 450. Will. orn. 233. t. 58. Raj. av. 113. Alb. av. 2. p. 66. t. 72. & 3. p. 86. t. 91.

Gallinula. Briss. av. 6. p. 3. t. 1. f. 1, 2.

*Habitat in Europa australiore; in Martinica D. Jacquin.*

*Cristum utrinque album, quod inter natandum crebro ostendat. Pedes flavo-virescentes. Rostrum flavum, basi semicoccineum.*

Porphyrio. 5. F. fronte rubra, armillis multis, pedibus simplicibus, corpore viridi, subtus violaceo.

Prophyrio. Bell. av. 52. Gesn. av. 716. t. 717. Aldr. orn. 3. p. 437. t. 439. Clus exot. 370. Will.

orn. 238. Raj. av. 116. Alb. av. 3. p. 79. t. 84.

Edw. av. 87. t. 87. Briss. av. 5. p. 522. t. 42. f. 1.

*Habitat in India Asiæ, Americæ.*

carthagina. 6. F. fronte cærulea, armillis ---, pedibus simplicibus, corpore rufescente.

*Habitat Carthagenæ. D. Jacquin.*

*Corpus magnitudine F. atræ, totum rufum.*

martini- 7. F. fronte cærulea, armilis - - -, pedibus simplicibus,  
ca. corpore fusco - cærulescente.

*Habitat in Martinicæ inundatis; edit Oryzam, Pisa, Panem. D. Jacquin.*

*Corpus fere minus F. atræ, nitens, e fusco-cærulescenti varium. Frons cera cærulea, oblonga, quadrata. Rostrum rubrum apice flavo. Pedes flavi, digitis simplicibus longissimis. Dorsum Alæque fuscæ cum aliquo virore. Crissum album.*

92. PARRA. Rostrum teretiufculum, obtusiufculum.

*Naves ovatæ, in medio rostri.*

*Frons carunculata: carunculis lobatis.*

*Alulæ spinosæ.*

domini- 1. P. unguibus modicis, pedibus flavis.

ca. *Vanellus dominicensis armatus. Briss. av. 5. p. 118. Habitat in Dominica.*

*Caruncula frontis laxa lutea. Rostrum ♂ Pedes flavi. Corpus fulvum, subtus roseum. Rectrices fulvæ.*

senegal. 2. P. unguibus modicis, pedibus rubris.

la. *Vanellus senegalensis armatus. Briss. av. 5. p. 111. t. 10. f. 2.*

*Habitat in Senegallia.*

*Caruncula frontis laxa lutea. Rostrum luteum. Pedes rubri. Corpus magnitudine Vanelli, griseo-fuscum. Frons alba. Gula nigra. Remiges nigra: secundariæ apice albida. Cauda antice atra, postice nigra, apice pallida.*

Jacana. 3. P. unguibus posticis longissimis, pedibus viridescentibus.

*Gallinula brasiliensis 4. Will. orn. 237. Raj. av. 115.*

*Jacana 4. Marcgr. bras. 191. Edw. av. t. 357.*

*Briss. av. 5. p. 125. t. 11. f. 1.*

*Caput Chilli nocturnum. Hern. mex. 50. Raj. av. 178.*

*Habitat in America australi.*



*Caruncula bipartita aurantia, cui lacinia dependens utrinque adhæret. Rostrum aurantium. Corpus nigro-violaceum Dorsum purpurascens. Remiges nigre marginæ albo. An varietas sequentis?*

variabilis. 4. *P. unguibus posticis elongatis, pedibus cærulescentibus. Gallinula alis cornibus donatis. Edw. av. 48. t. 48. Jacana. Briss. av. 5. p. 129. Habitat in America australi.*

*Unguis posticus rectus, digito longior. Pollex unius articuli, insists. Corpus supra purpurascens, subtus album Caput fuscum. Supercilia alba. Linea nigra a rostro per oculos descendens ad collum. Rostrum fulvum. Color variat.*

Chavaria. 5. *P. digitis elongatis, pedibus fulvis, occipite cristato. Habitat in fluviis, lacubus & inundatis, vicinis fluminibus Cinu, leucis 30 Carthagena indica distanti. Videscitur herbis. Incessus gravis, lentus. Volatus facilis, celer. Currere omnino nequit, nisi simul semivoleat. Tacta manu cutis, sub pennis etiam lanosae crepat ubique fortiter. Lana hæc densa levitatem conciliat corpori, ita ut perfecte natet pedibus digitisque longissimis, sed omnino fissis, quibus etiam in stagnis herbosis profundis incedere possit. Rostrum unguibus nocere nequit. Calcaria in alis singulis 2, 3, crassa, durissima, semipollicaria, acuta & occurrunt, nisi quando alis, quas longissimas fortissimasque habet, quantum fieri potest, extensis, hostem aggreditur & ictibus fortissimis trucidat. Aves rapaces ferre nequit & primo illas adoritur. Vulturem Auram infrequentissimum, sæpeque obambulantem & appropinquantem, illico occurrit & expellit. Indi, qui Gallinas, Anseves &c. nutriunt in magno numero, unicam Chavariam cicuratam habent, quæ cum reliqua Gallinarum turba per vicina pergit, numquam deserit, etsi volare possit & domum ad vesperam revertitur. Ab homine adulto se tangi patitur & nemini nocet contra Pueros se defendit sæpius. Vox clara alta sed ingrata. D. Jacquin.*

*Corpus sesquipedale a terra altum, magnitudine Gallini gallinacei, uti Alæ & Cauda nigricans cum nebulis griseis; minus nigricat venter. Rostrum c*

nico - incurvum , sordide albicans ; maxilla superiore imbricata Gallinæ. Nares oblongæ , apertæ s. per. vie. Membrana ad basin rostri utrinque , rubra , ad tempora extenditur , in cujus media parte sunt Oculi iride fusco. Lanugo absque pennis , curta densaque , sed nigra tegit totum collum , at nivea inferiorem capitis partem sub rostro & tempora , ad latitudinem pollicis unius. Frons & Occiput tegitur pennis veris , corpori concoloribus , sed minus fuscis. Crista ex 12 circiter pennis , tripollicaribus , nigricantibus , respectu loci perpendicularibus , corporis autem respectu decumbentibus , orta in infima parte occipitis , ubi lanugo cessat. Femora seminuda , crassa. Genua crassissima s. nodosa. Tibiæ longæ , flavo-rubræ , validæ. Pedes tetradactyli , fissi , concolores. Digiti crassi , omnium longissimi , unde maxime decussent sub incessu. Collum longum. Cauda brevis. Jacquin.

93. RALLUS. Rostrum basi crassius , compressum , dorso attenuatum apicem versus , æquale , acutum.

Nares ovatæ.

Pedes tetradactyli , fissi.

Corpus compressum.

Crex.

1. R. alis rufo - ferrugineis. Faun. svec. 194.

Ortygometra alis rufo - ferrugineis. Faun. svec. 1. n. 162.

Ortygometra. Bell. av. 49. Gesn. av. 360. t. 361.

Aldr. orn. 2. p. 174. t. 176. Will. orn. 522. t. 29.

Raj. av. 58. Alb. av. 1. p. 30. t. 32.

Crex. Gesn. av. 362. Aldr. orn. 3. p. 428.

Rallus genistarum s. Ortygometra. Briss. av. 5. p. 159. t. 13. f. 2.

Habitat in Europæ agris , carectis ; victitat Lumbricis ; corpore valde compresso cursitat inter gramina ; nidificat in agris , vesperi & nocte sonorus voce ingeminata crex , allicitur pectine papyro intertexto. Ova 16. Rostrum Pedesque grisei. Pulli lanuginosi , atrii.



aquaticus. 2. R. alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis albo-maculatis, rostro subtus fulvo. *Faun. svec.* 195. \*

Rallus aquaticus. *Aldr. orn.* 3. p. 455. *Will. orn.* 234. *Raj. av.* 113. *Alb. av.* 1. p. 73. t. 77. *Zool. brit. t. E. E. Briss. av.* 5. p. 151. t. 12. f. 2.

Ortygometra alis fuscis, lumbis nigris lituris transversis albis *Kram. austr.* 349. \*

Ortygometra. *Bell. av.* 49. *Aldr. orn.* 3. p. 455. t. 456. *Alb. av.* 1. t. 77.

Gallinula aquatica. *Gunner. act. nidros.* 2. p. 340. t. 12. *Stræm. sondm.* 218.

Gallinula sericea. *Will. orn.* 235. *Raj. av.* 114.

Gallinula s. Gallinago sericea. *Aldr. orn.* 3. p. 470.

Gallinula chloropus. *Mars. dan.* 5. p. 68. t. 32.

Gallinula Semethounte. *Gesn. av.* 517.

*Habitat in Europæ paludosis.*

*Rostri basis subtus fulva. Pedes virescentes. Pennæ molliſſimæ. Palpebræ rubræ.*

Porzana. 3. R. rectricibus binis intermediis albo marginatis, rostro pedibusque subolivaceis.

Rallus aquaticus minor s. Maruetta. *Briss. av.* 5. p. 155. t. 13. f. 1.

Gallinula Ochra. *Gesn. av.* 513. *Aldr. orn.* 3. p. 468. *Will. orn.* 236. *Raj. av.* 115.

Porzana minor. *Aldr. orn.* 3. p. 558.

*Habitat in Europa ad ripas.*

*Frons & Collum subtus cinerea.*

fuscus. 4. R. fuscus, crisso albo undulato, pedibus flavis.

Rallus philippensis fuscus. *Briss. av.* 5. p. 173. t. 15. f. 2.

*Habitat in Philippinis.*

striatus. 5. R. nigricans albo undulatus, gula rufescente.

Rallus philippensis striatus. *Briss. av.* 5. p. 167. t. 14. f. 2.

*Habitat in Philippinis.*

*Rostrum cornei coloris. Pedes subfusci.*

torquatus. 6. R. fuscus, subtus albo undulatus, linea infra oculos alba.

Rallus philippensis torquatus. *Briss. av.* 5. p. 170. t. 15. f. 1.

*Habitat in Philippinis.*  
*Rostrum Pedesque fusci.*

- philip- 7. R. fuscus, subtus griseo fasciatus, superciliis albis,  
penfis. collo subtus rufescente.  
Rallus philippensis. *Briss.* av. 5. p. 163. t. 14. f. 1.  
*Habitat in Philippinis.*  
*Corpus supra nigricans, ferrugineo-varium. Rostrum*  
*Pedesque grisei.*

- bengha- 8. R. albus, capite colloque nigro, alis dorsoque viri-  
lenfis. dibus, remigibus primariis rubro-maculatis.  
Rallus benghalensis. *Alb.* av. 3. p. 85. t. 90.  
Tringa Totanus benghalensis. *Briss.* av. 5. p. 209.  
*Habitat in Asia.*  
*Rostrum luteum. Pedes lutescentes.*

- carolinus. 9. R. griseus, capistro nigro, pectore plumbeo, ro-  
stro flavo, pedibus virescentibus.  
Gallinula minor canadensis. *Edw.* av. 144. t. 144.  
Porphyrio freti hudsonis. *Briss.* av. 5. p. 541.  
*Habitat in America septentrionali; in Svecia Edw. non*  
*vidi.*

- virginia- 10. R. fuscus immaculatus, rostro pedibusque fuscis.  
nus. Rallus americanus. *Catesb. carol.* 1. p. 70. t. 70. *Briss.*  
av. 5. p. 175.  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Feminam præcedentis esse suspicatur D. Edward.*

94. PSOPHIA. *Rostrum cylindrico-conicum, con-*  
*vexum, acutiusculum, mandibu-*  
*la superiore longiore.*

*Nares ovatae, patulae.*

*Pedes tetradactyli, fissi.*

crepitans. 1. PSOPHIA.

Psophia crepitans nigra, pectore columbino. *Barr.*  
av. 62.

Gallina sylvatica crepitans, pectore columbino. *Barr.*  
*æquin.* 132.

Gallina sylvestris Macucagua. *Raj.* av. 53.



*Perdix major brasiliensis.* Briss. av. 1. p. 227.

*Trompette* Condam. it. 174.

*Macucagua.* Marcgr. bras. 213. *Pis. bras.* 88. Will. av. 116.

*Habitat in America meridionali. Rostro mussitanti respondet per anum.*

95. OTIS. *Rostrium* mandibula superiore fornicata.

*Nares* ovatæ.

*Lingua* bifida.

*Pedes* cursorii, tetradactyli.

Tarda. 1. O. maris capite juguloque utrinque cristato. Faun. svec. 196. \*

Tarda. Dodart. mem. 3. p. 309. Edw. av. 73. t. 73, 74. Alb. av. 3. p. 36. t. 38, 39.

Otis f. Tarda avis. Aldr. orn. 2. p. 85. t. 89. Gesn. av. 484. Will. orn. 129. t. 32. Raj. av. 38. Briss. av. 5. p. 18. Edw. av. 73. t. 73, 74.

*Habitat in Poloniæ, Orientis campis; viſitat Granis & Herbis; migrat per Belgium, Angliam. In cænis eximia.*

*Remiges primores nigre; secundariæ maximam partem albæ. Rectrices 20, ut in Gallinis.*

arabs. 2. O. auribus erecto cristatis.

Otis arabica. Edw. av. 12. t. 12. Briss. av. 5. p. 30.

*Habitat in Oriente, Arabia felice.*

*Supra scolopacina, subtus albida. Aures nigre. Cauda fascia fusca.*

Tetrax. 3. O. capite juguloque lævi. Fn. svec. 196. \*

Anas campestris. Gesn. av. 795. Aldr. orn. 2. p. 96. Will. orn. 129. Briss. av. 5. p. 24. t. 2. f. 1, 2. Alb. av. 3. p. 33. t. 41. Raj. av. 59. Edw. av. 89. t. 251.

Tetrax. Bell. av. 56. Aldr. orn. 1. 13. c. 13.

*Habitat in Europa, imprimis in Gallia; herbis & seminibus viſitat.*

*Mas collo nigro, torque albo. Rectrices 18.*

atra.

4. O. nigra, dorso cinereo, auribus albis.

*Habitat in Æthiopia. I. Burmannus.*

Maris Rostrum ♂ Pedes flavi. Vertex cinereus. Alarum margo exterior albus. Femina tota cinerea, exceptis femoribus abdomineque atris.

96. STRUTHIO. Rostrum subconicum.

Nares ovatæ.

Alæ ad volandum ineptæ.

Pedes cursorii.

Camelus. 1. S. pedibus didactylis.

Struthio-Camelus. Bell. av. 55. Gesn. av. 739. t. 740. Aldr. orn. 1. p. 587. t. 590, 591. Dodart. mem. 335. Seb. mus. 1. t. 51. f. 6. Will. orn. 104. t. 25. Raj. av. 36. Alb. av. 3. p. 30. t. 31. Jonst. av. t. 21. Alp. ægypt. 1. p. 200.

Struthio. Briss. av. 5. p. 3. t. 1. f. 1.

Habitat in Syria; Arabia, Lybia, Africa. Cursu facile omnibus animalibus antecellit, hinc equitatio ejus suffocans. Ova sæpe 50, candida, lævia, ponit in arena; noctu tantum incubat. Job. XXXIX: 16.

Corpus maximum omnium avium ( oppositum Trochilo minimo ), hinc volare nescium, Pennis decompositis radiis discretis. Caput superius nudum. Palpebra utraque ciliata. Sternum callosum. Spinæ alarum duæ: altera ad alulam; altera in alæ apice. Digi-  
giti duo, basi connexi membrana: exteriore digito mutico. Pennæ pro galea bellica Cristaque castrensi. Cauda alba. Remiges primores albæ. Femora & latera sub alis nuda.

Casua-  
rius.

2. S. pedibus tridactylis, galea pallearibusque nudis.

Casuaris. Olear. mus. 23. t. 13. f. 2. Alb. av. 2. p. 56. t. 60. Frisch. av. t. 105. Briss. av. 5. p. 10. t. 1. f. 2.

Emeu. Dodart. mem. 377. Raj. av. 36. Clus. exot. 97. t. 98. Bont. jav. 71. Will. orn. 105. t. 25. Worm. mus. . . . Jonst. av. 172. t. 56. Aldr. orn. 3. p. 541. t. 541. Alb. av. 2. p. 39. t. 60.

Habitat in Asia; Sumatra, Molucca, Banda; Africa. Ungue intermedio majore ferit; ova punctis excavatis.



Corpus magnitudine proximum antecedenti, volatus nescium, nigrum pennis discretis. Remiges 5 absque radiis. Rectrices nullæ. Caput nudiusculum, cærulescens: diadema verticis e callo elevato, flavo, antice fusco. Palearia membranacea 2, rubro cærulea, sub medio collo, supra nudo. Sternum callosum.

Rhea.

3. S. pedibus tridactylis: digito postico rotundato mutico.

Struthio. *Nieremb. nat. 217. t. 218.*

Struthio Camelus americanus. *Raj. av. 36.*

Nhanduguacu brasiliensibus. *Marcg. bras. 190. Pis. bras. 84. Will. orn. 85.*

Rhea. *Briss. av. 5. p. 8.*

*Habitat in America australi, victitans fructibus, carne.*

Corpus griseum. Rectrices nullæ. Uropygii penna deflexæ tegunt caudam. Pedes fissi; digiti postici loco callus.

V. GALLINÆ.

*Rostrum convexum : mandibula superiore fornicata , margine extra inferiorem dilatato.*

*Nares membrana cartilaginea convexa semitectæ.*

*Rectrices plures quam duodecim.*

*Pedes fissi , sed intimo articulo connexi.*

97. DIDUS. *Rostrum medio coarctatum rugis duabus transversis : utraque mandibula inflexo apice.*

*Facies ultra oculos nuda.*

ineptus. 1. DIDUS.

*Dodo. Edw. av. t. 294.*

*Dronte. Bont. jav. 70.*

*Raphus. Briss. av. 5. p. 14.*

*Struthio cucullatus. Syst. nat. 10. p. 155.*

*Cygnus cucullatus. Nieremb. nat. 231. Will. orn. 107. t. 27. Raj. av. 37.*

*Gallus gallinaceus peregrinus. Clus. exot. 99. t. 10.*

*Olear. mus. 23. t. 13. f. 5.*

*Habitat in India, volare nescius.*

*Corpus nigrum , albido - nebulosum. Alæ impennes , albidæ. Cauda brevissima pennis incurvis , ut in struthione. Rostrum supra apicem rubrum.*

98. PAVO. *Caput pennis revolutis tectum.*

*Pennæ uropygii elongatæ, ocellatæ.*

cristatus. 1. P. *capite crista compressa, calcaribus solitariis. Faun. svec. 197.*

Pavo

---

*Ordinis hujus aves, in lege ceremoniali mosaica, solæ Puræ habebantur & in cœnis salutares.*



Pavo. Gesn. av. 656. Aldr. orn. 2. p. 1. t. 9, 10.  
Jonst. av. 56. t. 22. Will. orn. 112. t. 27. Raj.  
av. 51.

Phasianus Pavo. Briss. av. 1. p. 281. t. 27.

Habitat in India orientali, Zeylona. Mas remigibus  
primoribus ferrugineis, calcaratus, ejulans, vindi-  
cans, pertinax, superbus, pulcherrimus omnium, to-  
gam dorsalem gemmantibus ocellis, naturæ miraculo  
pietam erigendamque, tertio anno acquirit, qua ni-  
hil pulchrius, quam sub canicula dejicit. Femina  
curat pullos in proximas nuptias. Lepidoptera col-  
ligit, iisque porrigit, noctuque sub alis fovet; Sam-  
buci floribus occiditur; delectatur Tritico, Piso; per-  
noctat in altis.

bicalcara- 2. P. capite subcristato, calcaribus binis.  
tus.

Phasianus payonicus chinensis. Edw. av. 67. t. 67.  
♂ t. 69. f. 1. Briss. av. 1. p. 291.

β. Pavo libetanus. Briss. av. 1. p. 294. t. 28. f. 2.  
Habitat in China.

Pennæ verticis reflexæ. Pennæ posterioris dorsi longæ  
ocellis binis.

muticus. 3. P. capite crista subulata, calcaribus nullis. †

Pavo japonensis. Aldr. orn. 2. p. 35. t. 33, 34.

Jonst. av. t. 23. f. 3. Briss. av. 1. p. 289.

Habitat in Japonia.

Orbitæ oculorum rubræ.

99. MELEAGRIS. Caput carunculis spongiosis  
tectum.

Gula caruncula membrana-  
cea longitudinali.

Gallopavo. 1. M. capite caruncula frontali gularique, maris pectore  
vo. barbato. Fn. svec. 128.

Gallo-pavo sylvestris novæ angliæ. Raj. av. 51.

Alb. av. 3. p. 33. t. 35.

β. Gallopavo. Gesn. av. 482. Aldr. orn. 2. p. 35.

t. 39, 40. Bell. av. 60. a. Jonst. av. 58. t. 24.

Will. orn. 113. t. 27. Raj. av. 51. Briss. av. 1.

p. 158. t. 16.

7. Gallopavo cristatus. *Alb. av. 2. p. 30. t. 33.*

*Habitat in America septentrionali; edit Grana, Coleoptera, Hemiptera.*

*Mas exæstuat inflato pectore, expansa cauda, sanguinea facie, relaxata frontis caruncula: iræ tenax; sapida caro. Barba pectoris tertio anno excrescit. Pulli delectantur Allio, Urtica; a fame & pluvia cavendi. Restrices XVIII.*

cristata. 2. M. capite pennis erectis cristato, temporibus violaceis.

Gall-pavo brasiliensis. *Briss. av. 1. p. 162.*

Quan f. Guan. *Edw. av. 13. t. 13.*

Jacupema. *Marcgr. bras. 198.*

Phasianus brasiliensis. *Raj. av. 56.*

*Habitat in America australi.*

*Gula caruncula compressa rubra ut in antecedente, capite supra crista oblonga pennacea, absque caruncula.*

Satyra. 3. M. capite cornubus geminis, corpore rubro punctis ocellatis. †

Phasianus cornutus. *Edw. av. 116. t. 116 Briss. av. 6. app. 14.*

*Habitat in Benghala.*

*Frons nigra. Caruncula gularis cerulea rufo variegata. Gornua duo cerulea, pone oculos enata.*

100. CRAX. Rostrum basi cera obductum in utraque mandibula.

*Pennæ caput tegentes revolutæ.*

Alector. 1. C. cera flava, corpore nigro, ventre albo.

Crax guianensis. *Briss. av. 1. p. 298. t. 29.*

Gallus indicus. *Sloan. jam. 2. p. 302. t. 260. Do. dart. mem. 3. p. 223. t. 33. Frisch. av. t. 121.*

Avis montana. *Nieremb. nat. 231.*

Mitu poranga. *Marcgr. bras. 195. Will. orn. 115. t. 28. Raj. av. 52. n. 6. & 183. n. 19.*

Moylon. *Laet. amer. 615.*

Tepetototl. *Hern. mex. 35.*

*Habitat in America calidiore, caudam caputque continuo movet sub sono.*

*Magnitudo Galli. Cera ultra  $\frac{1}{2}$  rostri partem occupans, tam in superiori, quam inferiori mandibula.*

*Lin.*



*Lingua integra. Pilei pennæ revolutæ. Tempora calva, nigra. Cauda rotundata pennis XIV. Calcaria nulla.*

- rubra. 2. *C. rubra, capite cærulescente. †*  
*Crax peruvianus. Briss. av. 1. p. 305.*  
*Gallina peruviana rubra. Alb. av. 3. p. 37. t. 40.*  
*Habitat in Peru.*
- Mitu. 3. *C. cera rubra, corpore nigro, abdomine fusco.*  
*Mitu s. Mutu. Marcgr. bras. 194. Will. orn. 114.*  
*t. 28. Raj. av. 52. n. 4.*  
*Phasianus Crax brasiliensis. Briss. av. 1. p. 296.*  
*Habitat in Brasilia, Guiana.*
- globo-cera. 4. *C. flava, narium gibbere globoso, corpore nigro-cærulescente.*  
*Crax curassous. Briss. av. 300.*  
*Gallus indicus alius. Aldr. orn. 2. p. 332.*  
*Gallina indica. Aldr. orn. 2. p. 333. Raj. av. 52.*  
*Alb. av. 2. p. 31, 32. Edw. av. 2. t. 295. f. 1.*  
*Habitat in Brasilia, Curacao.*  
*Pilei pennæ revolutæ. Gibber subglobosus, luteus, inter nares.*
- Pauxi. 5. *C. cera cærulea, narium gibbere cristato, corpore nigricante, abdomine apiceque caudæ albis.*  
*Gallina indica alia. Aldr. orn. 2. p. 334, 333. Will. orn. 110.*  
*Pauxi. Hern. mex. 56. Nieremb. nat. 234. Will. orn. 114. Raj. av. 52. Edw. av. t. 295. f. 2.*  
*Phasianus Crax mexicanus. Briss. av. 1. p. 303.*  
*Habitat in Mexico.*  
*Rostrum rubrum. Caruncula cristata, cærulea, rostro longior, inter nares.*

## 101. PHASIANUS. Genæ cute nuda lævigata.

- Gallus. 1. *P. caruncula compressa verticis geminaque gulæ, auribus nudis cauda compressa adicendente. Faun. svec. 199.*  
*Gallus gallinaceus s. Gallina. Gesn. av. 395., 340.*  
*Aldr. orn. l. 14. c. 1. Will. orn. 109. t. 26. Raj. av. 51.*

- cristatus*. β. Gallina crista in vertice plumosa densissima. *Raj.*  
av. 51.
- ecaudatus* γ. Gallina cauda s. uropygio carens. *Raj.* av. 51.  
Gallina persica. *Aldr.* orn. 2. t. 313, 318.
- morio*. δ. Gallus crista & palaribus nigris. *Briss.* av. 1. p. 174.  
Gallina carne nigra. *Bont.* jav. 65.
- lanata*. ε. Gallus japonicus pennis pilorum cæruleis. *Briss.* av.  
1. p. 175. t. 17. f. 2.
- crispus*. η. Gallina frislandica. *Will.* orn. 110.  
Gallina crispa. *Raj.* av. 51. *Aldr.* orn. 1. 14. p. 329.  
*Pennæ revolutæ. Remiges absque radiis.*
- pufillus*. ζ. Gallus tibiis pennatis: pennis posticis elongatis.  
Gallina bentamenfis. *Alb.* av. 3. 33. t. p. 33, 34.  
*Habitat in India Orientali: Pouli candor, &c. Gra-*  
*minum Cerealiumque imprimis jacta semina legit, ru-*  
*spando humum Lumbricos colligit, ostenditque pullis.*  
*Gallus pugnax, superbus celsa crista, erecta falcataque*  
*cauda, vigil, plaudentibus lateribus canens gallicinia,*  
*rusticorum horologium, parit toto anno nisi Capis so-*  
*ciata, modo cibi satis, aqua frigida, arena locusque*  
*calidus; deposito ovo ovat & gracillat; calidior dum*  
*incubat, in frigidam aquam immissa incubare desinit.*  
*Pullities artificialis ventre equino chemicorum, aut*  
*furno ægyptiorum peragitur; salax mas 10 feminis*  
*sufficit. Cibus expetita ova, caro, juncula galli se-*  
*nioris. Læditur baccis Sambuci: a Pediculis libe-*  
*ratur pipere.*  
*Mas calcaratus, Rectricibus intermediis elongatis fal-*  
*catis.*
- Motmot*. 2. P. fuscus, subtus rufescens, cauda cuneata, rectrici-  
bus lateralibus rufis.  
*Phasianus guianensis. Briss.* av. 1. p. 270. t. 26.  
f. 2.  
*Motmot brasiliensis. Seb. mus.* 1. t. 67. f. 2.  
*Katrakas-katrakas. Fewill.* peruw. 285.  
*Habitat in Brasilia, Guania.*  
*Caret Calcaribus.*
- colchi-*  
*chus*. 3. P. rufus, capite cæruleo, cauda cuneata, genis pa-  
pillofis.  
*Phasianus. Gesn.* av. 62. *Raj.* av. 56. *Alb.* av. 1  
p. 24. t. 15, 26. *Olin.* av. 49. *Aldr.* orn. 2. p.  
48. *Frisch.* av. t. 123. *Briss.* av. 1. p. 262.



*Habitat in Africa, Asia. Tempore pruritus supra aureas utrinque fasciculus pennaceus aureus, corniculorum æmulus. Principum mensis dicatus.*

*Calcaribus instructus. Genæ nudæ, coccineæ, papillose.*

Argus. 4. *P. luteus nigro punctatus, facie rubra, occipite cristato cæruleo.*

*Phasianus Argus. Edw. av. ined.*

*Habitat in Tataria Chinesi. Pet. Collinson.*

*Corpus luteum, nigro punctatum. Orbitæ & Myrtæces nigre. Sinciput, Gula & jugulum rubra; Occiput cristatum & Nucha cærulea. Alæ griseæ punctatis ocellatis. Cauda cuneata, alis concolor: Rectricibus intermediis duabus tripedalibus, ad rachin ocellatis ocellis magnis; magnitudo Gallopavonis. Pedes calcaribus instructi.*

pietus. 5. *P. crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis cæruleis, cauda cuneata. Amæn. acad. 1. p. 2822 t. 13.*

*Phasianus variis coloribus splendidus. Edw. av. 688 t. 68. & t. 69. f. 2.*

*Phasianus aureus sinensis. Briss. av. 1. p. 271.*

*Phasianus ruber, e china. Alb. av. 3. p. 34. t. 36.*

*Habitat in China.*

*Calcaribus instructus. Genæ sub oculis nudæ.*

nycthemerus. 6. *P. albus, crista abdomineque nigris, cauda cuneata. Phasianus sinensis albus e nigro cæruleus. Alb. av. 3. p. 35. t. 37. Edw. av. 66. t. 66. Briss. av. 1. p. 276.*

*Habitat in China.*

*Tempora nuda, rubra. Maris crista nigra. Femina grisea est. Corpus album pennarum marginibus nigris. Calcaribus instructus.*

102. NUMIDA. *Caput collo comp.  
cornutum.*

275

7. 212.

*Palearia carunculacea, au  
maxillæ inferioris.*

*Rostrum cera instructum nares  
recipiente.*

Melea-  
gris.

1. NUMIDA. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 27.*

*Phasianus vertice calloso, temporibus carunculatis.  
Syst. nat. 10. p. 158.*

*Gallina vertice corneo. Hasselq. iter. 274.*

*Gallina africana. Marcgr. bras. 78.*

*Gallina guineensis. Aldr. orn. 2. p. 337. Will. orn.  
162. t. 26. Raj. av. 52. Worm. mus. 297. t. 297.  
Olear. mus. t. 15. f. 3. Alb. av. 2. p. 32. t. 35.*

*Peintade. Dodart. act. 3. p. 79. t. 47.*

*Habitat in Africa, mansuescit, cursitat sono scurrulo fre-  
quenti ingrato.*

*Pennæ colli a tergo reversæ sunt. Caruncula Maris  
cærulescens, Femina rubens*

103. TETRAO. *Macula prope oculos nuda, pa-  
pillofa.*

\* *Pedibus hirsutis.*

*Urogalus. 1. T. pedibus hirsutis, cauda rotundata, axillis albis,  
Fn. svec. 200. \**

*Urogallus. f. Tetrao major. Gesn. av. 491. Aldr.  
orn. 2. p. 59. t. 64, 65. Will. orn. 123. t. 30.  
Raj. av. 53.*

*Urogallus major. Briss. av. 1. p. 182. Frisch. av.  
t. 107.*

*Moscovian. Alb. av. 2. p. 28. t. 29, 30.*

β. *Tetrao Phasianellus. Syst. nat. 10. p. 160. femina.*

*Urogallus minor, cauda longiore. Edw. av. 117.  
t. 117.*

*Habitat in Europæ, Americæ sylvestris, pinetis, palu-  
dosis, vescitur baccis Juniperi, Vaccinii. Exæstuat in ar-  
bori-*



*Hæus*, efflans tinnitu tamquam ecstasi correptus. Pul-  
culicibus educantur. Nidi in terra ut *Séquenti*.

- . T. pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus  
secundariis basin versus albis. *Fn. svec.* 202. *Penn.*  
*brit. t. M.* 1, 2.

*Tetrax* 2. Tetrao f. Urogallus minor. *Gesn. av.* 494. *Aldr.*  
*orn.* 2. p. 67. t. 68. *Will. orn.* 124. t. 31. *Raj.*  
*av.* 53. *Alb. av.* 1. p. 22. t. 22.

Lagopus Urogallus minor. *Briss. av.* 1. p. 186. ♂  
4. app. 10.

*Habitat in Europæ frigida Ericetis, Betuletis, Syl-*  
*vosis. Exæstuat in campis, obmurmurans erecta cau-*  
*da tumidisque superciliis, sibilo efflans, dimicans;*  
*hyeme sæpe nive sepelitur; ova excludens odore pri-*  
*vatur. Occiditur Cerasis, Pisis. Pulli educantur Cu-*  
*licibus.*

*Cauda rectricibus XVIII: quarum 4 utrinque latera-*  
*les longiores extrorsum falcatae; intermediae 10, ob-*  
*tusæ, æquales, breviores rectricibus inferioribus albis.*

canaden- 3. T. pedibus hirsutis, rectricibus nigris apice fulvis,  
fis. lituris duabus albis ad oculos.

Urogallus maculatus canadensis. *Edw. av.* 118. t.  
118. mas. ♂ 71. t. 71. femina.

Bonasia freti hudsonis. *Briss. av.* 1. p. 201. app. 10.  
*Habitat in Canada.*

Lagopus. 4. T. pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris  
apice albis: intermediis albis. *Fn. svec.* 203. \*

Lagopus. *Gesn. av.* 577. *Aldr. orn.* 2. p. 143. t.  
147. *Will. orn.* 127. t. 32. *Raj. av.* 55. *Edw.*  
*av.* 72. t. 72. *Briss. av.* 1. p. 216. *Frisch. av. t.* 110.  
t. 111.

B. Lagopus varia. *Gesn. av.* 578. *Will. orn.* 127.

Lagopodis tertium genus. *Gesn. av.* 579.

*Habitat in Europæ alpinis, ex Betula nana victitans;*  
*in sylvis obambulans loquax; terrefactus cachinnos*  
*edit. Sub nive cuniculos agit. Pedes lanati leporis;*  
*hyeme albus exceptis rectricibus, ♂ rachi remigum*  
*primorum 6. Alpina varietas minor.*

Cupido. 5. T. pedibus hirsutis, alis succenturiatis cervicalibus.  
Urogallus minor fuscus, vertice plumis alas immi-  
tantibus donata. *Catesb. car.* 3. p. 1. t. 1.

Lagopus Attinga americana. *Briss. av. 1. p. 212.*

*Habitat in Virginia.*

Color *Tetricis feminae*; vertex *subcristatus*; a tergo colli duæ parvæ alæ: singulæ pennis quinque. Cauda fascia terminali nigra.

umbellus. 6. T. pedibus hirsutis, cervicali umbone exstante.

Urogallus collari extenso pensylvanicus. *Edw. av. 79. t. 248.*

Attagen pensylvaniæ. *Briss. av. 1. p. 214.*

*Habitat in Pennsylvania.*

anace. 7. T. pedibus hirsutis, cauda integra, macula alba pone nares auresque.

Bonasia canadensis. *Briss. av. 1. p. 203. t. 20. f. 1, 2.*  
*Habitat in Canada.*

gatus. 8. T. pedibus hirsutis, pennis axillaribus majoribus nigris azureis.

Lagopus Bonasia canadensis. *Briss. av. 1. p. 207. t. 21. f. 1.*

*Habitat in Canada.*

Pennæ pectoris laterales, quæ scapulas ambiunt, dum alæ complicantur, longiores & nitentes sunt.

naasia. 9. T. pedibus hirsutis, rectricibus cinereis punctis nigris fascia nigra: exceptis intermediis duabus. *Fn. Jvec. 170.*

Lagopus Bonasia. *Briss. av. 1. p. 191.*

Gallina corylorum. *Gesn. av. 229. Aldr. orn. 2. p. 80. t. 82. c. 11 Will. orn. 126. t. 21. Raj. av. 55.*

*Habitat in Europæ Coryletis, victitans amentis. Fistula dulce canit, volucrum dum decipit auceps; terra facta erigit pennas verticis.*

\* \* *Pedibus nudis.*

ncoli- 10. T. pedibus nudis calcaratis, abdomine gulaque atris, cauda cuneata.

Tetrao orientalis. *Hasselq. iter. 278. n. 43.*

Francolin. *Gesn. av. 228. Tournef. it. 1. p. 158 t. 158. Olin. av. 33. Edw. av. 75. t. 246.*



*Lagopus Francolinus.* Briss. av. 1. p. 245. t. 23. f. 2.

*Habitat in Italia, Oriente, Africa, Asia.*

*Pedes rubri calcaribus instructi. Supercilia subnuda, non papillosa: ciliis brevissimis. Remiges 1-4 breviores. Haselqu.*

**Alchata 11.** T. pedibus subhirsutis muticis, rectricibus duabus intermediis duplo longioribus subulatis.

*Alchata f. Filacotona.* Gesn. av. 311. t. 307. Aldr. orn. 2. p. 148, 501. Chartet. onom. 77. t. 77. Edw. av. 84. t. 249. Russel. alep. 64. t. 9.

*Bonasia pyrenaica.* Briss. av. 1. p. 195. t. 19.

*Habitat Monspeli, in Pyrenæis, Syria, Arabia.*

*Supercilia Gulaque nigra. Pectorale lunatum, latum fulvum nigro marginatum. Remiges primores cinereæ. Rectrices ferrugineæ albo margine. Cauda cuneiformis, lutea fasciis fuscis: Rectrices apice albo. Orbita oculorum nigra postice producta. Pedes antice hirsuti.*

**rufus. 12.** T. pedibus nudis calcaratis rostroque sanguineis, gull alba cincta fascia nigra albo punctata.

*Tetrao rectricibus cinereis, superiore medietate hinc inde rufis. Fn. svec. 171.*

*Perdix rufa f. major.* Gesn. av. 682. Jonst. av. 66. t. 27. Will. orn. 118. t. 29. Raj. av. 57. Alb. av. 1. p. 29. t. 29. Edw. av. 70. t. 70. Briss. av. p. 241. t. 23. f. 1.

*Habitat in Europa australiori, Archipelagi insulis.*

*Conf. Perdix rubra, barbarica, græca.* Briss. av. p. 238. an varietas?

*Calcarea obtusa mari.*

**Perdix. 13.** T. pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. H svec. 205. \*

*Perdix cinerea.* Aldr. orn. 2. p. 140. t. 141. Jonst. av. 68. t. 27. f. 1. Will. orn. 119. t. 29. Raj. av. 57. Alb. av. 1. p. 25. t. 27. Briss. av. 1. 219.

*Habitat in Europæ agris. Hyeme habitat intra frons nivis, utraque extremitate apertas.*

*Rostrum Pedesque pallidi. Area nuda sanguinea papillosa sub palpebra inferiore, pone oculos dubia. Facies lutescens. Pileus Collumque cinereo-undulatus.*

*ta. Rectrices XVIII. Remiges fuscae fasciis ferrugineis. Femina mutica. Mas calcaratus, sed obtuse.*

mexicana- 14. T. pedibus nudis muticis rostroque sanguineis, linea  
nus. superciliari.

*Perdix ludoviciana. Briss. av. 1. p. 258. t. 22. f. 2.*

*Colicucultu. Hern. mex. 19.*

*Habitat in Mexico, Ludovicia.*

bicalcara- 15. T. pedibus nudis bicalcaratis, superciliis nigris.  
tus. *Perdix senegalensis. Briss. av. 1. p. 231. t. 24. f. 1.*  
*Habitat in Senegal.*

*Linea nigra utrinque supra oculos, lineola alba divisa.*

*Tibiæ calcaribus 2, altero superius, altero inferius.*

virginia- 16. T. pedibus nudis, fascia nigra supra & infra ocu-  
nus. los, linea verticali fulva.

*Perdix virginiana. Catesb. car. 3. p. 12. t. 12. Briss.  
av. 1. p. 230.*

*Habitat in America.*

marilan- 17. T. pedibus nudis, superciliis albis, cervice albo  
dicus. nigroque punctata.

*Perdix novæ angliae. Alb. av. 1. p. 26. t. 28. Briss.  
av. 1. p. 229.*

*Habitat in America.*

*In Perdice rufa sunt puncta alba in disco nigro infra  
guttur versus pectus, in hac vero ejusmodi a tergo  
colli, nec pedes rubri.*

cristatus. 18. T. pedibus nudis muticis, crista dependente gulaque  
fulvis.

*Coturnix mexicana cristata. Briss. av. 1. p. 260. t.  
25 f. 2.*

*Coturnix indica Raj. av. 758.*

*Quauhtzonecolin. Hern. mex. 22.*

*Habitat in Mexico, Guiana.*

chinensis. 19. T. pedibus nudis muticis, corpore griseo macu-  
lato, jugulo nigro arcu albo.

*Coturnix chinensis. Edw. av. 77. t. 247.*

*Coturnix philippensis. Briss. av. 1. p. 254. t. 25.  
f. 7.*



*Habitat in China, Philippinis cum Coturnice, quem vivum portant chinenfes, ut hyeme manus calefaciant. Osb. iter. 190.*

Cotur. 20. T. pedibus nudis, corpore griseo-maculato, super-  
nix. ciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea. *Faun. svec. 205. \**

Coturnix. *Gesn av. 353. Aldr. orn. 2. p. 150. t. 153. Jonst. av. 69. t. 28. Raj. av. 58. Alb. av. 1. p. 28. t. 30.*

Tetrao israelitarum. *Hasselq. iter. 279. n. 44.*

Perdix Coturnix. *Briss. av. 1. p. 247.*

*Habitat in Europa, Asia, Africa. Visitat frumentorum, migrat ex Europa in Africam; primo vere lassâ recedit, capiturque in littore. Nocte tota clamat; esile Hellebori seminibus creditur convulsiones in cænis excitare.*

*Pennæ corporis ferruginæ linea longitudinali albida. Pedes mutici.*

VI. PASSERES.

*Rostrum conicum , acuminatum.*  
*Nares ovatae , patulae , nude.*

104. COLUMBA. *Rostrum rectum , versus apicem descendens.*

*Nares oblongae , membrana molli tumida semitectae.*

*Lingua integra.*

\* *Cauda aequali.*

Oenas. 1. *C. caerulescens , cervice viridi - nitente , dorso postico albo , fascia alarum apiceque caudae nigricante.*  
*Fn. svec. 207.*

Oenas s. Vinago. *Aldr. orn. 2. p. 497. Will. orn. 136. t. 35. Raj. av. 62. Alb. av. 3. p. 39. t. 42 , 44. Briss. av. 1. p. 86. Frisch. av. t. 139.*

domesti-  $\beta$ . *Columba domestica. Will. orn. 130. t. 32. Raj. av. ca. 59. Briss. av. 1. p. 68.*

*Habitat in Europa.*

*Domestica parit quovis mense pullos duos , per 9 partus annuos , quod intra 4 annos adscenderet ultra 18000 ; vetita melancholicis ; Antequam coeant prius osculantur ; intra ingluviem macerata grana in os pulli evomunt ; Mas  $\mathfrak{E}$  femina alternis vicibus incubant ; alterque alteram compellit.*

*a. Dorsum postice album. Remigum secundariarum tetrices primi  $\mathfrak{E}$  secundi ordinis in lateribus exteris medio macula nigra notatae.*

hispanica. 2. *C. cera albedo furfuracea.*

*Columba domestica major. Will. orn. 131. Raj. av. 60. n. 1. Briss. av. 1. p. 71.*

*Columba hispanica. It. wgoth. 8.*

*Habitat - - -*

*Duplo major C. domestica.*

dasypus. 3. *C. pedibus hirsuto - pennatis. Aldr. orn. 2. p. 466. 467 , 468. Briss. av. 1. p. 73.*



*Columba tympanizans.* *Frisch. av. t. 145.*  
*Habitat - - -*

gutturo- 4. *C. pectore inflato.*

fa. *Columba gutturosa.* *Will. orn. 121. t. 34. Raj. av. 60.*  
*Briss. av. 1. p. 78. Frisch. av. t. 146.*  
*Habitat in Arabia felici.*  
*Pectus inflat magnitudine corporis.*

cucullata. 5. *C. pennis occipitis reflexo-erectis.*

*Columba cucullata f. jacobæa.* *Raj. av. 60. Alb. av.*  
*3. p. 43. Frisch. av. t. 150. Briss. av. 1 p. 74.*  
*Columba anglica f. ruffica.* *Gesn. av. 279.*  
*Habitat - - -*  
*Rostrum brevissimum est.*

hispida. 6. *C. plumis minimis erectis, per dorsum alasque disperfis.*

*Columba pennis crispis.* *Aldr. orn. 2. p. 470. Briss.*  
*av. 1. p. 76.*  
*Habitat in India orientali.*

Turbita. 7. *C. pennis in pectore recurvatis.*

*Columba turbita dicta.* *Raj. av. 60. Will. orn. 132.*  
*Briss. av. 1. p. 75.*  
*Columba collo hirsuto.* *Frisch. av. 147.*  
*Habitat - - -*  
*Rostrum brevissimum. Vertex planiusculus. Pennæ pectoris utrinque reflexæ.*

laticauda. 8. *C. cauda erecta multipenni patula.*

*Columba tremula laticauda.* *Raj. av. 60.*  
*Columba caudata.* *Frisch. av. t. 151.*  
*Columba laticaudata.* *Briss. av. 1. p. 80.*  
*Habitat - - -*

gyratrix. 9. *C. sub volatu se gyrans.*

*Columba gyratrix f. vertaga.* *Will. orn. 132. Raj.*  
*av. 161. n. 10. Briss. av. 1. p. 79.*  
*Habitat - - -*  
*Columb. domestica paulo minor.*

galeata. 10. *C. capite remigibus rectricibusque concoloribus a corpore diversicoloribus.*

Columba galeata. *Will. orn.* 132. *Raj. av.* 61. n.  
11. *Briss. av.* 1. p. 80.

*Habitat* - - -

turcica. 11. *C. cera papillosa rubra.*

*Columba turcica* s. *persica.* *Will. orn. t.* 33. *Frisch.*  
*av. t.* 149. *Briss. av.* 1. p. 76.

*Habitat in Arabia.*

tabellaria. 12. *C. cera lata carunculata albida, palpebris nudis.*

*Columba equestris.* *Alb. av.* 2. p. 30. t. 45.

*Columba tabellaria.* *Raj. av.* 60. *Briss. av.* 1. p. 77.

*Habitat* - - -

*Longissime licet deportata festinanter domum redit, hinc  
olim literas affigerunt per cælum eunti nuncio.*

*Utrum antecedentes omnes species veræ distinctæ sint,  
aut varietates, docebit aliquando Anatomia.*

montana. 13. *C. orbitis nudis sanguineis, corpore rufo, subtus flavo.*

*Columba rufa cayanensis.* *Briss. av.* 1. p. 131. t. 12.  
f. 2.

*Columba minor fulva.* *Edw. av.* 119. t. 119. *Sloan.*  
*jam.* 2. p. 304. t. 261. f. 1.

*Perdix montana.* *Raj. av.* 183.

*Habitat in Jamaica, victitat baccis Myrtilli.*

*Macula alba sub oculis, gula ♂ ad axillas. Rostrum  
♂ Pedes rubri.*

leucoce- 14. *C. orbitis verticeque albis, corpore cærulescente.*

phala. *Columba capite albo.* *Sloan. jam.* 2. p. 303. t. 261.  
*Catesb. car.* 1. p. 25. t. 25.

*Columba minor leucocoryphos.* *Raj. av.* 184.

*Columba saxatilis jamaicensis.* *Briss. av.* 1. p. 137.

*Habitat in America septentrionali.*

*Remiges ♂ Rectrices fuscae. Rostrum basi rubrum*

leucopte- 15. *C. orbitis nudis cæruleis, rectricibus cinereis apice*  
ra. *albis: intermediis fuscis.*

*Turtur indicus fuscus.* *Edw. av.* 76. t. 76.

*Columba subfusca media, iride crocea, palpebris im-  
primis cæruleis.* *Brown. jam.* 468.

*Columba indica.* *Briss. av.* 1. p. 105.

*Habitat in Asia. Motitat caudam ut Motacilla Br.*

*Irides fulvæ. Pedes rubri.*



- guinea. 16. *C. orbitis nudis rubris, alis maculis albis triquetris, rectricibus apice nigris.*  
*Columba maculis triquetris. Edw. av. 75. t. 75.*  
*Columba guineensis. Briss. av. 1. p. 132.*  
*Habitat in Africa.*  
*Rostrum fuscum.*
- coronata. 17. *C. orbitis nigris, crista erecta, corpore cærulefcente, humeris ferrugineis.*  
*Columba indica, crista magna. Edw. av. 3. p. 269. t. 338. Pall. adumb. 78.*  
*Phasianus cristatus indicus. Briss. av. 1. p. 279. t. 26. f. 1.*  
*Habitat in Banda.*  
*Corpus cano - cærulefcent. Humeri ferruginei, cum sex pennis rectricum atris apice ferrugineis. Capitis crista amplissima, compressa, erecta: radiis discretis. Magnitudo fere Pavonis. Rostrum Pedesque fusci.*
- friata. 18. *C. orbitis lorisque candidis, corpore cinereo nigro fasciato, subtus rufo.*  
*Turtur indicus striatus. Briss. av. 1. p. 109. Edw. av. 16. t. 16.*  
*Habitat in India orientali.*  
*Latera cærulefcentia. Rectrices æquales lateralibus apice albis. Rostrum subfuscum.*
- Palumbus. 19. *C. rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utrinque albo.*  
*Faun. svec. 208. \**  
*Columba collo utrinque albo, postice macula fusca. Fn. svec. 1. n. 175.*  
*Palumbus torquatus. Aldr. orn. 2. p. 484. Will. orn. 135. t. 15. Raj. av. 62. Alb. av. 2. p. 42. t. 46. Frisch. av. t. 138. Briss. av. 1. p. 89.*  
*Habitat in Europa, Asia. Gregatim volant, agris satis infestæ. Ab exsiccatione Amnis Trojani in ejus impletionem, exulat in Ægypto. Pedes plumosi.*
- cyanoccephala. 20. *C. capite cæruleo, fascia suboculari alba.*  
*Turtur jamaicensis. Alb. av. 2. p. 45. t. 49. Briss. av. 1. p. 135. t. 13. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Gula etiam cærulescens.*  
*Rostrum basi, Pedes & un-*  
*gues rubri.*

madaga- 21. *C. pedibus plumosis, cauda violacea, corpore cæru-*  
scariensis. *leo-nigricante. Briss. av. 1. p. 140. t. 14. f. 1.*

*Habitat in Madagascar.*

*Rostrum Digitique rubri.*

ænea. 22. *C. pedibus plumosis, rostro pedibusque virescenti-*  
*bus, corpore æneo.*

*Palumbus moluccensis. Briss. av. 1. p. 148. t. 13.*  
*f. 2.*

*Habitat in Moluccis.*

*Rostrum & Pedes virescentes.*

viridis. 23. *C. ænea, corpore subtus purpureo-violaceo. Briss.*  
*av. 1. p. 152. t. 15. f. 2.*

*Habitat in Amboina.*

*Pedes rubent plumis semitecti. Br. Rostrum rubrum.*

martini- 24. *C. subviolacea, abdomine rufescente, remigibus in-*  
ca. *terius rufis. Briss. av. 1. p. 129. t. 12. f. 1.*

*Habitat in Martinica.*

*Palpebræ papillis coccineis. Rostrum Pedesque ru-*  
*bicundi.*

jamaicen- 25. *C. rectricibus cæruleis linea alba terminatis. Briss.*  
sis. *av. 1. p. 134.*

*Columba minor, ventre candido. Sloan. hist. 2. p. 303.*  
*t. 262. f. 1. Raj. av. 183.*

*Habitat in Jamaica.*

senega- 26. *C. rectricibus tribus extimis ultima medietate albis,*  
lenfis. *collo subtus nigro-maculato. Briss. av. 1. p. 125.*  
*t. 8. f. 3.*

*Habitat in Senegal.*

*Rostrum nigrum. Pedes rubri.*

nicobari- 27. *C. cauda alba, corpore nigro, remigibus cæruleis,*  
ca. *dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis.*

*Columba e nicombar. Alb. av. 3. p. 44. t. 47, 48.*

*Edw. av. t. 339. Briss. av. 1. p. 153, 154.*

*Habitat in insula Nicombar, prope Pegu indicum.*

*Rostrum Pedesque fusci.*



- finica. 28. *C. fusca nigro fasciata, abdomine subfanguineo, alis flavis, remigibus nigris, rostro nigro.*  
*Columba finica. Alb. av. 3. p. 43. t. 46.*  
*Turtur sinensis striatus. Briss. av. 1. p. 107.*  
*Habitat in China.*  
*Rostrum cærulescens. Pedes rubri.*
- indica. 29. *C. corpore purpureo, humeris viridibus, pileo cærulefcente.*  
*Columba alis viridibus. Edw. av. 14. t. 14.*  
*Palumbus amboinensis. Briss. av. 1. p. 150. t. 15. f. 1.*  
*Habitat in India orientali.*  
*Pileus cærulefcens. Remiges primores nigræ. Rectrices nigræ, sed laterales cinereæ apice nigro. Flexura alarum nigra, albo punctata. Cera cærulefcens. Rostrum Pedesque rubri.*
- canaden- 30. *C. remigibus primoribus apice flavicantibus, rectricibus subcinereis: extimis albis.*  
*Columba: Turtur jamaicensis. Briss. av. 1. p. 118. n. 21.*  
*Habitat in Canada.*  
*Rostrum fuscum. Pedes rubri.*
- afra. 31. *C. rectricibus extimis basi exteriori maculaque apicis albis, maculis tectricum alarum violaceo-azureis.*  
*Columba: Turtur senegalensis. Briss. av. 1. p. 122. t. 10. f. 1.*  
*Habitat in Senegal.*  
*Rostrum ♂ Pedes rubra.*
- Turtur. 32. *C. rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis.*  
*Turtur. Will. orn. 134. t. 35. Raj. av. 61. Alb. av. 2. p. 43. t. 47. Olin. av. 34. Frisch. av. t. 140. Briss. av. 1. p. 92.*  
*Habitat in India.*  
*Macula utrinque in collo ex 3 s. 4 lineolis, quæ factæ e pennis nigris apice albis.*  
*Rostrum fuscum. Pedes rubri.*

33. C.

---

*Collumbas ad Passeres nec ad Gallinas pertinere, docet monogamia, osculatio, incubatus alternus, nutritio pulli, Ova pauca, nidificatio, locus in altis.*

- risoria. 33. *C. supra lutescens*, lunula cervicali nigra.  
*Turtur indicus.* Aldr. orn. t. 15. c. 9. Will. orn. 134.  
*Raj. av. 61. n. 3. Alb. av. 3. p. 42. t. 45. Frisch.*  
*av. t. 141.*  
*Columba Turtur torquatus.* Briss. av. 1. p. 95.  
*Habitat in India, nobis communis Turtur.*  
*Pedes rubri. Rostrum fuscum.*
- passerina. 34. *C. rectricibus remigibusque obscurioribus*, corpore  
 purpurascente, rostro pedibusque flavis.  
*Turtur minimus guttatus.* Sloan. jam. 2. p. 305. t.  
 261. f. 3. Catesb. car. 1. p. 26. t. 26.  
*Turtur minimus*, alis maculosis. *Raj. av. 184. n. 25.*  
*Turtur barbadensis minimus.* *Raj. av. 62. n. 5. Will.*  
*orn. 135. t. 36.*  
*Turtur parvus americanus.* Briss. av. 1. p. 113. t.  
 9. f. 1.  
*Columba sylvestris minima brasiliensis.* *Raj. av. 62.*  
*n. 6.*  
*Picui pinima.* Mircgr. bras. 204.  
*Habitat in America inter tropicos.*  
*Alæ, extus in rectricibus, punctis s. maculis fuscis ad-*  
*spersæ.*
- minuta. 35. *C. fusca*, alis punctis 5 chalybeis, rectricibus exti-  
 mis apice albis.  
*Turtur parvulus fuscus americanus.* Briss. av. 1. p.  
 116. t. 8. f. 2.  
*Habitat in America.*  
*Pectus rufescens. Alæ subtus rufæ. Omnium mini-*  
*ma est.*
- \*\* *Macrouræ cauda cuneiformi.*
- migrato- 36. *C. cauda cuneata*, orbitis denudatis sanguineis, pe-  
 ria. ctore rufo.  
*Columba americana.* Frisch. av. t. 142. Kalm. act.  
 holm.  
*Columba ænas americana.* Briss. av. 1. p. 100.  
*Palumbus migratorius.* Catesb. car. 1. p. 23. t. 23.  
*Habitat in America septentrionali copiosissima, videtur*  
*fructibus Aceris, Ulmi, Mori, Nyssæ, Fagopyri,*  
*Fagi, Querci, Tritici, non Zeæ; hybernat in Ca-*  
*rolina.*



Collum cinereum aeneo - splendens. Pectus rufum.  
Cauda longitudine corporis. Rectrices 6, nigrae; reliquæ ex albido-cinereæ macula nigra, versus apicem albæ. Rostrum nigrum. Pedes rubri.

carolinensis.

37. *C. macroura*, cauda cuneata, orbitis cæruleis, subtus rufescens.

*Turtur carolinensis*. Catesb. car. 1. p. 24. t. 24.

Briss. av. 1. p. 110. t. 8. f. 1.

*Picacuroba*. Marcgr. bras. 204. Will. orn. 134.

Habitat in America.

Rostrum fuscum. Pedes rubri.

amboinensis.

38. *C. macroura*, cauda cuneata, corpore rufo, collo undulato-nigricante.

*Columba Turtur amboinensis*. Briss. av. 1. p. 127. t. 9. f. 3.

Habitat in Amboina.

Rostrum Pedesque rubra.

capensis.

39. *C. macroura*, cauda cuneata, remigibus primoribus latere interiore rufis.

*Turtur capitis b. spei*. Briss. av. 1. p. 120. t. 9. f. 2.

Habitat ad Cap. b. spei.

Corpus griseo-fuscum. Alæ macula chalybis splendentis. Maris jugulum atrum. Rostrum ♂ Pedes rubra.

marginata.

40. *C. macroura*, cauda cuneata, pectore rubro, rectricibus apice nigris albo marginatis.

*Columba cauda longa*. Edw. av. 15. t. 15.

*Turtur americanus*. Briss. av. 1. p. 102.

Habitat in America.

Macula fusca ad aures. Orbitæ Loraque alba. Pedes rubri. Rostrum cinereum.

105. **ALAUDA.** *Rostrum* cylindrico-fubulatum, re-  
ctum, recta protensum : Man-  
dibulis æqualibus, basi deor-  
sum dehifcentibus.

*Lingua* bifida.

*Unguis* posticus rectior, digito  
longior.

rvenfis. 1. A. reſtrictibus extimis duabus extrorſum longitudina-  
liter albis : intermediis interiori latere ferrugineis.

*Fn. ſvec.* 209. \*

Alauda non criſtata. *Gefn. av.* 78. *Aldr. orn.* 2. p.  
844. t. 845.

Alauda vulgaris. *Will. orn.* 149. t. 40. *Raj. av.*  
69. n. 1. *Alb. av.* 1. p. 39. t. 41. *Olin. av.* 12.  
*Briff. av.* 3. p. 335.

Alauda arborum. *Friſch. av.* 3. t. 15. f. 1.

Alauda cœlipeta. *Klein. av.* 71.

*Habitat in Europæ arvis apricis. Viſitans frugibus,*  
*inſectis, Formicis avis Volatu perpendiculari in æ-*  
*re ſuſpenſa cantillat in creatoris laudem : Ecce ſu-*  
*um tirile, tirile, ſuum tirile tractat ; Autumno ſo-*  
*le occidente in retia compellitur ; tum pingueſcit in*  
*auſtraliſſimis carne ſapidiffima unc. 12. Calculoſis*  
*noxia.*

pratenſis. 2. A. reſtrictibus extimis duabus extrorſum albis, linea  
ſuperciliorum alba. *Fn. ſvec.* 210. \*

Alauda pratorum. *Aldr. orn.* 2. p. 849. *Will. orn.*  
150. *Raj. av.* 69. n. 3.

Alauda pratenſis. *Alb. av.* 1. p. 38. t. 43. *Olin. av.*  
27. *Briff. av.* 3. p. 344.

Spipola altera. *Aldr. orn.* 2. p. 730. t. 731. *Will.*  
*orn.* 153, 171. n. 3. *Raj. av.* 80. n. 4.

*Habitat in Europæ pratis. ubi ſedens cantillat.*

borea. 3. A. capite vitta annulari alba cincto. *Faun. ſvec.*  
111. \*

Alauda reſtrictibus fufcis : prima oblique dimidiato-al-  
ba, ſecunda tertia quartaque macula alba cuneiformi.  
*Fn. ſvec.* 1. n. 192.



*Alauda arborea*, Will. orn. 149. Raj. av. 69. n. 2.  
 Olin. av. t. 27. Alb. av. 1. p. 40. t. 42. Briss.  
 av. 3. p. 340. t. 20. f. 1.  
*Habitat in Europa, gregaria volitans.*

campe- 4. *A. rectricibus fuscis: inferiori medietate, exceptis in-*  
 stris. termediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente. Faun. svec. 212. \*

*Alauda minor campestris* Will. orn. 150. Raj. av. 70. n. 6. Briss. av. 3. p. 349.

*Alauda novalium.* Frisch. av. t. 15.

*Glareana* (Pickerlin). Gesn. av. 795. Aldr. orn. 2. p. 736. Will. orn. 154. Raj. av. 81. n. 8.

trivialis. 5. *A. rectricibus fuscis: extima dimidiato alba, secundae apice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida.*

*Alauda minima locustæ voce.* Raj. av. 70. n. 7. Will. orn. 151. Frisch. av. t. 16.

*Alauda sepiaria.* Briss. av. 3. p. 347. Alb. av. 11. t. 44.

*Spipola* f. *Anthus.* Aldr. orn. 2. p. 750. t. 751.

*Habitat in Svecia, in arborum summitate inter volandum cantat.*

cristata. 6. *A. rectricibus nigris: extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato.*

*Alauda cristata major.* Raj. av. 69. n. 4. Will. orn. 151. t. 40. Olin. av. 13. Alb. av. 3. p. 48. t. 52. Aldr. orn. 2. p. 841. t. 842. Gesn. av. 18.

*Alauda sylvestris galerita.* Frisch. inf. t. 15.

*Habitat in Europæ viis.*

Spinolet- 7. *A. rectricibus fuscis: extimis duabus oblique dimi-*  
 ta diato albis. †

*Spinoletta florentinis.* Raj. av. 70. Will. orn. 152.

*Habitat in Italia.*

capensis 8. *A. rectricibus tribus lateralibus apice albis, gula lutea nigro marginata, superciliis flavis.*

*Alauda capitis b. spei.* Briss. av. 3. p. 364. t. 19. f. 3.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

Calandra. 9. *A. rectrice extima exterius tota alba, secunda tertiaque apice albis, fascia pectorali fusca.*

*Alauda major* f. *Calandra*. Briss. av. 3. p. 352. t. 20. f. 2.

*Alauda non cristata major*. Gesn. ic. 70.

*Calandra*. Gesn. av. 80. Aldr. orn. 2. 846. t. 847. Will. orn. 151. Olin. av. 30. Edw. av. 2. p. 122. t. 268.

*Tetrax parva*. Gesn. av. 650.

*Habitat in Pyrenæos.*

*Remiges secundariæ apice albæ. Collum a pectore distinguit fascia fusca. Rostrum reliquis crassius.*

*alpestris*. 10. *A. rectricibus dimidio interiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.*

*Alauda gutture flavo.* Catesb. car. 1. p. 32. t. 32.

*Alauda hyemalis* f. *nivalis*. Frisch. av. t. 16.

*Alauda virginiana*. Briss. av. 3. p. 367

*Habitat in America septentrionali, & visa a Kleinio Gedani.*

*Corpus supra fuscum. Guttur ad pectus usque flavum. Abdomen album. Pectorale transversum nigrum. Fascia nigra, obtusa, pone sinum oris.*

*magna*. 11. *A. subtus flava, fascia pectorali curva nigra; rectricibus tribus lateralibus albis.*

*Alauda magna*. Catesb. car. 1. p. 33. t. 33.

*Merula americana torquata*. Briss. av. 2. p. 242.

*Habitat in America, Africa.*

*Corpus scolopacinum, magnitudine Turdi, totum subtus flavissimum. Pectus macula magna, nigricante, lunari. Remiges fuscae: secundariæ testaceo maculatæ. Cauda rotundata: Rectrices 3 laterales maximam partem albæ. Unguis posticus pedum major, sed magis curvus, quam in reliquis. Rostrum rectum: Mandibula superior teretiuscula, basi nuda. Turdi Species. Briss.*



106. **STURNUS.** *Rostrum* subulatum, angulato-depressum, obtusiusculum : Mandibula superiore integerima, marginibus patentiusculis.

*Naves* supra marginatæ.

*Lingua* emarginata, acuta.

vulgaris. 1. *S. rostro* flavescente, corpore nigro punctis albis.

*Fn. svec. 213. \* Hasselq. it 284.*

*Sturnus. Gesn. av. 747. Bell. av. 81. a. Aldr. orn.*

*2. p. 631. Will. orn. 144. t. 37. Raj. av. 67. n.*

*1. Alb. av. 1. p. 38. t. 40. Olin. av. 18. Hasselq.*

*itin. 284. Briss. av. 2. p. 439.*

*Habitat in Europa, Africa, visitans Insectis, Lumbricis. Nidificat in cavis arborum; migrat in Scandiam; garrula, imitatrix; Mas nitens; gregaria avis, ex Europa migrat in Ægyptum; sæpius se lavat.*

capensis. 2. *S. nigricans*, capitis lateribus subtusque albus.

*Sturnus capitis b. spei. Briss. av. 2. p. 446. t. 41. f. 3.*

*Habitat ad Cap. b. spei. An varietas S. contræ?*

*Macula alarum & uropygium alba. Rostrum basi flavescens, apice rufescens. Pedes lutei.*

ludovicianus. 3. *S. griseo fuscoque maculatus*, linea capitis superciliisque albis, gula nigra.

*Sturnus ludovicianus. Briss. av. 2. p. 449. t. 41. f. 1.*

*Habitat in America.*

Contra. 4. *S. fuscus*, macula oculari fascia alari abdomineque albis.

*Icterus benghalensis. Briss. av. 2. p. 94.*

*Sturnus ex albo & fusco varius benghalensis. Edw.*

*av. 187. t. 187. Alb. av. 3. p. 20. t. 21.*

*Habitat in India; Cap. b. spei.*

Cinclus. 5. *S. niger*, pectore albo. *Faun. svec. 214.*

*Motacilla pectore albo pectore nigro. Faun. svec. 216.*

*Turdus aquaticus.* Gesn. av. 501.

*Merula aquatica.* Gesn. av. 608. t. 609. Aldr. orn. 2. p. 185. t. 486. Will. orn. 104. t. 24. Raj. av. 66. n. 7. Alb. av. 2. p. 36. t. 39. Briss. av. 5. p. 252.

*Habitat in Europa ad aquas : Hyeme ad cataraclas , fontesque non congelandos , ubi mire descendit per rapidas voragines voratura Oniscos aquaticos Insectaque alia : emergitque non palmipes ; hyeme solitaria , æstate plerumque gemina versatur. Mere insectivora nec granivora , naribus laminula fere clausis distincta a Motacillis , caudam motitat.*

7. **TURDUS.** *Rostrum tereti-cultratum : mandibula superiore apice deflexo , emarginato.*

*Nares nudæ , superne membranula femitectæ.*

*Faux ciliata.*

*Lingua lacero-emarginata.*

viscivo- 1. *T. dorso fusco , collo maculis albis , rostro flavescente.*  
rus. *Turdus viscivorus major.* Raj. av. 64. n. 1. Will. orn. 137.

*Turdus viscivorus.* Gesn. av. 759. t. 760. Aldr. orn. 2. p. 593. t. 582.

*Turdus viscivorus maximus.* Frisch. av. t. 25.

*Turdus major.* Briss. av. 2. p. 200.

*Turdus.* Olin. t. 25. Alb. av. 1. t. 33.

*Habitat in Europæ sylvis ; Sibimet ipsi malum cacæ disseminator Visci , Illicisque ; verno tempore e cacuminibus sylvarum egregie cantillat , cumque femina volitat. Pedes rostrique apex flavus.*

pilaris. 2. *T. rectricibus nigris : extimis margine interiore apice albicantibus , capite uropygioque cano.* Faun. svec. 215. \*

*Turdus pilaris.* Gesn. av. 753. Aldr. orn. 2. p. 595. t. 596. Will. orn. 138. t. 37. Raj. av. 64. n. 3. Alb. av. 1. p. 34. t. 36.



*Turdus medius*, pedibus nigris. *Frisch. av. 1. t. 33.*  
*Briss. av. 2. p. 214.*

*Habitat in Europæ sylvis acerosis, visitans baccas.*  
*Romani in ornithone maxima diligentia alebant Tur-*  
*dos, altilis reddebant, chare pendebant, teste Varr-*  
*one, Plutarcho. Nil melius Turdo, nil vulva puer-*  
*chius ampla. Horat. Autumno gregaria Gallos ad-*

iliacus.

3. *T. alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus.*  
*Fn. svec. 218. \**

*Turdus Ilias. Gesn. av. 760. t. 761. Aldr. orn. 2. p. 597. t. 598.*

*Turdus iliacus. Will. orn. 139. Raj. av. 64. n. 44.*  
*Klein. av. 66. Briss. av. 2. p. 208. t. 20. f. 1.*

*Turdus viscivorus maurus. Alb. av. 1. p. 31. t. 333.*

*Turdus minimus. Frisch. av. t. 28.*

*Habitat Europa, autumnno gregaria damnum infert uvis*  
*australiū B.*

*Cauda subbifida. Latera ♂ tectrices inferiores alarum*  
*rufæ.*

musicus. 4. *T. remigibus basi interiore ferrugineis. Faun. svec. 217.*

*Turdus simpliciter dictus viscivorus minor. Gesn.*  
*av. 762. Aldr. orn. 2. p. 599. t. 600. Will. orn.*  
*138. t. 37. Raj. av. 64. n. 2. Briss. av. 2. p. 203.*

*Turdus ordinarius. Alb. av. 1. p. 33. t. 34.*

*Turdus messanus. Olin. av. 25.*

*Habitat in Europæ sylvis; nido ex luto. Vespere ver-*  
*nali e summitate arboris Lusciniam cantilena imitatur;*

*Disseminator cum præcedentibus Juniperi.*

*Cauda subbifida.*

olivaceus. 5. *T. subfuscus, subtus fulvus.*

*Merula olivacea capitis b. spei. Briss. av. 2. p. 294.*  
*t. 22. f. 3.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

migrato-  
rius.

6. *T. griseus, abdomine rufo, palpebris albis, rectri-*  
*ce extima apice interiore albo.*

*Turdus pilaris migratorius. Catesb. car. 1. p. 29. t.*  
*29. Kalm. it. 3. p. 46.*

*Turdus canadensis. Briss. av. 2. p. 225.*

*Habitat in America septentrionali.*

Caput fuscum. Gula cinerascens. Macula utrinque inter oculos & rostrum alba. Orbitæ oculorum albæ. Rectrices inferiores alæ rubræ.

- ichas. 7. *T. olivaceus*, corpore subtus flavo, fascia oculari nigra.  
*Turdus luteus marilandicus*. *Edw. av. 5. p. 56. t. 237. f. 2.*  
*Ficedula marilandica*. *Briss. av. 3. p. 506.*  
*Avis marilandica*, gutture luteo. *Pet. gaz. t. 6. f. 1.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Area oculorum nigricans coit ad rostri basin superiorem.*
- norus. 8. *T. griseus*, subtus ferrugineus, linea alba ad latera capitis, cauda rotundata. *Amæn. acad. 4. p. 241.\**  
*Turdus chinensis*. *Osborn. iter. 309.*  
*Turdus fuscus benghalensis non maculatus*. *Edw. av. 184. t. 184.*  
*Merula benghalensis*. *Briss. av. 2. p. 260.*  
*Baniah bove benghala*. *Alb. av. 3. p. 18. t. 19.*  
*Habitat in Benghala, China.*
- us. 9. *T. ferrugineus* subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata, rectricibus rufis.  
*Turdus rufus*. *Catesb. car. 1. p. 28. t. 28.*  
*Turdus carolinensis*. *Briss. av. 2. p. 223.*  
*Habitat in America septentrionali & meridionali.*  
*Rectrices rufæ.*
- pyglot- 10. *T. obscure cinereus*, subtus pallido-cinereus, s. remigibus primoribus exteriore dimidio albis.  
*Turdus americanus minor sonans*. *Raj. av. 64. n. 5.*  
*Turdus minor cæruleo-albus immaculatus*. *Sloan. jam. 2. p. 306. t. 256. f. 3. Catesb. car. 1. p. 27. t. 27.*  
*Raj. av. 135. n. 31.*  
*Turdus mimus major*. *Briss. av. 2. p. 266.*  
*Mocking-bird*. *Kalm. itin. 2. p. 335.*  
*Habitat in Virginia, Carolina, jamaica.*  
*Eximia voce cantillat & cantu instruitur, volitando super arbusta imitatur omnium, quæ audit, animalium voces.*
- heus. 11. *T. dorso fusco*, pectore rectricibusque lateralibus albidis, superciliis albis. *Brown. jam. 469.*  
*Turdus cinereus minor*. *Edw. av. 78. t. 78.*



*Turdus mimus.* Briss. av. 2. p. 262.

*Avis polyglotta.* Will. orn. 305.

*Quadringentæ linguæ.* Raj. av. 159.

*Cencotlatolli.* Hern. mex. - - -

*Habitat in America; e terra elevatus cantilena spectat rem rapit in sui admirationem: nulla potest modum æquivalere tuis; perpendiculariter evolans cantum exaudit resonantium sylvarum echo.*

*Remiges obscure fuscae: secundariæ anteriores albæ cibus fuscis: Reliquæ fuscae albo terminatæ. Rectrices 1, 1 albæ; 2, 2 latere interiore albæ; reliquæ fuscae. Cauda longa, rotundata.*

plum-  
beus.

12. *T. cærulescens*, gula alba atropunctata, cauda neata.

*Turdus viscivorus plumbeus.* Catesb. car. 1. p. t. 30.

*Merula americana cinerea.* Briss. av. 2. p. 288.

*Merula Tilli.* Fervill. per. 126.

*Habitat in America.*

*Rostrum, Palpebræ, Pedes rubra. Palatum aurantius. Corpus cinereum. Gula alba lineolis nigris: summa magis albicans. Rectrices 4 exteriores utrinque albæ.*

nitens.

13. *T. viridis*: macula tectricum alarum violacea tida.

*Merula viridis angolensis.* Briss. av. 2. p. 311. t. f. 2.

*Habitat in Angola.*

sexatilis.

14. capite cæruleo, cauda ferruginea. Kram. aust.

*Turdus ruber*, capite cyaneo. Frisch. av. t. 32.

*Merula sexatilis minor.* Briss. av. 2. p. 240.

*Petrocosyphos.* Gesn. av. 767

*Habitat in Helvetiæ, Austriæ, Borussia montibus.*

*Corpus rufum maculis minutis fuscis. Rectrices exceptis summis apicibus & intermediis duabus fuscis.*

roseus.

15. *T. subincarnatus*, capite alis caudaque nigris, capite cristato. Fn. svec. 219. \*

*Merula rosea.* Aldr. orn. 2. p. 626. Will. orn.

Raj. av. 67. Edw. av. 20. t. 20. Briss. av. p. 250.

*Turdus roseus*, capite ex nigro cæruleo & cirrho retro compto, alis & cauda nigris. *Klein. av. 71.*  
*Habitat in Lapponia, Helvetia.*

cafer. 16. *T. nigricans subcristatus*, uropygio ventrequé albis, crisso rubro.

*Merula cristata* cap. b. spei. *Briss. av. 2. p. 257. t. 20. f. 2.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Cauda subcuneiformis: rectricibus apice albis.*

capensis. 17. *T. nigricans*, abdomine subflavescente, crisso luteo.

*Merula fusca* cap. b. spei. *Briss. av. 2. p. 259. t. 27. f. 3.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

atricapilla. 18. *T. nigricans*, capite atro, abdomine uropygioque rufis, macula alari alba.

*Merula atricapilla* capitis b. spei. *Briss. app. 47. t. 3. f. 2.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Latera abdominis strigis fuscis. Cauda cuneata: rectricibus apice albis.*

palmarum. 19. *T. viridi-olivaceus*, subtus subcinereus, capite nigro maculis utrinque tribus albis. *Briss. av. 2. p. 301. t. 29. f. 1, 2.*

*Habitat in Cayennæ Palmis.*

*Caput antice nigrum: macula alba una utrinque in fronte, insuper una supra & una sub oculis.*

sinensis. 20. *T. rufescens*, capite fusco striato, superciliis albis, rectricibus fuscis strigis obscurioribus, pedibus flavis.

*Turdus sinensis. Briss. av. 2. p. 221. t. 23. f. 1.*

*Habitat in China.*

dominicus. 21. *T. subfuscus*, subtus albus, remigibus primoribus basi albis, rectricibus tribus extimis albis.

*Merula dominicensis. Briss. av. 2. p. 284. t. 27. f. 1.*

*Habitat in Dominica.*

*Merula. 22. T. ater*, rostro palpebrisque fulvis. *Fn. svec. 220.\**

*Merula. Bell. av. 30. b. . Gesn. av. 603. Aldr. orn. 2. p. 602. t. 604, 605. Will. orn. 140. t. 37.*



*Raj. av. 65. n. 1. Alb. av. 1. 35. t. 37. Frisch. av. 27. f. 1, 2. Olin. av. 29.*

*Habitat in Europæ sylvis; Juniperi disseminator.*

*Femina fusca est. Pullus primo anno, etiam masculus, rostro nigro. Rostrum emarginatum non est.*

torqua- 23. *T. nigricans, torque albo, rostro flavesciente. Fu-*  
tus, *svec. 221. \**

*Merula torquata. Gesn. av. 607. Aldr. orn. 2. p. 620. t. 621, 622. Will. orn. 143. t. 37. Raj. av. 65. n. 2. Alb. av. 1. p. 37. t. 39. Frisch. av. 30. f. 1, 2. Briss. av. 2. p. 235.*

*Habitat in Europa.*

Cyanus. 24. *T. pennis margine cinereo-cæruleis, ore palpebris-*  
*que luteis.*

*Cyanus. Bell. ic. 79. Gesn. av. 806. Aldr. orn. 2. p. 618. t. 858. Raj. av. 66.*

*Merula solitaria. Edw. av. 1. p. 18. t. 18. Briss. av. 2. p. 282.*

*Turdus solitarius. Syst. nat. 10. p. 170. n. 5. Hasselq. act. ups. 1750. p. 21. \**

*Passer solitarius congener. Aldr. orn. 2. p. 617. Will. orn. 141.*

*Habitat in Italiæ, Cretæ rupibus.*

*Pennæ corporis fusæ, apice cinereo-cæruleo margine apicis albido.*

arundina- 25. *T. fusco ferrugineus, subtus albido testaceus, re-*  
ceus, *migibus fasciis apice rufescentibus.*

*Turdus musicus palustris dumetorum arundinum. Klein. av. 179. f. 3.*

*Turdus minor flavescens - fuscus, subtus albidus, cauda rotundata. Pall. adumb. 100.*

*Turdus arundinaceus. Briss. av. 2. p. 219. t. 22. f. 1.*

*Motacilla corpore subtus testaceo, supra testaceo rufescente. Kram. austr. 375.*

*Junco. Gesn. av. 573. Aldr. orn. 2. p. 487. Will. orn. 223. t. 58. Raj. av. 113. ♂ 47.*

*Habitat in Europæ arundinetis, scandit arundines more Pici, nidum in tribus arundinibus colligatis struit; perpetuo cantillat mas sub incubatu femine.*

*Minor reliquis europæis. Rostrum nigricans mandibula basi flava. Corpus flavescens s. cinereo-fus-*  
*scum*

*scum, versus caudam lutescens; subtus lutescente albidum. Gula alba. Remiges Pedesque fusci. Pallas.*

morio. 26. *T. ater nitens, remigibus primoribus rufis apice nigro. Merula capitis b. spei. Briss. av. 2. p. 309. t. 23. f. 2. Habitat ad Cap. b. spei.*

furina- 27. *T. ater nitens, vertice uropygio maculaque laterali mus. pectoris luteis. Merula furinamensis. Briss. app. 46. t. 3. f. 1. Habitat Surinami. Humeri albi sunt.*

zeylonus. 28. *T. viridis, subtus luteus, linea oculari utrinque in pectus nigrum ducta. Merula torquata capitis b. spei. Briss. av. 2. p. 299. t. 30. f. 1. Pica viridis insulæ ceylon. Edw. av. 3. p. 237. t. 321. Habitat in Zeylona; in Cap. b. spei? Rostrum sub apice utrinque argute emarginatum.*

108. AMPELIS. *Rostrum rectum, convexum: Mandibula superiore longiore, subincurvata, utrinque emarginata. Lingua acuta, cartilaginea, bifida.*

Garrulus. 1. *A. occipite cristato, remigibus secundariis apice membranaceo colorato.*

*Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. Faun. svec. 1. n. p. 179. \**

*Lanius Garrulus. Fn. svec. 2. n. 82. \* Zool. brit. t. C. f. 1.*

*Garrulus bohemicus. Gesn. av. 703. Aldr. orn. 1. p. 796. t. 798. Calc. mus. 674. t. 675. Will. orn. 20. t. 20. Raj. av. 85. Alb. av. 2. p. 25. t. 26. Frisch. av. t. 32. f. 1.*

*Bombycilla bohémica. Briss. av. 2. p. 333.*

*β. Bombycilla carolinensis. Briss. av. 2. p. 337.*



*Garrulus carolinensis* Catesb. car. 1. p. 46. t. 46.  
Edw. av. 66. t. 242.

*Avis americana cristata*. Seb. mus. 2. t. 65. f. 5.

*Caquantototl*. Hern. mex. 55. Raj. av. 174.

*Habitat in Europa & America septentrionali, nidificat in Alpibus, Viſitat baccis Sorbi, Juniperi.*

Pompa- 2. *A. purpurea*, tectricibus alarum proximis ensiformi-  
dora. bus elongatis carinatis rigidis.

*Turdus puniceus*. Pallas. adumbr. 99.

*Cotinga purpurea*. Briss. av. 2. p. 347. t. 35. f. 1.

Pompadour. Edw. av. 3. p. 275. t. 341.

*Habitat in America meridionali: Cayana.*

Confer. *Cotinga cinereo-purpurea*. Briss. av. 2. p. 349. t. 35. f. 2.

carnifex. 3. *A. ruber*, fascia oculari remigum rectricumque apicibus nigris.

*Lanius carnifex*. Syst. nat. 10. p. 94. n. 5.

*Cotinga rubra*. Briss. av. 2. p. 351.

*Garrulus ruber surinamensis*. Edw. av. 39. t. 39.

*Avicula Pipitzon*. Seb. mus. 1. t. 57. f. 4.

*Habitat Surinami.*

Cotinga. 4. *A. nitidissima cærulea*, subtus purpurea, alis caudaque nigris.

*Cotinga*. Briss. av. 2. p. 340. t. 34. f. 1.

*Parus cæruleus*, pectore purpureo. Edw. av. 65. t. 241, 340.

*Habitat in Brasilia.*

*Avis pulcherrima, nitidissima.*

Mayna- 5. *A. nitida cærulea*, gula violacea.

na. *Cotinga mayanensis*. Briss. av. 2. p. 341. t. 34. f. 2.

*Habitat in Mayanensi regione.*

*Pennæ capitis collique strictissimæ.*

cayana. 6. *A. nitida cærulea*, collo subtus violaceo.

*Cotinga cayanensis*. Briss. av. 2. p. 344. t. 24. f. 3.

*Habitat in Brasilia, Cayana.*

*Pennæ corporis nigræ, margine exteriori cæruleæ.*

terfa. 7. *A. nitida cærulea*, dorso nigro, abdomine albo-flavescente.

*Habitat* . . . .

Nigra Caput supra, humeri, remiges, rectrices. Dilute cærulea Gula, Pectus, Dorsum posticum, fascia rectricum alarum. Abdomen albo-flavescentis lateribus magis maculatis. Margo exterior remigum cærulescens.

109. LOXIA. Rostrum conico-gibbum, frontis basi rotundatum versus caput: Mandibula inferior margine laterali inflexa.

Nares in basi rostri.

Lingua integra.

Curviro- 1. L. rostro forficato. *Faun. svec. 224. \**

stra.

Loxia. *Gesn. av. 592. Aldr. orn. 1. p. 877. t. 878.*

*Charl. onom. 68. t. 68. Will. ornith. 181. t. 44.*

*Raj. av. 86. Alb. orn. 1. p. 58. t. 61. Frisch,*

*av. 2. t. 11. f. 3, 4. Edw. av. t. 303. Briss.*

*av. 3. p. 329. t. 17. f. 3.*

*Habitat in Europæ Abietis, strobilos enucleans, at non in ipsa arbore, disseminator Abietis rostro singulari.*

Cocco- 2. L. linea alarum alba, remigibus mediis apice rhom-  
thraustes. beis, rectricibus latere tenuiore baseos nigris. *Faun.*

*svec. 222. It. scan. 332. \**

Coccothraustes. *Gesn. av. 276. Aldr. orn. 2. p.*

*645. t. 646. Jonst. av. - - - t. 37. Charlet.*

*onom. 84. t. 85. Frisch. av. t. 4. Olin. av. 37.*

*Raj. av. 85. Alb. orn. 1. p. 54. t. 56. Edw. av.*

*188. Frisch. av. 1. t. 4. f. 2, 3. Briss. av. 3.*

*p. 219.*

*Habitat in Europa australiori, Cerasa enucleans, disseminans, hortis invisa.*

Enuclea- 3. L. linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigri-  
tor. cantibus. *Faun. svec 223. \** *Schænb. act. holm.*

*1757. p. 139.*

Rubi-

*Mandibula utraque mobilis in Loxia, Emberiza, Fringilla, unde semina decorticantur, nec integra deglutiuntur. Kram. 365.*



*Rubicilla maxima canadensis.* *Edw. av. 123. t. 123, 124.*

*Coccothraustes canadensis.* *Briss. av. 3. p. 250. t. 12. f. 3.*

*Habitat in Sveciæ summæ & Canadæ Pinetis, visitans strobilis; disseminator Pini. Noctu tota egregie summeque canorus; migrat hyeme ad australes Sveciæ provincias; Upsaliam transit fine octobris. Junior ruber, Senior flavus.*

**Pyrrhula. 4.** *L. artubus nigris, tectricibus caudæ remigumque posticarum albis.* *Faun. svec. 225. \**

*Rubicilla s. Pyrrhula.* *Gesn. av. 733. Aldr. orn. 2. p. 744. t. 745. Jonst. av. - - - t. 43. Will. orn. 130. t. 43. Raj. av. 86. Alb. orn. 1. t. 59, 60. Frisch. av. - - - t. 2. f. 1, 2. Olin. av. 40. Briss. av. 3. p. 308.*

*Habitat in Europæ sylvis, Sorbi disseminator. Mas subtus ruber, Femina subtus fusco-cinerea.*

**Cardinalis. 5.** *L. cristata rubra, capistro nigro, rostro pedibusque sanguineis.* *Amen. acad. 4. p. 242. \**

*Cardinalis.* *Will. orn. 245. t. 44. f. 8.*

*Coccothraustes capensis ruber, rostro hiante.* *Pet. gaz. 16. t. 16. f. 7.*

*Coccothraustes rubra.* *Catesb. car. 1. p. 38. t. 38. Frisch. orn. 1. t. 4. f. 1.*

*Coccothraustes indica cristata.* *Alb. orn. 1. p. 55. t. 57. & 3. t. 61. Raj. av. 85. Jonst. av. 77. t. 37. Will. orn. 179. t. 44.*

*Coccothraustes virginiana Cardinalis dicta.* *Briss. av. 3. p. 252.*

*Psittacus cristatus ruber.* *Seb. mus. 1. p. 96. t. 60. f. 4.*

*Avis rubra.* *Kalm. it. 3. p. 31.*

*Habitat in America septentrionali; visitat Zea, Fagopyro, Apibus.*

**madagascariensis. 6.** *L. rubra, fascia oculari nigra, dorso nigricante-maculato.*

*Cardinalis madagascariensis.* *Briss. av. 3. p. 112. t. 6. f. 2.*

*Habitat in Madagascar.*

**mexicana. 7.** *L. rubra, alis caudaque nigris.*

*Coccothraustes mexicana.* *Briss. av. 3. p. 256.*

*Avis mexicana rubra.* *Seb. mus. 1. p. 101. t. 105. f. 1.*  
*Habitat in America australi.*

Domini- 8. *L. nigra*, capite gulaque coccineis, pectore abdomi-  
 cana. ne remigumque margine albis. *Amæn. acad. 4. p.*  
*242. \**

*Rubicilla americana.* *Will. orn. 180. Raj. av. 86.*

*Cardinalis dominicanus.* *Edw. av. 127. t. 127.*

*Coccothraustes brasiliensis.* *Briss. av. 3. p. 246.*

*Gviratrica.* *Marcgr. bras. 211.*

*Habitat in Brasilia.*

*Conf. Cardinalis dominicanus.* *Briss. av. 3. p. 116.*  
*t. 6. f. 4.*

*Tije-guacu-paroata.* *Marcgr. bras. 214. Raj.*  
*av. 89.*

cristata. 9. *L. albicans*, fronte cristata, uropygio pedibusque ru-  
 bris, rectricibus intermediis longissimis.

*Habitat in Æthiopia.* *J. Burmannus.*

*Avis inter maximas sui generis. Crista Maris rubra,*  
*Feminae alba. Pectus in mare rubrum. Rectrices*  
*cinereae: intermediae duae duplo longiores.*

erythroce- 10. *L. cinerascens*, capite purpurascente, pectore albo  
 phala. maculato.

*Cardinalis angolensis.* *Briss. av. 4. app. 78.*

*Passer paraditæus*, capite rubro, pectore nigro albo  
 maculato. *Edw. av. 180. t. 180.*

*Habitat in Africa.*

Maja. 11. *L. fusca*, capite albo.

*Coccothraustes malaccensis.* *Edw. av. 2. p. 204. t.*  
*306. f. 1.*

*Maja sinensis.* *Briss. av. 3. p. 212. t. 9. f. 1.*

*Habitat in India orientali.*

Colius. 12. *L. cauda longissima cuneiformi: rectricibus extimis*  
*externe albis, corpore cinereo, subtus albido.*

*Colius capitis b. spei.* *Briss. av. 3. p. 304. t. 6. f. 2.*

*Habitat in Cap. b. spei.*

*Corpus supra cinereum, griseo maculatum; subtus to-*  
*tum fuscum maculis albis rotundis. Alæ fuscae.*

*Remiges margine griseae. Cauda nigra, forficata.*

*Caput purpureum.*



flavicans. 13. *L. flava*, dorso virescente, capite fulvo. *Amæn. acad.* 4. p. 244. \*  
*Habitat in Asia.*

oryzivo-14. *L. fusca*, temporibus albis, rostro rubro. *Amæn. ra. acad.* 4. p. 243. \*  
*Loxia remigibus rectricibusque nigris. Mus. Ad. Fr.*  
*1. p. 18.*  
*Coccothraustes finensis cinerea. Briss. av. 3. p. 244.*  
*1. 11. f. 4.*  
*Fringilla capite & gula nigra, temporibus albis. Osb. itin.* 103.  
*Oryzivora. Edw. av. 41. t. 41, 42.*  
*Passer indicus. Aldr. orn. l. 15. c. 24.*  
*Habitat in Asia & Æthiopia inter Oryzam.*

panicivo-15. *L. nigra*, alula alba, rostro incarnato.  
*ra. Fringilla nigra. Alb. av. 3. p. 65. t. 69.*  
*Pyrrhula africana nigra. Briss. av. 3. p. 317.*  
*Habitat in India*  
*An præcedentis Femina?*

malacca. 16. *L. ferruginea*, capite abdomineque nigris, rostro cæruleo.  
*Coccothraustes javensis. Briss. av. 3. p. 237. t. 13.*  
*f. 1. Alb. av. 2. p. 34. t. 53.*  
*Passer chinensis, albo pectore. Edw. av. 301. t. 355.*  
*♂ 43. t. 43.*  
*β. Coccothraustes finensis. Briss. av. 3. p. 235.*  
*Habitat in China, Java, Malacca,*  
*Dorsum, Alæ, Cauda ferrugineo-rufa. Pectus & hypochondria alba; Reliqua nigra.*

molucca. 17. *L. fuscescens*, capite jugulo rectricibusque nigris, subtus albo nigroque undulata.  
*Coccothraustes moluccensis. Briss. av. 3. p. 241. t. 13. f. 3.*  
*Habitat in Moluccis.*

punctula-18. *L. ferruginea*, abdomine nigro albo-maculato.  
*ta. Passer indicus fuscus, ventre ex albo & nigro punctato. Edw. av. 40. t. 40.*  
*Coccothraustes javensis nævia. Briss. av. 3. p. 239.*  
*t. 13. f. 2.*  
*Habitat in Asia.*

- hordea- 19. *L. fulva*, temporibus albis, cauda pectoreque atris.  
cea. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 29. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus magnitudine Motacillæ albae. Grisea sunt Hu-*  
*meri, Femora, Ani regio, margines Rectricum.*  
*Nigra sunt Tempora ad rostrum usque, Alæ &*  
*Remiges, Cauda & Rectrices, Pectus. Fulva sunt*  
*Caput, Collum, Uropygium.*
- sanguini- 20. *L. grisea*, subtus alba, rostro pedibusque sanguineis.  
rostris. *Amæn. acad. 4. p. 243. \**  
*Habitat in Asia.*  
*Conf. Edw. av. 2. p. 128. t. 271. f. 2. sed subtus ma-*  
*culata non mea.*
- Astrild. 21. *L. grisea fusco-undulata*, rostro orbitis pectoreque  
coccineis.  
*Waxbill. Edw. av. 179. t. 179. & t. 354.*  
*Senegallus striatus. Briss. av. 3. p. 210. t. 10. f. 5.*  
*Fringilla undulata. Pallas adumb. 143.*  
*Habitat in Canariis, America, Africa, ut & in Sene-*  
*gallia, Cap. b. spei, Surinamo.*  
*Magnitudo Reguli; supra grisea, fusco undulata; sub-*  
*tus pectore purpurea. Cauda rotundata, grisea li-*  
*neolis transversis fuscis numerosis. Rostrum cocci-*  
*neum, gibbum. Fascia coccinea per oculos ducta.*
- cyanea. 22. *L. cærulea*, remigibus rectricibusque nigris. *Amæn.*  
*acad. 4. p. 244. \**  
*Coccothraustes cæruleus. Edw. av. 125. t. 125.*  
*Coccothraustes angolensis cyanea. Briss. app. 88.*  
*Habitat in Angola.*  
*Rostrum pallidum. Pedes nigri.*
- virens. 23. *L. virens*, humeris cæruleis.  
*Habitat in Surinamo.*  
*Corpus virens. Tectrices in humeris alarum cæruleæ.*  
*Remiges Rectricesque nigrae, sed margine exteriori,*  
*quo conspicuæ apparent, virentes.*
- angolen- 24. *L. nigro-cærulea*, ventre ferrugineo, macula alarum  
lis. alba.  
*Coccothrauster niger. Edw. av. 296. t. 352. f. 2.*  
*Habitat in Angola.*  
*Pedes incarnati. Rostrum fuscum.*



Lineola. 25. *L. nigra*, linea frontali temporibusque albis.

*Habitat in Asia.*

Corpus Magnitudine Pari; supra nigrum, e caeruleo nitidum; subtus album. Rostrum nigrum, gibbum.

Linea a fronte ad verticem ducta alba. Macula alba supra mandibulam superiorem. Remiges nigrae: Primores basi anteriore albæ, unde macula alarum alba. Cauda nigra, bifurcata.

mexicana. 26. *L. grisea*, fronte gula uropygio superciliisque luteis. *Linaria mexicana*, capite flavo. *Edw. av. 44. t. 44.*

*Passer mexicanus. Briss. av. 3. p. 97.*

*Habitat in America. Mus. De Geer.*

Magnitudo *Fringillæ*. Fasciæ duæ cinerascensque inter rectricibus alarum. Cauda integra.

Chloris. 27. *L. flavicanti-virens*, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. *Faun. svec. 226. \**

Chloris. *Gesn. av. 259. Will. orn. 129. Raj. av. 85. n. 4. Alb. av. 1. p. 56. t. 58. Frisch. av. t. 2. f. 3, 4. Aldr. orn. 2. p. 850. Briss. av. 3. p. 190.*

*Anthus s. Florus. Gesn. av. 165. Aldr. orn. 2. p. 750. Will. orn. 180. ♂ 171. n. 8. Raj. av. 81. n. 9.*

*Habitat in Europa, nonnihil canora.*

*Media quasi inter Loxias & Emberizas, sed rostrum crassius quam in Emberizis.*

butyracea. 28. *L. virescens*, fronte superciliis pectore abdomineque flavis, cauda apice alba.

*Habitat in India.*

Corpus magnitudine & figura *Ligurini*, viride, fusco maculatum; subtus totum flavum. Frons & inde lineæ supra oculos flava. Tempora flava. Cauda nigricans, bifurca, apice alba.

canadensis. 29. *L. viridi-olivacea*, subtus flavo-olivacea, capistro nigro.

*Coccothraustes canadensis. Briss. av. 3. p. 229. t. 11. f. 3.*

*Habitat in Canada.*

fulphura- 30. *L. fusco-olivacea*, gutture ventreque luteis, super-  
ta. ciliis flavis.

*Coccothraustes capitis b. spei. Briss. av. 3. p. 225.*  
*t. II. f. 1.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

Collaria. 31. *L. flavescens*, pectore collarique flavis, temporibus  
nigris.

*Habitat in Indiis.*

*Rostrum nigrum. Pedes fuscii. Frons calva. Genæ*  
*nigræ. Pectus ♂ ferme Collare flava. Corpus vi-*  
*ridi-flavescens, magnitudine Pari minimi.*

bengha- 32. *L. grisea*, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine  
lenfis. albido fusco-maculato.

*Passer benghalensis, capite flavo. Edw. av. 189. t.*  
*189. Alb. av. 2. p. 48. t. 52.*

*Passer benghalensis. Briss. av. 3. p. 95.*

*Habitat in Benghala.*

malabari- 33. *L. cinerea*, remigibus rectricibusque nigris, gula cris-  
ca. soque albis.

*Habitat in Indiis.*

*Corpus magnitudine ♂ facie Pari. Rostrum nigrum.*  
*Gula alba. Remiges ♂ Rectrices nigræ. Ani re-*  
*gio albida.*

melano- 34. *L. lutea*, capite atro.

cephala. *Coccothraustes gambogia. Alb. av. 3. p. 58. t. 62.*

*Briss. av. 3. p. 319.*

*Habitat in Guinea.*

cana. 35. *L. cana*, remigibus rectricibusque fuscis, pedibus  
rubris.

*Linaria cinerea orientalis. Edw. av. 179. t. 179. f. 1.*

*Fringilla cinerea indica. Briss. app. 83.*

*Habitat in Asia.*

*Margines rectricum ♂ oris regio albida.*

philippi- 36. *L. fusca*, subtus albido-flavicans, vertice pectore-  
na. que luteis, gula fusca.

*Coccothraustes philippensis. Briss. av. 3. p. 232. t.*  
*12. f. 1.*



*Habitat in Philippinis. Nido sacciformi pendente, basi cylindrica aperta, e foliorum fibrillis intertexto. vide Briss. av. 3. t. 18.*

- striata. 37. *L. fusca ferrugineo striata, subtus alba, jugulo nigro. Coccythraustes borbonica. Briss. av. 3. p. 243. t. 13. f. 4. Habitat in Borbonica insula. Pennæ superiores fuscae scapo ferrugineo.*

- ludovici- 38. *L. nigra, pectore ventre alarum fascia basique remi-  
ana. gum albis. Coccythraustes ludoviciana. Briss. av. 3. p. 247. t. 12. f. 2. Habitat in Ludoviciana. Remiges Primores a basi ad medium albæ. Secundariæ macula alba versus apicem anteriorem. Rectrices tres laterales latere anteriore albo. Jugulum purpurascens.*

- capensis. 39. *L. atra, uropygio tectricibusque alarum luteis. Fringilla capitis b. spei. Briss. av. 3. p. 171. t. 16. f. 1. Habitat ad Caput b. spei.*

- nigra. 40. *L. nigra, macula alba humeri basique remigum duarum exteriorum. Rubicilla minor nigra. Catesb. car. p. 68. t. 68. Alb. av. 3. p. 65. t. 69. Pyrrhula mexicana nigra. Briss. av. 3. p. 316. Habitat in America australi.*

- cærulea. 41. *L. cærulea, alis fuscis fascia bascos purpurea. Coccythraustes cærulea. Catesb. car. 1. p. 39. t. 39. Pyrrhula carolinensis cærulea, Briss. av. 3. p. 323. Habitat in America.*

- madaga- 42. *L. cærulea, subtus alba, capistro nigro. scarina. Lanius madagascariensis cæruleus. Briss. av. 2. p. 197. t. 16. f. 3. Habitat in Madagascar.*

- violacea. 43. *L. violacea, superciliis gula crissoque rubris. Coccythraustes purpurea. Catesb. car. 1. p. 40. t. 40.*

*Pyrrhula bahamensis violacea.* *Briss. av. 3. p. 326.*  
*Habitat in America*

- grossa. 44. *L. cano-cærulescens*, jugulo rectricibusque atris,  
 gula alba, rostro rubro.  
*Coccothraustes americana cærulea.* *Briss. app. 89. t.*  
*5. f. 1.*  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo L. Cardinalis.*
- minima. 45. *L. fusca*, subtus testacea, remigibus primoribus basi,  
 secundariis posterius albis.  
*Habitat in Surinamo.*  
*Corpus Paro minus, valde minutum. Rostrum bre-*  
*vissimum, crassum. Remiges primores basi utrinque*  
*albæ; Secundariæ versus basin, interiori latere al-*  
*bæ. Rectrices æquales, apice obsolete pallidæ, acu-*  
*tiusculæ.*
- fusca. 46. *L. fusca*, subtus albida, remigibus a tertia ad nonam  
 basi omnino albis. *Amæn. acad. 4. p. 244. \**  
*Loxia africana nigra minor.* *Briss. av. 3. p. 319. t.*  
*17. f. 1.*  
*Habitat in Africa, inque Benghala.*
- minuta. 47. *L. grisea*, uropygio subtusque ferruginea, remigibus  
 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra. *Ro-*  
*lander.*  
*Habitat Surinami.*  
*Avicula vix Regulo major; Rostrum breve, crassum,*  
*subobtusum.*
- bicolor. 48. *L. fusca*, subtus rubra.  
*Rubicilla fusca, minima.* *Edw. av. 83. t. 83. f. 1.*  
*Fringilla rubra minor.* *Briss. av. 3. p. 164.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo L. minutæ.*



110. EMBERIZA. *Rostrum* conicum.

*Mandibulæ* basi deorsum a se invicem discedentes: inferiore lateribus inflexo-coarctata, superiore angustiore.

nivalis. 1. *E. remigibus* albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis. *Faun. svec.* 227. t. 1. \*

*Alauda remigibus* albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis. *Act. Stokh.* 1740. p. 368. t. 1. f. 9. \* *Fn. svec.* 1. n. 194. t. 1. f. 194.

Pied-Chaffinch. *Alb. av.* 2. p. 50. t. 54. ♂ 3. p. 67. t. 71.

*Avis ignota piperini.* *Gesn. av.* 798.

*Fringilla albicans.* *Aldr. orn.* 2. p. 817. t. 818.

*Montifringilla calcaribus alaudæ.* *Will. orn.* 187. t. 77. *Raj. av.* 88.

*Miliaria nivis.* *Frisch. av.* 2. t. 6. f. 1, 2.

*Hortulanus nivalis.* *Briss. av.* 3. p. 285.

*Avis nivis.* *Mart. spitsb.* 53. t. K. f. B. *Edw. av.* 126. t. 126.

*Habitat in alpibus Lapponiæ, Spitsbergæ ad sinum Hudsonis alibique, terræ insidens; intensiore hyeme ad nos migrans; avena nutritur, Sapidissima; hyeme alba; noctu vigil.*

hyemalis. 2. *E. nigra*, ventre albo.

*Fringilla hyemalis.* *Syst. nat.* 10. p. 183.

*Passer nivalis.* *Catesb. car.* 1. p. 36. t. 36. *Kalm.* it. 3. p. 39.

*Habitat in America septentrionali.*

*Hanc solam varietatem E. nivalis esse mihi minime videtur.*

*Miliaria.* 3. *E. grisea*, subtus nigro-maculata, orbitis rufis. *Faun. svec.* 228. \* *It. scan.* 292. t. 4. \*

*Emberiza pectore albo-ochreo punctis nigris maculato.* *Kram. aust.* 371.

*Emberiza alba.* *Gesn. av.* 564. *Aldr. orn.* 2. p. 571.

*Raj. av.* 93. *Will. orn.* 195. t. 40. *Alb. av.* 2. p. 46. t. 50. *Olin. av.* 50.

Alaudæ congener. *Aldr. orn. 2. p. 849. t. 850.*

Miliaria cana. *Frisch. av. - - t. 6. f. 4.*

Cynchramus. *Aldr. orn. 2. p. 177. Briss. av. 3. p. 892.*

*Habitat in Europa.*

*Præcedenti valde affinis.*

Hortula 4. E. remigibus nigris: primis tribus margine albidis, rectricibus nigris: lateralibus duabus extrorsum nigris.

*Fn. svec. 229. \**

Hortulanus. *Gesn. av. 569. Aldr. orn. 2. p. 178.*

*Jonst. av. 49. t. 37. Will. orn. 197. t. 40. Raj.*

*av. 94. n. 6. Olin. av. 22. Alb. av. 2. t. 50. Briss.*

*av. 3. p. 269.*

Miliaria pinguescens. *Frisch. av. 2. t. 5. f. 3, 4.*

*Habitat in Europa. Victitat præcipue Panico, supra modum pinguescit; cavea inclusa noctu cantat.*

Oculorum orbitæ s. palpebræ nudæ flavæ, ut oculi annulo flavo cingantur nudo, & Caput virescens, ad maxillam inferiorem flavum.

Citrinel- 5. E. rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuta. *Fn. svec. 230. \**

Emberiza flava. *Gesn. av. 653. Will. orn. 196. t.*

*40. Raj. av. 93. n. 2. Alb. av. 1. p. 63. t. 66. Briss.*

*av. 3. p. 258.*

Luteæ alterum genus. *Aldr. orn. 2. p. 856. t. 857, 858.*

Gelgorita. *Gesn. av. 653.*

Zivolo. *Olin. av. 50.*

Miliaria lutea. *Frisch. av. 2. t. 5. f. 2.*

Hortulano congener. *Aldr. orn. 2. p. 179. Will. orn. 198.*

*Habitat in Europa, nidificat humi in pratis; ad horrea & pagos Hyeme domestica; æstate colligit larvas Brassicæ.*

olivacea. 6. E. olivacea, subtus albidior, gula aurantia, fascia pectorali nigricante.

Emberiza dominicensis. *Briss. av. 3. p. 30. t. 13. f. 5.*

*Habitat in Dominica.*

Orix. 7. E. grisea, fronte abdomineque nigris, collo uropygioque fulvis, rostro nigro.



*Passer angolensis*, capite nigro, collo & uropygio flavis. *Edw. av.* 178. t. 178.

*Cardinalis* cap. b. spei. *Briss. av.* 3. p. 114. t. 6. f. 1.  
*Habitat in Africa interiore.*

*An Loxiæ species?*

Quelea. 8. *E. grisea*, fronte nigra, rostro coccineo.

*Passer senegalensis erythrorynchos.* *Briss. av.* 3. p. 110.

*Habitat in Africa.*

Rostrum coccineum, crassum *Loxiæ*, at non incurvum, maxillis *Emberizæ*, Frons undique circum rostrum atra. Caput, Humeri, Alæ nigro griseoque maculatæ ut *Passeris domestici*. Pectus & Abdomen albo subincarnata. Remiges Rectricesque nigricantes margine undique cinereo. Pedes Unguesque incarnati.

capensis. 9. *E. grisea*, gula albida, fascia oculari maxillarumque nigricante.

*Hortulanus capitis* b. spei. *Briss. av.* 3. p. 230. t. 14. f. 4.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

Ludovicia. 10. *E. grisea*, subtus pallida, pectore rufo, capite supra arcu nigro.

*Hortulanus ludovicianus.* *Briss. av.* 3. p. 278. t. 14. f. 3.

*Habitat in Ludovicia.*

Rostrum rufescens maculis nigricantibus. Arcus niger verticis.

Cia. 11. *E. rufescens*, capite lineis nigricantibus sparsis, superciliis albis.

*Emberiza capite cinereo lineis nigricantibus variegato.* *Kram. austr.* 371.

*Emberiza pratenfis.* *Gesn. av.* 655. *Aldr. orn.* 2. p. 573. *Briss. av.* 3. p. 266.

*Cirlus stultus.* *Aldr. orn.* 2. p. 857. t. 858. *Will. orn.* 198. *Raj. av.* 94.

*Passeribus congener.* *Aldr. orn.* 2. p. 562. *Will. orn.* 182. *Raj. av.* 87.

*Habitat in Europa australi*, volando Zip zip sonans. Statura *Citrinellæ*. Caput linea verticali cinerea lateribus atro ferrugineoque variis. Tempora linea alba.

*alba.* Linea nigra ab oculis ad basin maxillarum. Collum subtus cinereum. Pectus Abdomenque ferruginea. Dorsum rubescens nigro-varium. Alæ basi cinerascens. Rectrices nigricantes: media fusca, extimis 1, 2, dimidia parte albis. D. Scopoli.

Cirlus. 12. E. grisea, pectore maculato, superciliis luteis, rectricibus duabus extimis macula alba cuneata.

Emberiza sepiaria. Briss. av. 3. p. 263.

Luteæ primum genus. Will. orn. 196. Raj. av. 93.

Cirlus. Aldr. orn. 2. p. 855.

Habitat in Europa australi.

familiaris. 13. E. griseo-maculata, apicibus rectricum albis, dorso politico flavo.

Motacilla capite & rostro nigro, uropygio luteo. Osb. it. 102.

Habitat in Asia.

Corpus magnitudine Ligurini, supra cinereum maculis fuscis, subtus cinereum. Dorsum sub alis ♂ versus caudam flavum. Rectrices caudæ albæ.

flaveola. 14. E. grisea, facie flava.

Habitat in calidis regionibus.

Corpus magnitudinis Ligurini. Frons ♂ Gula flava.

amazona. 15. E. fusca, vertice fulvo, crisso albido.

Habitat Surinami. Dahlberg.

Magnitudo Pari. Alarum basis subtus albida.

Oryzivo- 16. E. fusca, cervice rufescente, abdomine nigro, re-  
ra. ctricibus mucronatis.

Hortulanus carolinensis. Catesb. car. 1. p. 14. t. 14.

Edw. av. 291. Briss. av. 3. p. 282. t. 15. f. 3.

Habitat in Cuba, ubi circa autumnum, consumta Oryza, feminae solæ descendunt in Carolinam.

Femina tota grisea, colore a mare diversissima, sed rectricibus simillima.

Schoeni- 17. E. capite nigro, corpore griseo nigroque, rectrici-  
clus. bus extimis macula alba cuneiformi. Fn. svec. 231.

Emberiza capite nigro, maxillis rufis, torque albo, corpore rufo nigricante. Fn. svec. 1. n. 211. Kram. austr. 371.



*Hortulanus arundinaceus*. *Briss. av.* 3. p. 274.

*Passer arundinaceus*. *Gesn. av.* 652.

*Passer atricapillus torquatus*. *Frisch. av. t.* 7. *Raj.*  
av. 93. n. 3.

*Junco turneri*. *Gesn. av.* 573.

*Habitat in Europæ arundinetis.*

*Similis Fringillæ domesticæ gula nigra, sed Caput nigrum, collare album, maxillæ rufæ, Supercilia pallida, Cauda maxime forficata.*

psittacea. 18. *E. cinereo-fusca*, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.

*Fringilla brasiliensis*. *Seb. mus.* 1. p. 103. t. 66. f. 5.

*Linaria brasiliensis longicauda*. *Briss. av.* 3. p. 147.

*Habitat in America australi.*

paradi-  
sæa. 19. *E. fusca*, pectore rubro, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis: duabus longissimis, rostro nigro.

*Passer indicus macrourus alius*. *Aldr. orn.* 2. p. 567.

*Will. orn.* 184. t. 45. *Raj. av.* 87.

*Passer psittacus indicus*, cauda longa. *Pet. gaz.* - - -  
t. 55. f. 1.

*Passer vidua*. *Briss. av.* 3. p. 120. t. 8. f. 1.

*Passer pectore rubro*, cauda longissima. *Edw. av.* 86.  
t. 86.

*Habitat in Africæ regno Angolensi. Deponit quotannis longas caudæ pennas, uti Pavo, & dein longe alium simplicemque vestitum induit.*

*Corpus nigrum, pectore & cervice coccineis. Rostrum plumbeum. Pedes carnei. Rectrices 4. intermediæ corpore longiores falcatae: 6, 6 corpore longiores in filum desinentes; 5, 5 quater longiores quam intimæ 6, & subensiformes, ex harum sinu baseos seta longa dependet.*

serena. 20. *E. pileo nigro*, vertice rubro, cauda cuneiformi: rectricibus duabus mediis longissimis, pedibus griseis.

*Vidua minor*. *Briss. av.* 3. p. 124. t. 8. f. 2.

*Habitat* - - -

*Alarum rectrices albæ. Rostrum rubrum.*

vidua. 21. *E. nigricans*, subtus albida, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis: duabus longissimis, rostro rubro.

Passer

*Passer indicus macrourus*, rostro miniaceo. *Aldr. orn.*  
2. p. 565. *Will. orn.* 184. *Raj. av.* 87.  
*Vidua major.* *Briss. av.* 3. p. 127. t. 8. f. 2.  
*Habitat in India.*

principa- 22. *E. variegata*, pectore rufo, rectricibus mediis qua-  
lis. tuor longissimis, rostro pedibusque rubris.  
*Vidua angolensis.* *Edw. av.* 2. p. 126. t. 270. *Briss.*  
app. 80.  
*Habitat in Angola.*  
*Alarum rectrices albæ; hinc priori affinis. Rostrum*  
*Pedesque rubri.*

egia. 23. *E. rectricibus intermediis quatuor longissimis æqua-*  
libus apice tantum pennatis, rostro rubro.  
*Vidua viparia africana.* *Briss. av.* 3. p. 129. t. 9. f. 1.  
*Habitat in Africa.*  
*Corpus magnitudine Linariæ, nigrum, subtus rufe-*  
*scens. Collum rufescens. Rectrices intermediae 4*  
*rectæ toto corpore duplo longiores, tantum apice lan-*  
*ceolato pinnatæ. Pedes rubri.*

iris. 24. *E. capite cæruleo, abdomine fulvo, dorso viridi,*  
*pennis viridi-fuscis.* *Aët. stockh.* 1750. p. 278. t. 7.  
f. 1.  
*Chloris ludoviciana vulgo Papa dicta.* *Briss. av.* 3. p.  
200. t. 8. f. 3. & app. 74.  
*Fringilla tricolor.* *Catesb. car.* 1. p. 44. t. 44.  
*Fringilla tricolor mexicensis.* *Edw. av.* 130. t. 130.  
& t. 273. f. 1.  
*Fringilla chinensis.* *Alb. av.* 3. p. 64. t. 68.  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Caput totum ♂ Collum cæruleum. Dorsum, Alæ*  
*Caudaque supra viridia; tota subtus lutea, sed Pe-*  
*ctus antice fulvum. ♀. Femina cærulea solo abdo-*  
*mine albo, hyeme fere grisea evadit.*

II. TANAGRA. *Rostrum conicum, acumina-*  
*tum, emarginatum, basi sub-*  
*trigonum, apice declive.*

capa. 1. *T. atra, fronte jugulo pectoreque coccineis.*  
*Merula pectore rubro.* *Edw. av.* 3. p. 120. t. 267.



*Muscicapa cayanensis nigra major.* *Briss. av. 2.*  
387. t. 38. f. 3.

*Lanius Carbo.* *Pallas. adumbr. 114.*

*Jacapu.* *Marcgr. bras. 192.*

*Habitat in America australi.*

*Mandibula inferior fere ultra oculos protensa, ut sequenti.*

bresilia. 2. *T. coccinea, alis caudaque nigris.*

*Tanagra Cardinalis.* *Briss. av. 3. p. 42. t. 3. f.*

*Merula bresilica.* *Bell. av. 319. Aldr. orn. 2. p. 622.*

*Will. orn. 142. Raj. av. 66.*

*Passer erythromelanus indicus.* *Aldr. orn. 3. p. 566.*

*Raj. av. 87.*

*Passer indicus porphyromelanus.* *Aldr. orn. 2. p. 577.*

*Tye piranga.* *Marcgr. bras. 192. Will. orn. 188.*

*Edw. av. t. 343.*

*Chiltototl.* *Hern. mex. 54. Raj. av. 169.*

*Habitat in India Occidentali & Orientali.*

*Orientalis mea minor erat, magnitudine Fringillæ domesticae, tota sanguinea s. purpurea, nitidissima exceptis alis & rotundata cauda. Rostrum nigricans subtus basi albida.*

rubra. 3. *T. rubra, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis.*

*Cardinalis canadensis.* *Briss. av. 3. p. 48. t. 2. f.*

*Habitat in Canada.*

Jacarina. 4. *T. atro-violacea, alis subtus albicantibus, cauda cinnamomea varicato-bifurca.*

*Tanagra brasiliensis nigra.* *Briss. av. 3. p. 28.*

*Jacarini.* *Marcgr. bras. 210. Will. orn. 210. Edw. av. 2. t. 306. f. 2.*

*Habitat in Brasilia.*

violacea. 5. *T. violacea, subtus flavissima.* *Mus. Ad. Fr. 2.*

81. \*

*Fringilla violacea.* *Syst. nat. 10. p. 182. n. 25.*

*Tanagra brasiliensis nigro-lutea.* *Briss. av. 3. p. 32.*

*t. 2. f. 2, 3.*

*Parus aureus.* *Edw. av. 2. p. 112. t. 263. f. 1.*

*Teitei.* *Marcgr. bras. 212. Will. orn. 194. Raj. av. 92.*

*Habitat in Brasilia, Cayana.*

Rostrum brevissimum apice incurvo ut in *Pipra*. Frons flava etiam est.

- cyanea. 6. *T. cyanea*, rectricibus fuscis.  
*Linaria cærulea*. *Catesb. car.* 1. p. 45. t. 45. *Edw.*  
*av.* 2. p. 132. t. 273. f. 2.  
*Habitat in Carolina.*
- Gyrola. 7. *T. viridis*, capite rubro, collari flavo, pectore cæruleo.  
*Fringilla Gyrola*. *Syst. nat.* 10. p. 181. n. 12.  
*Tanagra peruviana viridis*. *Briss. av.* 3. p. 23. t. 4.  
*f.* 1. *Edw. av.* 1. p. 23. t. 23.  
*Habitat in Peru, Surinamo.*
- cayana. 8. *T. fulva*, dorso viridi, pileo rufo, genis nigris.  
*Tanagra cayanensis viridis*. *Briss. av.* 3. p. 21. t. 4.  
*f.* 3. *Edw. av.* 110. t. 262.  
*Habitat in Cayana.*
- atrata. 9. *T. atra nitens*.  
*Emberiza atra*. *Syst. nat.* 10. p. 178.  
*Habitat in India orientali.*  
*Corpus magnitudine Turdi, totum aterrimum etiam rostro, dorsum nonnihil nitens e cyaneo.*
- mexicana. 10. *T. nigra*, subtus flavicans, pectore uropygioque cæruleis.  
*Tanagra cayanensis cærulea*. *Briss. av.* 3. p. 6. t. 1.  
*f.* 3. *Edw. av.* 3. p. 292. t. 350.  
*Touauhtototl*. *Hern. mex.* 52. *Raj. av.* 170.  
*Habitat in Cayana, Mexico.*
- Tatao. 11. *T. violacea*, dorso nigro, uropygio fulvo, capite viridi, pectore alisque violaceis.  
*Tanagra brasiliensis*. *Marcgr. bras.* 214. t. 215. *Will.*  
*orn.* 177. *Raj. av.* 84.  
*Parus paradisiacus*. *Edw. av.* 3. p. 289. t. 349.  
*Tanagra*. *Briss. av.* 3. p. 3. t. 1. f. 1.  
*Avicula de Tatao*. *Seb. mus.* 1. t. 60. f. 6.  
*Habitat in Brasilia, Cayana.*
- albirostris. 12. *T. nigra*, macula alarum basique caudæ flavis, rostro albo. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 31.\*  
*Habitat in America.*



- gularis. 13. *T. nigra*, subtus alba, capite nigro, jugulo purpureo.  
*Cardinalis americanus*. *Briss. app.* 67. t. 4. f. 4.  
*Habitat in America.*
- cayana, 14. *T. nigra nitida*, pectore utrinque alisque subtus flavis.  
*Tanagra cayanensis nigra*. *Briss. av.* 3. p. 29. t. 2.  
 f. 1.  
*Guira-jenoia*. *Marcgr. bras.* 209. *Will. orn.* 174.  
*Habitat in Cayana, Mexico, Brasilia.*
- brasiliensis. 15. *T. nigra*, subtus alba, jugulo uropygioque cæruleis.  
 scintibus, facie pectoreque nigris.  
*Tanagra brasiliensis cærulea*. *Briss. av.* 3. p. 9. t. 1. f. 4.  
*Habitat in Brasilia.*
- dominica. 16. *T. nigro maculata*, supra fusca, subtus albida.  
*Tanagra dominicensis*. *Briss. av.* 3. p. 37. t. 2. f. 4.  
*Habitat in Dominica.*
- militaris. 17. *T. fusca*, pectore jugulo gula humerisque sanguineis.  
*Mus. Ad. Fr.* 2. p. 30. \*  
*Emberiza militaris*. *Syst. nat.* 10. p. 178. *Amæn.*  
*acad.* 4. p. 241. \*  
*Cardinalis fuscus*. *Briss. av.* 3. p. 51.  
*Rubicilla fusca major*. *Edw. av.* 82. t. 82. & t. 342.  
*Merula indica*, pectore cinnabarino. *Raj. av.* 67.  
*Habitat in America, Asia.*
- albirostris. 18. *T. nigra*, rostro albo, macula alarum basique caudæ  
 albis. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 31. \*  
*Habitat in America*
- Episcopus. 19. *T. cinerea*, alis caudaque extus cæruleis.  
*Episcopus avis*. *Briss. av.* 3. p. 40. t. f. 2.  
*Habitat in Brasilia.*
- Sayaca. 20. *T. cana*, alis subcæruleis.  
*Tanagra brasiliensis varia*. *Briss. av.* 3. p. 18.  
*Sayacu*. *Marcgr. bras.* 193. *Will. orn.* 188. *Raj. av.*  
 89. n. 3. *Edw. av.* 3. p. 293. t. 351. f. 2.  
*Habitat in Brasilia.*
- punctata. 21. *T. viridis nigro punctata*, subtus flavescenti-albida.  
*Tanagra viridis indica punctata*. *Briss. av.* 3. p. 19.  
 t. 4 f. 2.

*Parus viridis maculatus.* Edw. av. 2. p. 110. t. 262.

*Habitat in India orientali.*

*Uropygium viride, immaculatum. Crissum luteo virens.*

*virens.* 22. *T. viridis, subtus flavescens, loris genis gulaque nigris.*

*Tanagra brasiliensis viridis.* Briss. av. 3. p. 25.

*Habitat in Brasilia, Peru, Mexico.*

*chloroti-* 23. *T. nigra nitens, abdomine pectore fronteque luteis,*  
*ca. rectrice extima interius macula alba.*

*Tanagra cayanensis nigro lutea.* Briss. av. 3. p. 34.  
t. 2. f. 3.

*Habitat in Cayania.*

*cristata.* 24. *T. nigricans, crista aurantia, gula uropygioque fulvis.*

*Tanagra cayanensis nigra cristata.* Briss. app. 65. t.

4. f. 3.

*Habitat in Cayania.*

*Alæ subtus & Alulæ albæ.*

## 12. FRINGILLA. *Rostrum conicum, rectum, acuminatum.*

*opponi-* 1. *F. capite nigro, corpore griseo nigroque, superciliis*  
*a. albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.*

*Fn. svec. 235. \**

*Fringilla montana.* Briss. av. 3. p. 160.

*Fringilla major.* Alb. av. 3. p. 59. t. 63.

*Montifringilla congener.* Aldr. orn. 2. p. 821. t. 823.

*Habitat in Europa.*

*Nigra caput, gula, jugulum, pectus. Alba abdomen,*  
*crissum, supercilia. Collum supra ferrugineum. Cor-*  
*pus supra testaceo nigroque varium. Remigis 1 mar-*  
*go exterior albus.*

*Guinama.* 2. *F. grisea, remigibus utrinque albis, rectricibus latera-*  
*libus intus albis.*

*Habitat Surinami.*

*Corpus griseum. Rostrum acutum, flavum. Abdo-*  
*men albidum. Remiges nigrae: Primores versus ba-*  
*sin utrinque albæ; Secundariæ basi apiceque albæ. Re-*  
*ctrices æquales, nigricantes: 1, 2 macula in latere*  
*interiore alba; 3, 4, 6 apice albæ.*



coelebs. 3. *F. artubus* nigris, remigibus-utrinque albis: tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis.  
*Fn. svec. 232. t. 2. f. 199. \* femina.*

*Fringilla. Gesn. av. 387. Aldr. orn. 2. p. 815. Will. orn. 186. t. 45. f. 4. Raj. av. 88. Alb. av. 1. p. 60. t. 63. Frisch. av. - - t. 1, 2. Olin. av. 3. Briss. av. 3. p. 148.*

β. *Fringilla sylvia. Fn. svec. 1. n. 200. Syst. nat. 10. 180. Kram. austr. 367.*

*Habitat in Europa.*

*Femina sola migrat per Belgium in Italiam. Mas cepite aliquot pilis, mutato sono, æstatem annunciat tempore vernali, horis matutinis.*

Monti-fringilla. 4. *F. alarum* basi subtus flavissima. *Faun. svec. 233. t. 2. f. 198.*

*Montifringilla* f. *Fringilla montana. Gesn. av. 388. Jonst. av. 99. t. 38. Will. orn. 187. t. 45. f. Raj. av. 88. Alb. av. 3. p. 60. t. 64. Frisch. av. - - t. 3. f. 2, 3. Olin. av. 32. Aldr. orn. l. 11. c. 7. Briss. av. 3. p. 155.*

*Habitat in Europæ sylvis.*

lulensis. 5. *F. fusca*, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa. *Faun. svec. 134. \**

*Carduelis lulensis. Briss. av. 3. p. 63.*

*Habitat in Svecia.*

erythrophthalma. 6. *F. nigra* rubro relucens, abdomine rufescente, macula alarum alba.

*Fringilla carolinensis. Briss. av. 3. p. 169.*

*Passer niger, oculis rubris. Catesb. car. 1. p. 34.*

*Habitat in America.*

Carduelis. 7. *F. remigibus* antrorsum luteis: extima immaculata rectricibus duabus extimis medio reliquisque apicalibus. *Fn. svec. 236. \**

*Carduelis. Gesn. av. 242. Aldr. orn. l. 18. c. Jonst. av. 97. t. 37. Will. orn. 189. t. 46. Merian. inf. t. 173. Alb. av. 1. p. 61. t. 64. Frisch. av. - - t. 1. f. 3, 4. Olin. av. 10. Briss. av. 1. p. 53.*

*Habitat in Europæ juniperetis; hyeme in capitulis plantis Semina colligit. In caveis canora.*

Rectri-

Rectrices Remigesque autumnō apice albescent, vere tota nigrae. Maris scapulae nigrae; Feminae vero cinerea. Kram. austr. 366. Generat ex F. canaria hybridam, capite alisque similem patri; subtus luteam rectricibus luteis apice nigris. Haec hybrida filia fertilis, non vero nepta.

alba. 8. F. viridis, facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undato.

Cardueli affinis viridis. Edw. av. 128. t. 128. ♂ 272.

Carduelis viridis. Briss. app. 70.

Habitat in China.

Lora caerulea.

lario. 9. F. capite pectoreque atris, corpore castaneo, subtus albo, rectricibus quatuor lateralibus lineola nigra.

Passerculus capitis bonae spei. Briss. av. 3. p. 106. t. 5. f. 2.

Passer capensis. Alb. av. 3. p. 63. t. 67.

Habitat ad Cap. b. spei.

mandarina. 10. F. fusca rufescensque albo-punctata.

Ammandabal. Alb. av. 3. p. 72. t. 77. Edw. av. t. 355. f. 1.

Avis benghalensis parva maculata, Amadavad. Pet. gaz. 53. f. 1.

Avicula Amadavadæa dicta. Will. orn. 194. t. 46. Raj. av. 92.

Benghalus punctatus. Briss. av. 3. p. 206. t. 10. f. 4.

β. Benghalus fuscus. Briss. av. 3. p. 205. t. 10. f. 3.

Habitat in India orientali: Java, Benghala.

Caput, Uropygium, Crissum rufescentia. Dorsum ♂ Ale fuscae punctis albis. Rectrices nigrae apice puncto albo. Rostrum rubrum. Mas magis purpureus; Femina magis cinerascens.

anatina. 11. F. cauda cuneiformi, corpore rufescente, rostro rubro, temporibus uropygio abdomineque violaceis.

Fringilla coloribus rufo & caeruleo, brasiliensis. Edw. av. 191. t. 191.

Granatinus. Briss. av. 3. p. 216. t. 9. f. 3?

Habitat in Brasilia.



- tristis. 12. F. flava, fronte nigra, alis fuscis.  
*Carduelis americana. Catesb. car. 1. p. 43. t. 1.*  
*Edw. av. 2. p. 133. t. 274. Briss. av. 3. p. 64.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- Zena. 13. F. nigra, subtus alba, linea supra infraque oculi  
 candida, pectore fulvo.  
*Fringilla bahamensis. Catesb. car. 1. p. 42. t. 4.*  
*Briss. av. 3. p. 168.*  
*Habitat in America meridionali.*
- lepidula. 14. F. fusco-virens, fascia supra oculari infra-oculari  
 gulaque fulvis, pectore nigro.  
*Habitat in Havanæ sylvis, brevi cicuratur, continue*  
*cantat voce adeo exili, ut vix observetur, nisi a-*  
*stiterit quis proxime. D. Jacquin.*  
*Corpus F. canariæ  $\frac{1}{2}$  minus, fusco-virens. Fascia*  
*fulva supra oculos major, infra oculos minor; Gula*  
*fulva. Rostrum Oculique nigri. Pedes leucophæi.*
- autumnalis. 15. F. virens, pileo ferrugineo, crisso testaceo.  
*Habitat Surinami.*  
*Caput supra ferrugineum. Cauda integra.*
- Citrinella. 16. F. subvirescens, dorso fusco-maculato, pedibus  
 carnatis.  
*Citrinella. Gesn. av. 260. Aldr. orn. 2. p. 83.*  
*Will. orn. 193. t. 45. Raj. av. 97. n. 7. Otlet*  
*av. 15.*  
*Habitat in Europa australi.*
- Serinus. 17. F. subvirescens, mandibula inferiore albida, dorso  
 lateribus fusco-maculatis, fascia alarum flava.  
*Serinus. Gesn. av. 260. Aldr. orn. 2. p. 854. Will.*  
*orn. 194. t. 46. Briss. av. 92. Raj. av.*  
*p. 179.*  
*Habitat in Europa australi.*
- Senegala. 18. F. fusco-ferruginea, vertice subtusque rufa, rostro  
 rubro nigro-fstriato.  
*Senegalus. Briss. av. 3. p. 208. t. 10. f. 2.*  
*Habitat in Senegal.*
- noctis. 19. F. nigra, gula lorisque rufis, rostro nigro. *Briss.*  
*av. 3. p. 118, t. 7. f. 2.*

*Passer niger*, punctis croceis. *Sloan. jam. 2. p. 311.*  
*Raj. av. 188.*

*Avis nocturna. Hern. mex. 49. Raj. av. 171.*

*Habitat in Jamaica, Mexico, Martinica.*

finica. 20. *F. olivacea*, subtus testacea, remigibus rectricibusque nigris basi luteis.

*Fringilla sinensis. Briss. av. 3. p. 175. t. 7. f. 2.*

*Habitat in China.*

nivalis. 21. *F. nigra*, subtus nivea, remigibus secundariis rectricibusque albis.

*Fringilla nivalis. Briss. av. 3. p. 162. t. 15. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Rectrices albæ, apice nigræ: mediis nigris albo marginatis.*

butyra- 22. *F. virens*, superciliis pectore abdomineque flavis, cea. remigibus primoribus margine exteriori albis.

*Chloris indica. Edw. av. 84. t. 84. Briss. av. 3. p. 195.*

*Habitat in Madera.*

*Similis Loxiæ butyracæ, sed rostrum minus.*

Canaria. 23. *F. rostro corporeque albo - flavicante*, rectricibus remigibusque virescentibus, rostro albido. *Faun. svec. 1. n. 207.*

*Canaria. Gesn. av. 240. Aldr. orn. 2. p. 814. t. 815.*

*Passer canarinensis. Jonst. av. t. 36. Will. orn. 192.*

*t. 46. Raj. av. 91. n. 6. Alb. av. 1. p. 62. t. 65.*

*Frisch. av. 2. t. 12. f. 5. Olin. av. 7. Briss. av. 3. p. 184.*

*Habitat in Canariis insulis. Seminibus Phalaridis imprimis victitans; edit & semina Cannabis, Myagri, Napi, Avenæ. Hybrida Carduelis parit, sed non ejus nepos.*

flaveola. 24. *F. flava*, fronte fulva, remigibus rectricibusque nigris flavo marginatis.

*Habitat - - - Museum De Geer.*

*Corpus magnitudine & statura F. canariensis, flavissimum. Rostrum convexum, pallidum apice fusco.*

*Frons fulva s. crocea. Dorsum flavo-virescens.*

*Remiges Rectricesque nigræ utroque margine flavæ*

*Cauda forscata. Pedes pallidi.*



Spinus. 25. F. remigibus medio luteis : primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis apice nigris. *Fn. svec.* 237.\*

Acanthus avicula. *Gesn. av.* 1.

Spinus f. Ligurinus. *Aldr. orn.* 2. p. 807. t. 810, 811. *Will. orn.* 192. t. 46. *Raj. av.* 91. n. 5.

*Alb. av.* 3. p. 71. t. 76. *Frisch. av.* 2. t. 11. f. 1, 2. *Olin. av.* 17.

Ligurinus. *Briss. av.* 3. p. 65.

*Habitat in Europæ juniperetis.*

Mas gutture fusco ; Femina albo.

flammea. 26. F. fusca, crista flammea. *Faun. svec.* 238.

Linaria f. Luteola nigra. *Klein. av.* 93.

*Habitat in Europa.*

*Diversissima a F. cælibe.*

flaviro- 27. F. fusca, rostro flavicante. *Faun. svec.* 239.\*

stris. *Habitat in Europa.*

*Varietas F. cælibis non est.*

cannabi- 28. F. remigibus primoribus rectricibusque nigris utroque  
na. margine albis. *Faun. svec.* 240.\*

Linaria rubra major. *Will. orn.* 191. t. 46. *Raj. av.* 91. n. 2. *Alb. av.* 3. p. 68. t. 72, 73. *Frisch. av.* 2. t. 9. f. 1, 2. *Briss. av.* 3. p. 135.

Linaria marina. *Aldr. orn.* 2. p. 825. t. 826.

*Habitat in Europa.*

Linaria. 29. F. remigibus rectricibusque fuscis margine obsolete pallido, litura alarum albida. *Fn. svec.* 241.\*

Linaria rubra. *Gesn. av.* 591. *Aldr. orn.* 2. p. 825. *Will. orn.* 191. *Raj. av.* 91. n. 3. *Alb. av.* 3. p. 70. t. 75. *Frisch. av.* t. 10. f. 3, 4. *Briss. av.* 3. p. 138.

*Habitat in Europa ; viçitat imprimis Alni seminibus.*

Petronia. 30. F. grisea, superciliis albis, gula lutea.

Parus sylvestris. *Briss. av.* 3. p. 88. t. 5. f. 1.

Passer torquatus. *Will. orn.* 183 ? *Raj. av.* 87 ?

Oenanthe congener. *Aldr. orn.* 2. p. 764. *Will. orn.* 171. *Raj. av.* 80.

Petronia marina. *Will. orn.* 195. *Raj. av.* 92.

Fringilla subincana, macula lutea in pectore. *Frisch. av.* t. 3.

*Habitat in Europa.*

*Rectrices apice lateris exterioris macula alba , at Rectrix extima margine exterioro albo.*

golen- 31. F. dorso fusco , abdomine caudaque cæruleis.  
ls. Fringilla ventre cæruleo. *Edw. av. 131. t. 31.*  
Benghalus. *Briss. av. 3. p. 203. t. 10. f. 1.*  
*Habitat in Angola , Benghhala.*

nghalus. 32. F. dilute cærulea , capite dorsoque griseis , lateribus capitis purpureis.  
Benghalus. *Briss. av. 3. p. 203.*  
*Habitat in Bengala.*  
*Rostrum albidum marginibus nigris.*

naica. 33. F. grisea , pectore viridi-cærulescente , remigibus rectricibusque nigris. *Amæn. acad. 1. p. 489. \**  
Fringilla jamaicensis. *Briss. av. 3. p. 166.*  
Passer cæruleo fuscus. *Sloan. jam. 2. p. 311. t. 257. f. 3. Raj. av. 187.*  
*Habitat Jamaica.*

color. 34 F. nigra , capite uropygioque cyaneis , humeris viridibus ; abdomine flavescente.  
*Habitat Surinami.*  
Corpus mediocre. Dorsum atrum. Narium regio atra. Abdomen totum albo-flavescens. Frons , Tempora , Gula cyanea. Remiges nigre : primores margine exterioro virides. Rectrices nigre , æquales.

saja. 35. F. purpurascens , fascia pectorali saturatiore.  
Maja. *Hern. mex. 56. Nieremb. nat. 208. Will. orn. 297. Raj. av. 155.*  
Maia ex insula cuba. *Briss. av. 3. p. 214. t. 7. f. 2.*  
*Habitat in India orientali & occidentali , visitat Zea.*

mesti- 36. F. remigibus rectricibusque fuscis , corpore griseo nigroque , fascia alarum alba solitaria. *Faun. svec. 242. \**  
a. Fringilla remigibus rectricibusque fuscis , gula nigra , temporibus ferrugineis. *Fn. svec. 1. n. 212.*  
Passer domesticus. *Gesn. av. 643. Aldr. orn. 2. p. 528. t. 534. Will. orn. 182. t. 44. Raj. av. 86. Alb. av. 1. p. 5 , 6. t. 62. Frisch. av. - - - t. 8. f. 1 , 2. Olin. av. 42. Briss. av. 3. p. 72.*



*Habitat in Europa prope rura. Salacissimus qui vagesies saepe coit. Hortis pessima. Mas gula nigra distinguitur.*

montana. 37. F. remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina. *En. svec. 2433. Passer montanus. Aldr. orn. 2. p. 560. t. 560. Olin. av. 46. Raj. av. 87. Will. orn. 185. t. 45. All. av. 3. t. 66. Edw. av. 124. t. 269. Briss. av. 1. p. 79.*

*Habitat in Europa.*

*Simillima Fr. domesticæ, sed minor & fascia duplici e rectricibus alarum primi secundique ordinis albis; at in F. domestica tantum secundi; Uropygio virescente, nec testaceo; Macula nigra ad aures, nec alibi retro oculum. Kram. aust. 370.*

bicolor. 38. F. capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virescentibus.

*Passer bicolor bahamensis. Catesb. car. 1. p. 37. t. 37.*

*Chloris bahamensis. Briss. av. 3. p. 202.*

*Habitat in America.*

crispa. 39. F. olivacea, subtus lutea, capite nigro, pennis plurimis recurvatis.

*Passer crispus. Edw. av. 2. p. 128. t. 271.*

*Fringilla crispa. Briss. app. 86.*

*Habitat in Angola.*

113. MUSCICAPA. Rostrum subtrigonum, utrinque emarginatum, apice incurvo; vibrissæ patentæ versus fauces.

*Nares subrotundæ.*

paradisi. 1. M. capite cristato nigro, corpore albo, cauda cuneata: rectricibus intermediis longissimis.

*Muscicapa cristata alba, cap. b. spei. Briss. av. 2. p. 414. t. 41. f. 2.*

*Corvus paradisi. Syst. nat. 10. p. 107.*

*Pica orientalis, cauda duabus pennis longissimis*

*Edw. av. 113. t. 113.*

Manucodiata cristata ex albo nigroque varia. *Raj.*  
av. 195. t. 2. f. 13

*Avis paradisi. Seb. mus. 1. p. 85. t. 52. f. 3.*

*Habitat in Zeylona ; ad Cap. b. spei.*

*Varietas ? alis caudaque helvolis ; qua Briss. 2. p. 418. t.*  
*41. f. 1.*

*alia ? corpore supra rubro : quæ Edw. t. 325.*

*forte hæc vel ætate , vel sexu , vel loco variantes.*

*Caput azureum crista declinata. Corpus magnitudine*  
*Sturni album, rachi pennarum nigra. Remiges ni-*  
*græ, utroque margine albæ. Rectrices nivæ, rachi*  
*margine exteriori nigra. Rostris basis plumis tecta.*

mutata. 2. *M. capite cristato , cauda cuneata, rectricibus in-*  
*termediis longissimis ; palpebris cæruleis.*

*Muscicapa madagascariensis longicauda. Briss. av. 2.*  
*p. 424. t. 40. f. 1, 2, 3.*

*Habitat in Madagascar.*

*Corpus supra nigro-virescens. Rectrices , intermediæ*  
*2, longissimæ : albæ oris & rachi nigris ; laterales*  
*vero nigra latere exteriori albo : ora nigra.*

Martini- 3. *M. capite cristato , corpore fusco , subtus cinereo,*  
ca. *remigum margine exteriori albido. Briss. av. 2. p.*  
*362. t. 36. f. 2.*

*Habitat in Martinica.*

Tyrannus. 4. *M. cauda longissima forficata , corpore nigro , subtus*  
*albo.*

*Muscicapa Tyrannus cauda bifurca. Briss. av. 2. p.*  
*395. t. 39. f. 3.*

*Habitat in Canada , Surinamo.*

*Surinamensi : Rectrix extrema margine exteriori versus*  
*basin alba ; Corpus nigrum.*

*Canadensi : Rectrices similes. Corpus supra cinereum ;*  
*pennæ verticis basi luteæ. Tempora nigra. Br.*

Surinama. 5. *M. cauda rotundata apice alba , corpore nigro , sub-*  
*tus albo.*

*Habitat Surinami.*

*Corpus nigrum , subtus totum album. Rectrices summo*  
*apice albæ.*

crinita. 6. *M. capite cristato colloque cærulescente , abdomine flave-*  
*sciente , dorso virescente , remigibus rectricibusque rufis*



Muscicapa cristata, ventre luteo. *Catesb. car. 1. p. 52. t. 52.*

Muscicapa virginiana cristata. *Briss. av. 2. p. 413.*  
*Habitat in America septentrionali.*

Emeria. 7. M. subcristata grisea, subtus alba, temporibus uropygioque rubris.

Ruticilla benghalensis. *Alb. av. 3. p. 52. t. 56. Edw. av. 190. t. 190.*

*Habitat in Benghala.*

*Capitis pennas longiores solet saepe in cristam erigere..*

rubra. 8. M. rubra, rostro flavesciente.

Muscicapa rubra. *Catesb. car. 1. p. 56. t. 56. Edw. av. 63. t. 239. f. 2. Briss. av. 2. p. 432.*

*Habitat in America septentrionali.*

Atricapilla. 9. M. nigra, subtus frontisque macula alarumque speculo albis, rectricibus lateralibus extus albis.

Motacilla remigibus extimo dimidiato extrorsum albo. *Faun. svec. 1. n. 230. t. 1. f. 229.*

Muscicapa nigra. *Briss. av. 2. p. 381.*

Curruca tergo nigro. *Frisch. av. t. 24.*

Ficedula Atricapilla se mutans. *Aldr. orn. 2. p. 758.*

Ficedula tertia aldrovandi. *Will. orn. 170.*

Oenanthe nostra quarta. *Raj. av. 77. n. 5.*

*Habitat in Europa.*

Ruticilla. 10. M. nigra, pectore macula alarum basique remigum rectricumque flavis.

Motacilla Ruticilla. *Syst. nat. 10. p. 186 n. 15.*

Muscicapa americana. *Catesb. car. 1. p. 67. t. 67. Briss. av. 2. p. 383.*

Ruticilla minor americana. *Edw. av. 80. t. 80.*

Serino affinis avicula e croceo & nigro varia. *Sloane. jam. 2. p. 312. Raj. av. 188.*

*Habitat in America.*

Femina flavescit, ubi mas albescit. Macula frontis alba. Remiges primores nigrae margine tenuiore fulvae. Secundariae nigrae a basi ad medium fulvae. Rectrices 1, 2, 3, 4 fulvae, postice nigrae; 5 exteriori latere a basi ad medium fulvae; 6 nigrae totae.

- virens. 11. *M. fusco-virens*, subtus lutea, superciliis albis.  
*Muscicapa carolinensis cinerea. Briss. av. 2. p. 368.*  
*Habitat in Carolina ad ripas.*
- cayanen- 12. *M. fusca*, subtus lutea, superciliis albis, vertice  
 fis. subaurantio.  
*Muscicapa cayanensis. Briss. av. 2. p. 404. t. 38. f. 4.*  
*Habitat in Cayana.*  
*Corporis pennæ supra fuscae margine olivaceo. Rectri-*  
*ces marginibus rufis. Remiges margine exteriori*  
*rufo. Verticis pennæ basi aurantiæ.*
- canaden- 13. *M. cinerea*, subtus lutea, loris luteis, vertice ni-  
 fis. gro maculato.  
*Muscicapa canadensis cinerea. Briss. av. 2. p. 406.*  
*t. 39. f. 4.*  
*Habitat in Canada.*
- olivacea. 14. *M. olivacea*, subtus albidior, superciliis albis,  
 oculis rubris.  
*Muscicapa olivacea. Edw. av. 5. p. 93. t. 253. Ca-*  
*tesb. car. 1. p. 54. t. 54.*  
*Muscicapa jamaicensis. Briss. av. 2. p. 410.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- senega- 15. *M. varia*, superciliis albis, rectricibus extimis dimi-  
 lenfis. diato albis.  
*Muscicapa senegalensis, pectore rufo. Briss. av. 2.*  
*p. 374. t. 37. f. 2.*  
 β. *Muscicapa senegalensis, pectore nigro. Briss. av.*  
*2. p. 376. t. 37. f. 3.*  
*Habitat in Senegal.*  
*Alba sunt gula, abdomen, crissum. Rectrices 4 mediæ*  
*nigræ, immaculatæ, reliquæ apice albæ; extima exte-*  
*riore latere alba.*
- capensis. 16. *M. fusca*, subtus alba, pectore nigro, fascia ala-  
 rum rufa, rectricibus apice albis. *Briss. av. 2. p.*  
*372. t. 36. f. 3.*  
*Habitat ad Cap. b. spei.*  
*Latera abdominis rufa. Tectrices alarum majores api-*  
*ce rufæ. Rectrices nigræ, apice albæ: extima la-*  
*tere exteriori alba.*



torquata. 17. *M. nigra*, subtus alba, pectore rufo, remigibus intimis apice albis.

*Muscicapa torquata* cap. b. spei. *Briss. av. 2. p. 379. t. 36. f. 4.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Collum a tergo album: Præcedenti maxime affinis.*

caroli- 18. *M. fusca*, subtus cinerea, capite nigro, crisso  
nensis. rubro. *Briss. av. 2. p. 365. Catesb. car. 1. p. 66. t. 66.*

*Habitat in Carolina.*

petechia. 19. *M. fusca*, subtus cinerea rufo maculatâ, gutture crissoque rufis. *Briss. av. 2. p. 364.*

*Habitat in Martinica.*

Grifola. 20. *M. subfusca*, subtus albicans, collo longitudinaliter maculato, crisso rufescente.

*Muscicapa. Briss. av. 2. p. 357. t. 35. f. 3.*

*Grifola. Aldr. orn. 2. p. 737. t. 738. Will. orn. 81. ♂ 171. Raj. av. 81.*

*Staparola. Will. orn. 159.*

*Currucis s. Ficedulis cognata. Gesn. av. 629.*

*Habitat in Europa.*

variegata. 21. *M. fusca*, subtus fronte uropygioque albis.

*Habitat in India.*

*Statura Motacillæ albæ. Corpus fuscum, sed album fronte cum lateribus capitis, collo subtus, pectore, abdomine, femoribus, uropygio & lineola ab humeris alarum ad medium dorsum ducta. Rectrices apice detritæ, harum extima vix apice alba.*

114. MOTACILLA. Rostrum subulatum, rectum:

Mandibulis subæqualibus.

Nares obovatæ.

Lingua lacero-emarginata.

Luscinia. 1. *M. rufo-cinerea*, armillis cinereis. *Fn. svec. 244.* \*

Lusci-

*Luscinia.* *Gesn. av. 592. Aldr. orn. 2. p. 771. t. 777. Will. orn. 161. t. 41. Raj. av. 78. n. 2. Alb. av. 3. p. 49. t. 53. Frisch. av. t. - - Briss. av. 3. p. 397.*

*Habitat in Europæ frondosis, noctu vespereque vernali cantillans : tanta vox, tam parvo in corpusculo, tam pertinax spiritus ! spiritu prius deficiens quam cantu. Plin. X : 29. Miratrix avis, nutritur ovis Formicarum.*

*Calidris. 2. M. supra fusco-virescens, subtus fulva, linea oculari subocularique nigra.*

*Luscinia americana. Edw. av. 121. t. 121. f. 2.*

*Icterus minor nidum suspendens. Sloan. jam. 2. p. 299. Raj. av. 184. n. 27.*

*Ficedula jamaicensis major. Briss. app. 101.*

*Habitat in America.*

*Rectrices apice luteæ.*

*modula- 3. M. supra griseo-fusca, rectricibus alarum apice albis, ris. pectore cærulescente-cinereo. Fn. svec. 245. \**

*Maynanina. Aldr. orn. 2. p. 736. Will. orn. 158.*

*Prunella. Gesn. av. 653.*

*Curruca eliotæ. Will. orn. 157. Raj. av. 79.*

*Curruca fusca. Frisch. av. t. 21.*

*Curruca sepiaria. Briss. av. 3. p. 394.*

*Passer rubi. Aldr. orn. 2. p. 738.*

*Habitat in Europa.*

*Pedes subincarnati.*

*Schoeno- 4. M. testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite ma- bænus. culato. Faun. svec. 246. \**

*Curruca sylvestris f. Lusciniola. Briss. av. 3. p. 398.*

*Lusciniola. Aldr. orn. 2. p. 765. Will. orn. 171.*

*Raj. av. 80.*

*Habitat in Europa.*

*campe- 5. M. grisea, capite virescente-cinereo, rectricibus con- stris. coloribus, abdomine albido.*

*Curruca jamaicensis. Edw. av. 122. t. 122. f. 2.*

*Briss. app. 100.*

*Habitat in Jamaica.*

*Curruca. 6. M. supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis : ex- tima margine tenuiore alba. Fn. svec. 247. \**



*Luscinia altera.* Klein. av. 73. t. 1.

*Hippolais* f. *Curruca.* Aldr. orn. 2. p. 752. t. 753.

*Cannavarola.* Aldr. orn. 2. p. 754.

*Curruca cantu lusciniaë.* Frisch. av. t. 21. f. 3.

*Curruca garrula.* Briss. av. 3. p. 384. Will. orn.

157. Raj. av. 79. n. 6.

*Habitat in Europa, noctu cantillans.*

*Hippolais.* 7. *M. virescente-cinerea*, subtus flavescent, abdomine albido, artubus fuscis, superciliis albidis. Faun. svec.

248. \*

*Ficedula septima.* Aldr. orn. 2. p. 759. t. 760. Will.

orn. 158. Raj. av. 79. n. 7.

*Curruca.* Briss. av. 3. p. 372.

*Habitat in Europa.*

*Salicaria.* 8. *M. cinerea*, subtus alba, superciliis albis. Faun. svec.

249. \*

*Luscinia salicaria.* Klein. av. 74.

*Salicaria.* Gesn. ic. 50. Aldr. orn. 2. p. 737. Will.

orn. 158. Raj. av. 81. Alb. av. 3. p. 56. t. 60.

*Curruca arundinacea.* Briss. av. 3. p. 378.

*Habitat in Europa.*

*Pedes fulvi.*

*Sylvia.* 9. *M. supra cinerea*, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba. Faun.

svec. 250. \*

*Curruca cinerea* f. *cineraria.* Briss. av. 3. p. 376. t.

21. f. 1.

*Stoparola.* Aldr. orn. 2. p. 732. Will. orn. 154.

Raj. av. 77.

*Habitat in Europa.*

*Ficedula.* 10. *M. subfusca*, subtus alba, pectore cinereo maculato.

Faun. svec. 251. \*

*Ficedula.* Gesn. av. 384. Aldr. orn. 2. p. 758. Will.

orn. 163. Raj. av. 81. n. 12. Alb. av. 3. p. 25.

t. 26. Briss. av. 3. p. 369.

*Curruca fusca*, alba macula in alis. Frisch. av. t. 22.

*Habitat in Europa.*

*Mandibula superior utrinque emarginata* & latere vibrissata. Orbitæ rufescentes. Remiges secundariæ latere

exteriore albæ. Rectrix 1, 1 latere exteriore longi-

*longitudinali ; 2 , 2 , ad duas tertias ejusdem lateris , albæ.*

alba.

11. *M. pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. Fn. svec. 252. \**

*Motacilla alba. Gesn. av. 618. Aldr. orn. 2. p. 726.*

*Bell. av. 88. 6. Will. orn. 171. t. 42. Raj. av.*

*75. n. 1. Alb. av. 1. p. 49. t. 49. Frisch. av. .*

*t. 23. f. 4. Olin. av. 43. Briss. av. 3. p. 461.*

*Habitat in Europa, ex hybernatione redit prima die germinationis, ad pagos frequens cursitans, irrequieta cauda.*

*Mandibula superior pone apicem utrinque emarginata alba, flava, Ficedulæ; an itaque Muscicapis ad-sociandæ?*

flava.

12. *M. pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. Fn. svec. 253. \**

*Motacilla verna. Briss. av. 3. p. 468.*

*Motacilla flava. Gesn. av. 618. Aldr. orn. 2. p. 729.*

*Will. orn. 172, t. 68. Raj. av. 75. n. 2. Alb. av.*

*2. p. 54. t. 58. Frisch. av. - - t. 23. f. 3. Edw.*

*av. 103. t. 258.*

*Habitat in Europa, uti præcedens, sed magis syl-vatica.*

*Confer. Motacilla cinerea. Will. orn. 172. Raj. av.*

*75. Alb. av. 2. p. 54. t. 58. Edw. av.*

*105. t. 259.*

*Motacilla flava. Briss. av. 3. p. 471. t. 23.*

*f. 3. an solo sexu diversa?*

Tiphia.

13. *M. viridis, subtus flavescens, alis nigris: fasciis duabus albis.*

*Passer viridis indicus. Edw. av. 79. t. 79.*

*Ficedula benghalensis. Briss. av. 3. p. 484.*

*Habitat in Benghala.*

*Fasciæ alarum ex apicibus rectricum albis.*

Stapazi-na.

14. *M. ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.*

*Oenanthe altera. Aldr. orn. 2. p. 763. Will. orn.*

*168. Raj. av. 80.*

*Oenanthe fulva. Edw. av. 31. t. 31.*

*Vitiflora rufa. Briss. av. 3. p. 459.*

*Habitat in Hispania, Italia.*

Conf.



*Conf. Stapazino. Aldr. orn. 2. p. 764. Will. orn. 168. Raj. av. 81.*

*Vitiflora rufescens. Briss. av. 3. p. 457. t. 25. f. 4.*

Oenanthe. 15. *M. dorso cano, fronte alba, oculorum fascia nigra. Fn. svec. 254. \**

*Oenanthe f. Vitiflora. Aldr. orn. 2. p. 762. t. 763. Jonst. av. 123. t. 45. f. 13. Will. orn. 168. t. 41. f. 4. Raj. av. 75. n. 1. Alb. av. 1. p. 53. t. 55. Briss. av. 3. p. 449.*

*Curruca major, pectore subluteo. Frisch. av. t. 22.*

*β. Motacilla subtus pallida, rectricibus introrsum albis, dorso undulato. Fn. svec. 1. n. 219.*

*Oenanthes vitifloræ femina. Alb. av. 3. p. 50. t. 54.*

*Vitiflora grisea. Briss. av. 3. p. 452. t. 21. f. 2.*

*Habitat in Europæ apricis lapidosis; Sexu & ætate varia; cessante nocturno frigore advenit.*

*Femina caret fascia suboculari nigra.*

Rubetra. 16. *M. nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente. Fn. svec. 255. \**

*Rubetra major f. Rubecula. Briss. av. 3. p. 432. t. 24. f. 1.*

*Ficedula 3. aldrovandi. Will. orn. 170. Raj. av. 77.*

*Curruca major altera. Frisch. av. t. 22.*

*Montanellus bononiensium. Aldr. orn. 2. p. 735.*

*Oenanthe secunda Will. orn. 168. Raj. av. 76.*

*Avicula parva. Gesn. av. 796.*

*Todten fogle. Aldr. orn. 2. p. 737.*

*Habitat in Europa usque in Spitsbergam.*

Rubicola. 17. *M. grisea, subtus rufescens, jugulo fascia alba, loris nigris.*

*Rubetra. Aldr. orn. 2. p. 739. t. 740. Alb. av. 1. p. 50. t. 53. Briss. av. 3. p. 428. t. 23. f. 1.*

*Muscipeta. Aldr. orn. 2. p. 734. t. 735. Jonst. av. t. 45.*

*Oenanthe tertia. Will. orn. 169. t. 41. Raj. av. 76.*

*Habitat in Europæ sepibus.*

Atricapilla. 18. *M. testacea, subtus cinerea, pileo obscuro. Faun. svec. 256. \**

*Atricapilla f. Ficedula. Gesn. av. 348. Aldr. orn. 2. p. 756. t. 757. Will. orn. 162. t. 41. Raj.*

*av.*

av. 79. n. 8. *Frisch.* av. t. 23. f. 1. *Olin.* av. 9.  
*Briss.* av. 3. p. 380.

*Habitat in Europa.*

penfylvanica. 19. *M. pileo flavescente, hypochondriis sanguineis.*  
*Motacilla pectore rubro.* *Edw.* av. - - t. 301.

*Habitat in Pennsylvania.*

*Corpus virescens, nigro varium, subtus albicans, lateribus, sub alis, sanguineis. Caput supra albicans. Sub oculis macula nigra, oblonga.*

chrysop- 20. *M. fusca, subtus alba, pileo maculaque alarum luteis, gula nigra.*

*Motacilla alis aureis.* *Edw.* av. - - t. 299.

*Habitat in Pennsylvania.*

*Pileus fulvus. Macula pone oculos gulaque nigra. Linea alba supra infraque oculos. Rectrices alarum luteæ, maculam magnam constituentes.*

coronata. 21. *M. nigro maculata, pileo hypochondriis uropygioque flavis.*

*Motacilla corona aurea.* *Edw.* av. - - t. 298.

*Habitat in Pennsylvania.*

*Corpus dorso, pectore abdomineque adpersum maculis parvis nigris. Fascia alarum duplex alba. Gula alba.*

senegalensis. 22. *M. fusca, remigibus interius rufis, rectricibus nigris apice albis.* *Briss.* av. 3. p. 441.

*Habitat in Senegal.*

varia. 23. *M. albo nigroque maculata, fasciis alarum duabus albis, cauda bifida.*

*Ficedula dominicensis varia.* *Briss.* av. 3. p. 529. t. 27. f. 5.

*Muscicapa fusco & albo varia.* *Sloan. jam.* 2. p. 309. t. 265. f. 1. *Raj.* av. 186.

*Habitat in Jamaica, Dominica.*

capensis. 24. *M. fusca, subtus albida, fascia pectorali fusca, superciliis albis, rectricibus lateralibus oblique albis.*

*Motacilla capitis b. spei.* *Briss.* av. 3. p. 476. t. 25. f. 3.

*Habitat ad Cap. b. spei.*



- icterocephala. 25. *M. grisea*, subtus albida, pileo luteo, fascia oculari nigra, duabusque alaribus flavis.  
*Ficedula canadensis icterocephala. Briss. av. 3. p. 517. t. 27. f. 2.*  
*Habitat in Canada.*
- dominica. 26. *M. cinerea*, subtus alba, macula ante oculos lutea, pone alba, infra nigra.  
*Ficedula dominicensis cinerea. Briss. av. 3. p. 520. t. 27. f. 3.*  
*Muscicapa e cæruleo cinereo fusco luteo varia. Sloan. jam. 2. p. 310. Rai. av. 186.*  
*Habitat in Jamaica, Dominica.*  
*Fascia alarum duplex alba. Gula nigra.*
- canaden. 27. *M. cinerascens*, subtus alba, vertice fasciaque abdominali lutea, pectore fusco maculato.  
*Ficedula canadensis cinerea. Briss. av. 3. p. 524. t. 27. f. 1.*  
*Habitat in Canada.*  
*Fascia alarum duplex alba.*
- madera. 28. *M. viridescens*, subtus albida, gula anoque flavis, spatana. palpebris albis.  
*Ficedula maderaspatensis minor. Briss. av. 3. p. 498. t. 28. f. 2.*  
*Habitat in Madagascar.*
- aurocapilla. 29. *M. olivacea*, subtus alba, vertice aureo, superciliis nigris, pectore nigro maculato.  
*Ficedula pensylvanica aurocapilla. Briss. av. 3. p. 504. Edw. av. 91. t. 252.*  
*Habitat in Pensylvania.*
- petechia. 30. *M. olivacea*, subtus flava rubro guttata, pileo rubro.  
*Ficedula pensylvanica erythrocephalos. Briss. av. 3. p. 488. Edw. av. 5. p. 99. t. 256. f. 2.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Cauda integra.*
- dumetorum. 31. *M. cinereo-fusca*, capite cærulescente, gula pectorum. reque albis. *Kram. aust. 377. t. - - n. 19.*  
*Curruca tertia Gefner.*  
*Habitat in Europa.*

- cinnamo- 32. *M. cana*, subtus coccinea, gula nigra, remigibus  
mea. quatuor primis basi rubris.  
*Habitat in Zeylona. D. Lothen.*  
Simillima *M. Erithaco*. Corpus supra canum. Gula  
nigra. Coccinea sunt Pectus, Abdomen, Uropygium.  
Remiges nigrae, exceptis quatuor primis basi ru-  
bris, unde macula alarum rubra, in altero sexu.  
Rectrices nigrae, sed quatuor intermediae latere ob-  
lique rufae.
- Caprata. 33. *M. nigra* uropygio crisso maculaque tectricum ala-  
ri albis.  
Rubetra lucionensis. *Briss. av. 3. p. 442. t. 24. f.*  
*2, 3.*  
*Habitat in Lucionensi insula.*  
Femina caret macula alarum alba, e tectricibus in al-  
tero sexu facta.
- Phoeni- 34. *M. gula nigra*, abdomine caudaque rufis, capite dor-  
curus. soque cano. *Fn. svec. 257.\**  
Ruticilla. *Gesn. av. 729. Aldr. orn. 2. p. 746. t.*  
*746, 747. Will. orn. 159. Raj. av. 78. n. 5.*  
*Alb. av. 1. p. 48. t. 50. Briss. av. 3. p. 403.*  
Rubecula gula nigra. *Frisch. av. t. 19.*  
β. Motacilla *Titys* remigibus nigricantibus, rectricibus  
rufis: intermedio pari nigro extrorsum rufescente.  
*Fn. svec. 1. n. 227. femina est.*  
*Habitat in Europæ muris, egregie cantillans.*  
Femina diverso colore, exceptis Pedibus Rostroque nigris,  
Caudaque rufescente. *Kram. austr. 376.*
- Eritha- 35. *M. dorso* remigibusque cinereis, abdomine rectrici-  
cus. busque rufis: extimis duabus cinereis. *Faun. svec.*  
*258.\**  
Phoenicurus. *Gesn. av. 3. p. 409. Will. orn. 160.*  
*Raj. av. 78. n. 2. Frisch. av. - - t. 20. Briss.*  
*av. 3. p. 409.*  
Phoenicurus alter. *Aldr. orn. 2. p. 748.*  
*Habitat in Europa.*
- Guira. 36. *M. viridis*, subtus lutea, genis gulaque nigris linea  
lutea cinctis.  
*Sylvia brasiliensis viridis. Briss. av. 3. p. 533.*



Guira-guacu-beraba. *Marcgr. bras.* 212. *Will. orn.* 173. t. 41. *Raj. av.* 83. n. 10. *Edw. av.* 3. p. 293. t. 351.

*Habitat in Brasilia.*

*svecica.* 37. *M. pectore ferrugineo fascia cærulea, rectricibus fuscis versus basin ferrugineis.* *Fn. svec.* 259. \*

*Motacilla pectore cæruleo : macula flavescente albedine cincta.* *Fn. svec.* 1. n. 220.

*Cyanecula.* *Briss. av.* 3. p. 413.

*Wegflecklin.* *Gesn. av.* 796. *Aldr. orn.* 2. p. 749. *Will. orn.* 160. *Raj. av.* 78.

*Ruticilla gutture cæruleo.* *Edw. av.* 28. t. 28.

*Phoenicurus pectore cæruleo.* *Frisch. av.* 3. t. 19. f. 3, 4.

*Wydengyckerlin.* *Gesn. av.* 796.

*Habitat in Europæ alpinis : in Svecia, Pyrenæis.*

*Sialis.* 38. *M. supra cærulea, subtus tota rubra, abdomine albo.* *Rubecula dorso cæruleo.* *Catesb. car.* 1. p. 47. t. 47. *Edw. av.* 24. t. 24.

*Rubecula carolinensis.* *Briss. av.* 3. p. 423.

*Avis cærulea.* *Kalm. it.* 3. p. 30.

*Habitat in Bermudis & America septentrionali.*

*Remiges primores apice nigrae, sed summo apice lutescentes.*

*fulicata.* 39. *M. nigro-violacea, crisso castaneo, macula tectricum alba.*

*Rubetra philippensis.* *Briss. av.* 3. p. 444. t. 23. f. 2.

*Habitat in Philippinis.*

*cayana.* 40. *M. cærulea, capistro humeris alis caudaque nigris.*

*Sylvia cayanensis cærulea.* *Briss. av.* 3. p. 534. t. 28. f. 1.

*Elotototl.* *Hern. mex.* 54. *Raj. av.* 170. n. 4.

*Habitat in Mexico.*

*Velia* 41. *M. cærulea, ventre uropygioque fulvis.*

*Muscicapa cærulea, ventre rubro.* *Edw. av.* 22. t. 22.

*Sylvia surinamensis cærulea.* *Briss. av.* 3. p. 536.

*Habitat Surinami.*

*canaden-* 42. *M. supra cærulea subtus alba, jugulo remigibus re-*  
*lis.* *ctricibusque nigris.*

*Ficedula canadensis cinerea major.* *Briss. av. 3. p. 527. t. 27. f. 6. Edw. av. 5. t. 252. f. 1.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Remiges primores basi albæ, unde macula alarum. Rectrices 1, 2, 3 basi apiceque albæ; 4, 5 apice albæ.*

cærulea. 43. *M. supra cærulea, subtus alba, alis caudaque nigris. Motacilla parva cærulea. Edw. av. - - t. 302. Habitat in Pennsylvania construens nidum artificiosissimum. Rectrices laterales albæ.*

Sibilla. 44. *M. nigricans, subtus alba, pectore rufo, macula alarum alba. Rubetra madagascariensis. Briss. av. 3. p. 439. t. 24. f. 4. Habitat in Madagascar. Egregie sibilat.*

Rubecula. 45. *M. grisea, gula pectoreque ferrugineis. Fn. svec. 260. \* Rubecula s. Erithacus. Gesn. av. 729. t. 730. Aldr. orn. 2. p. 741. t. 742. Will. orn. 160. t. 38. Raj. av. 78. n. 3. Alb. av. 1. p. 49. t. 51. Frisch. av. 3. t. 19. f. 2. Olin. av. 16. Briss. av. 3. p. 418. Habitat in Europa, approximante hyeme redit in Galliam, delectatur Evonymi Seminibus, egregie cantillat, valde pugnax: non una arbor capit duos Erithacos. Rostrum cingit color ferrugineus. Rectrices angulo acuto terminatæ.*

Troglodytes. 46. *M. grisea, alis nigro cinereoque undulatis. Fn. svec. 261. \**

*Passer troglodytes. Gesn. av. 651. Aldr. orn. 2. p. 654. t. 42. Will. orn. 164. t. 42. Raj. av. 80. Alb. av. 1. t. 53. f. B.*

*Trochilus remigibus tessellatis. Frisch. av. - - t. 24. f. 3.*

*Regulus. Briss. av. 3. p. 425.*

*Habitat in Europa, nidificat sub terra.*

*Rostrum acutum, vix manifeste arcuatum, integerrimum. Nares nude. Corpus griseum. Remiges latere exteriori fasciis minimis numerosis fuscis: sed 1, 2, 3 latere exteriori maculis inter fascias albis. Cauda rotundata fasciis transversis fuscis.*

Calendula. 47. *M. cinereo-virens, linea verticali flavissima, abdomine alisque subtus flavescentibus.*



*Calendula pensylvanica.* Briss. av. 3. p. 584. Edw. av. 95. t. 254. f. 2.

*Habitat in Pennsylvania.*

*Corpus cinereo-virens, magnitudine Ligurini s. dupla Reguli. Verticis linea angusta, flavissima. Abdomen virenti-flavescent. Remiges & Rectrices fuscescentes margine exteriori pallescente.*

**Regulus. 48.** *M. remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, vertice luteo. Fn. svec. 262. \**

*Regulus cristatus.* Will. orn. 163. t. 41. Raj. av. 79. n. 9. Alb. av. 1. p. 51. t. 53. Aldr. orn. 2. p. 649. Frisch. av. - - - t. 24. f. 4. Catesb. car. 3. p. 13. t. 3. Olin. av. 6.

*Calendula.* Briss. av. 3. p. 579.

*Habitat in Europa.*

**Trochilus. 49.** *M. cinereo-virens, alis subtus tectricibus flavescens, superciliis luteis. Faun. svec. 264. \**

*Regulus non cristatus.* Aldr. orn. 2. p. 653. t. 654. Will. orn. 164. t. 42. Raj. av. 80. n. 10. Alb. av. 2. p. 55. t. 59. f. A. Frisch. av. - - t. 24. f. 2.

*Asilus.* Gesn. av. 223. Aldr. orn. 2. p. 657. Will. orn. 164. Briss. av. 3. p. 479.

**β. Motacilla Acredula.** Fn. svec. 1. n. 237.

*Habitat in Europa, Asia, America.*

*Conf. Oenanthe fusco-lutea minor.* Sloan. jam. 2. p. 310. Raj. av. 186. Catesb. car. 1. p. 63. t. 63. Edw. av. 2. p. 142. t. 278. f. 1. an magis flava e climate calidiore?

*Alæ subtus sulphureæ tectricibus, non remigibus. Gula & Pectus ex albo-flavescentes.*

**115. PIPRA.** *Rostrum capite brevius, basi subtri-  
gonum, integerrimum, apice in-  
curvum.*

*Pedes gressorii.*

**Rupicola. 1.** *P. crista erecta margine purpurea, corpore croceo, tectricibus rectricum truncatis,*

*Rupicola.* Briss. av. 4. p. 437. t. 34. f. 1. Edw. av. t. 264. f. 2.

*Gallus ferox saxatilis.* Barr. equ. 132.

*Habitat in Surinamo, Guiana.*

*Magnitudo Columbæ. Testrices caudæ elongatæ, truncatæ.*

- Pareola. 2. *P. crista sanguinea, corpore nigro, dorso cæruleo.*  
*Manacus cristatus niger. Briss. av. 4. p. 459. t. 35. f. 1.*  
*Parus dorso cæruleo. Edw. av. 2. p. 169. t. 261. f. 1.*  
*Tije-guacu. Marcgr. bras. 312. Will. orn. 159.*  
*Habitat in Brasilia, Cayana.*
- cristata. 3. *P. crista lutea, corpore purpureo.*  
*Manacus cristatus ruber. Briss. av. 4. p. 462.*  
*Avis picicitli. Seb. mus. 1. t. 59. f. 4.*  
*Habitat in Brasilia.*
- Rubetra. 4. *P. crista lutea, corpore testaceo, remigibus rectricibusque cæruleis.*  
*Manacus cristatus rufus. Briss. av. 4. p. 461.*  
*Avis americana cristata Rubetra. Seb. mus. 1. t. 102. f. 4.*  
*Habitat in America.*
- albifrons. 5. *P. crista alba, corpore testaceo, dorso nigro.*  
*Manacus facie alba. Edw. av. - - - t. 344. f. inferior.*  
*Habitat - - -*  
*Corpus testaceum uti Cauda & Uropygium. Dorsum Aleque nigræ. Pileus e crista decumbente alba. Gula alba, nigro marginata. Femora cærulescentia.*
- erythrocephala. 6. *P. nigra, capite armillisque fulvis.*  
*Parus erythrocephalus. Syst. nat. 10. p. 191.*  
*Manacus auro-capillus. Briss. av. 4. p. 448. t. 34. f. 2.*  
*β. Manacus rubro-capillus. Briss. av. 4. p. 450.*  
*Tangaræ species 2. Marcgr. bras. 215. Will. orn. 177. Raj. av. 84.*  
*Avicula mexicana altera. Seb. mus. 1. t. 60. f. 8.*  
*Habitat in Brasilia, frequens in Zea.*
- Aureola. 7. *P. nigra, capite pectoreque coccineis, remigibus anteriorum macula alba. Mus. Ad. Fr. 2. p. 32. \**  
*Parus Aureola. Syst. nat. 10. p. 191.*  
*Parus ruber & niger. Edw. av. 2. p. 109. t. 261.*  
*Manacus ruber. Briss. av. 4. p. 452 t. 34. f. 3.*  
*Avicula surinamensis. Pet. gaz. t. 46. f. 12.*  
*β. Manacus aurantius. Briss. av. 4. p. 454.*



## AVES. PASSERES. Pipra.

*Manacus niger & fulvus.* Edw. av. 83. t. 83.  
*Habitat in America australi.*

leucocephala. 8. *P. nigra*, capite albo. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 33. \*  
*Habitat Surinami.*

leucocilla. 9. *P. atra*, pileo albo. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 33. \*  
*Parus Pipra.* *Syst. nat.* 10. p. 190.  
*Manacus albo-capillus.* *Briss. av.* 4. p. 446. t. 35. f. 2.  
*Habitat in Brasilia, Surinamo, in arundinetis egregie cantillans.* *Dahlberg.*

gutturalis. 10. *P. nigra*, gula alba.  
*Manacus gutture albo.* *Briss. av.* 4. p. 444. t. 36. f. 1.  
*Habitat in America.*

serena. 11. *P. nigra*, fronte alba, uropygio cyaneo, ventre fulvo.  
*Manacus alba fronte.* *Briss. av.* 457. t. 36. f. 2.  
*Habitat in Cayana, Surinamo.*

Manacus. 12. *P. nigra*, subtus alba, macula cervicis alarumque albis.  
*Manacus niger.* *Edw. av.* 117. t. 260.  
*Manacus.* *Briss. av.* 4. p. 442.  
*Habitat in America.*

minuta. 13. *P. grisea*, capite nigro albo-punctato. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 34. \*  
*Motacilla minuta.* *Syst. nat.* 10. p. 189.  
*Habitat in Indiis.*

## 116. PARUS. *Rostrum* integerrimum, basi fetis tectum.

*Lingua* truncata, fetis terminata.

bicolor. 1. *P. capite cristato* antice nigro, corpore cinereo, subtus exalbido-rufescente.  
*Parus cristatus.* *Catesb. car.* 1. p. 57. t. 57. *Briss. av.* 3. p. 561.  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Tempora circum oculos, Gula, Collum, Pectus, Abdomen rufescentia sunt.*

cristatus. 2. *P. capite cristato*, collari nigro, ventre albo. *Faun. svec.* 266. \*

Parus cristatus. *Gesn. av. 642. f. med. Aldr. orn. 2. p. 723. Will. orn. 175. t. 43. Raj. av. 74. n. 6. Alb. av. 2. p. 53. t. 57. f. 2. Frisch. av. - - t. 14. f. 2. Briss. av. 3. p. 558.*  
*Habitat in Europa.*

major. 3. *P. capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. Fn. svec. 265. \**

Parus major. *Gesn. av. 640. Bell. av. 95. a. Aldr. orn. 2. p. 713. Will. orn. 174. Raj. av. 73. n. 3. Alb. av. 1. p. 44. t. 46. Frisch. av. 3. t. 13. f. 1, 2. Olin. av. 28. Briss. av. 3. p. 539.*  
*Habitat in Europa; æstate frequens in Hispania.*

americana- 4. *P. cærulescens, temporibus pectore dorsoque flavescen-*  
 nus. *tibus, hypochondriis purpurascens.*  
*Parus fringillago. Catesb. car. 1. p. 64. t. 64.*  
*Ficedula carolinensis cinerea. Briss. av. 3. p. 522.*  
*Habitat in America septentrionali.*

cæruleus. 5. *P. remigibus cærulescentibus: primoribus margine ex-*  
*teriore albis, fronte alba, vertice cæruleo. Fn. svec. 267. \**

Parus cæruleus. *Bell. av. 96. a. Gesn. av. 641. Aldr. orn. 2. p. 721. Will. orn. 175. Frisch. av. 3. t. 14. f. 1. Raj. av. 74. Alb. av. 1. t. 47. Briss. av. 3. p. 544.*  
*Habitat in Europa.*

atricapil- 6. *P. pileo gulaque nigris, corpore cinereo, subtus albo.*  
 lus. *Parus atricapillus canadensis. Briss. av. 3. p. 553. t. 29. f. 1.*  
*Habitat in Canada.*

ater. 7. *P. capite nigro, dorso cinereo, occipite pectoreque*  
*albo. Faun. svec. 268. \**

Parus ater. *Gesn. av. 641. Aldr. orn. 2. p. 723. Will. orn. 175. t. 43. Raj. av. 73. n. 2. Frisch. av. 3. t. 13. f. 3.*  
*Parus atricapillus. Briss. av. 3. p. 551.*  
*Habitat in Europa.*

palustris. 8. *P. capite nigro, dorso cinereo, temporibus albis. Fn. svec. 269. \**



*Parus palustris.* *Gesn. av.* 642. *Aldr. orn.* 2. p. 722.  
*Will. orn.* 175. t. 43. *Raj. av.* 73. n. 3. *Alb.*  
*av.* 3. p. 54. t. 58. *Frisch. av.* 3. t. 13. f. 4.  
*Briss. av.* 3. p. 555.  
*Habitat in Europa.*

virginia- 9. *P. uropygio luteo*, corpore cinereo.  
 nus. *Parus uropygio luteo.* *Catesb. car.* 1. p. 58. t. 58.  
*Parus virginianus.* *Briss. av.* 3. p. 575.  
*Habitat in America septentrionali.*

peregrini- 10. *P. uropygio coccineo*, corpore cinereo, subtus albo.  
 nus. *Habitat - - -*  
*Corpus magnitudine P. majoris, cinereum, subtus totum*  
*album. Uropygium coccineum. Remiges fuscae. Re-*  
*ctrices omnes nigrae, exceptis quatuor intermediis,*  
*postice oblique luteis, ita tamen ut luteus color præ-*  
*valeat in 55, non vero in 66.*

caudatus. 11. *P. vertice albo*, cauda corpore longiore. *Fn. svec.*  
 83. t. 1. f. 83. \*  
*Parus caudatus.* *Gesn. av.* 642. fig. infima. *Aldr.*  
*orn.* 2. p. 715. t. 716. *Will. orn.* 176. t. 43.  
*Raj. av.* 74. n. 8. *Alb. av.* 2. p. 53. t. 57. f. 1.  
*Frisch. av.* - - t. 14.  
*Parus longicaudus.* *Briss. av.* 3. p. 571.  
*Habitat in Europa.*  
*Cauda singulari methodo cuneiformis inæqualis.* *Briss.*

biarmi- 12. *P. vertice cano*, cauda corpore longiore, capite bar-  
 cus. bato. *Faun. svec.* 84. \*  
*Parus barbatus.* *Briss. av.* 3. p. 567. *Frisch. av.* - - t. 8.  
*Parus beardmanicus.* *Alb. av.* 1. p. 40. t. 48.  
*Lanius minimus.* *Edw. av.* 55. t. 55.  
*Pendulinus.* *Kram. aust.* 373. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Cauda cuneiformis. Mystaces e lori pennis nigris elon-*  
*gatis.*

Penduli- 13. *P. capite subferrugineo*, fascia oculari nigra, remigi-  
 nus. bus rectricibusque fuscis margine utroque ferrugineo.  
 Pa-

---

*Affinitas Parorum cum Laniis Picisque constat variis indiciis: quod Rostrum*  
*validum, cultratum, basi setis tectum, alimenta frustulatim devorans; quod-*  
*que P. major inclusus caveis cerebra passerum extrahit; quibus accedit vox*  
*garrula modusque volandi.* *Kramer.* 330.

Parus polonicus f. Pendulinus. *Briss. av. 3. p. 565.*

Parus minimus Remiz. *Titius lips. 1755. dissertatio.*

Pendulinus. *Act. bonon. 2. 2. p. 57. t. 7. \**

Parus montanus. *Alb. av. 3. p. 53. t. 59.*

Remiz. *Raczynsk. polon. 1. p. 294.*

*Habitat in Polonia, Hungaria, Italia: ædificat nidum pendulum e pappo Populi Typhæque cum introitu laterali.*

*Convenit Pendulinus cum biarmico in plurimis, ( an solo sexu differant ) consentiente Kramero? uterque genere nimis affinis Laniis.*

Cela. 14. P. niger, rostro albo, macula alarum basique caudæ flavis.

*Habitat in Indiis.*

117. HIRUNDO. *Rostrum minimum, incurvum, subulatum, basi depressum. Rictus capite amplior.*

rustica. 1. H. rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis. *Fn. 270. \**

Hirundo domestica. *Gesn. av. 548. Aldr. orn. 2. p. 658. t. 662. c. 6. Jonst. av. 115. t. 42. Will. orn. 155. t. 39. Raj. av. 71. n. 1. Alb. av. 1. p. 43. t. 45. Frisch. av. - - - t. 18. f. 1. Briss. av. 2. p. 486.*

*Habitat in Europæ domibus intra tectum; unaque cum urbica autumnò demergitur, vereque emergit; dum volitat juxta terram s. aquam pluvias præsagit.*

esculenta. 2. H. rectricibus omnibus macula alba notatis.

Hirundo nidis edulibus. *Bont. jav. 66. Will. orn. 157. Raj. av. 72.*

Capus marina. *Rumph. herb. 6. p. 183. t. 75. f. 4. Olear. mus. 25. t. 14. f. 2, 6.*

Hirundo riparia cochinchinensis. *Briss. av. 2. p. 510. t. 46. f. 2.*

*Habitat in China ad ripas, nidis gelatinosis esculentis, factis e Molluscis. Kæmpf. amæn. 833.*



- urbica. 3. *H. rectricibus immaculatis, dorso nigro-cærulescente, tota subtus alba.* *Fn. svec. 271. \* It. æl. 41.*  
*Hirundo agrestis s. rustica.* *Gesn. av. 564. Aldr. orn. 2. p. 693. Will. orn. 155. Raj. av. 71. n. 2. Alb. av. 2. p. 52. t. 55. f. A. Frisch. av. 3. t. 17. f. 2.*  
*Habitat in Europa, extra domorum parietes sub tecto, redit die 1 frondescentiæ: venit venit Hirundo, pulchra tempora adducens & pulchros annos.* *Hesych. Nidificat mox; sæpe Fringilla domestica occupat nidum confectum, at hirundo convocatis sociis, dum aliæ custodiunt hostem captivum, aliæ argillam adducunt, introitum arcte claudit, avolat relicto hoste suffocato.*
- riparia. 4. *H. cinerea, gula abdomineque albis.* *Fn. svec. 273. \**  
*Hirundo riparia s. Drepanis.* *Gesn. av. 656. Aldr. orn. 2. p. 694. t. 695. Will. orn. 156. t. 39. Raj. av. 71. n. 3. Alb. av. 2. p. 52. t. 56. f. B. Frisch. av. - - t. 18. f. 2. Briss. av. 2. p. 506.*  
*Habitat in Europæ collibus arenosis abruptis, foramine serpentino.*
- purpurea. 5. *H. violacea tota, cauda forficata*  
*Hirundo purpurea.* *Catesb. car. 1. p. 51. t. 51. Kaln. it. 3. p. 88.*  
*Hirundo apus carolinensis.* *Briss. av. 2. p. 515.*  
*Habitat in America septentrionali ad domos; indicat Gal-  
linis appropinquantem Accipitres.*
- Apus. 6. *H. nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis.* *Fn. svec. 272. \**  
*Hirundo Apus.* *Bell. av. 100. a. Gesn. 166. Aldr. orn. 2. p. 698. t. 699. Jonst. av. 119. t. 42. Will. orn. 156. t. 39. Raj. av. 72. n. 4. Alb. av. 2. p. 51. t. 55. Frisch. av. 3. t. 17. f. 1. Briss. av. 2. p. 512.*  
*Habitat in Europæ altis. In terram decidens non evolat; capitur hamo Cicadæ inserto. Bell. 16. Hybernatur in Templorum foraminibus.*  
*Rectrices huic decem.*
- Subis. 7. *H. nigro - cærulescens, ore subtusque cinereo-exalbida.*  
*Hirundo cærulea canadensis.* *Edw. av. 120. t. 120.*

*Hirundo freti hudsonis.* Briss. app. 56.  
*Habitat ad sinum Hudsonis.*

- senega- 8. *H. nigra nitens, subtus rufa.*  
lensis. *Hirundo senegalensis.* Briss. av. 2. p. 496. t. 45. f. 1.  
*Habitat in Senegal.*
- Tapera. 9. *H. rectricibus æqualibus, corpore nigricante, subtus albo.*  
*Hirundo americana, Tapera.* Sloan. jam. 2. p. 212.  
*Will. orn. 157. Raj. av. 72. Briss. av. 2. p. 502.*  
*t. 45. f. 3.*  
*Tapera. Marcgr. bras. 205. Raj. av. 185.*  
*Habitat in America.*  
*Cauda integra. Alba sunt Gula, Crissum, Rachis sub-*  
*tus remigum; Abdomen.*
- Pelasia. 10. *H. rectricibus æqualibus apice nudo subulatis.*  
*Hirundo, cauda aculeata, americana.* Catesb. car. 3.  
*p. 8. t. 8. Kalm. it. 87. Briss. av. 2. p. 501.*  
*Habitat in Americæ caminis ædium.*  
*Conf. Hirundo martinicana. Briss. av. 2. p. 499. t. 45. f. 2.*
- Melba. 11. *H. fusca, gula abdomineque albis.*  
*Hirundo riparia maxima.* Edw. av. 27. t. 27. Klein.  
*av. 83.*  
*Hirundo major hispanica.* Briss. av. 2. p. 504.  
*Habitat ad fretum Herculeum.*
- Pratinco- 12. *H. femoribus seminudis.*  
la. *Hirundo marina.* Aldr. orn. 2. p. 696. t. 697. Will.  
*orn. 156. \**  
*Hirundo riparia.* Mars. dan. 5. p. 96. t. 46.  
*Pratincola.* Kram. austr. 381. t. 1.  
*Glareola.* Briss. av. 5. p. 141. t. 12. f. 1.  
*Gallinula erythropus minor.* Gesn. av. 513. Aldr.  
*orn. 3. p. 454.*  
*Habitat ad littora Europæ australioris; in Austriæ pra-*  
*tis apricis.*  
*Media quasi inter Hirundines & Grallas. Corpus*  
*supra brunneum, subtus album, magnitudine Turdi.*  
*Gulam dilute testaceam cingit linea nigra per oculos*  
*ad aures ducta. Remiges fusce, longæ. Cauda fu-*  
*sca, longa, maxime forficata. Rostrum nigrum ba-*  
*si coccineum. Pedes plumbei (Kram.) aut sangui-*  
*nei. (Briss.)*



118. CAPRIMULGUS. *Rostrum* modice incurvum,  
minimum, subulatum,  
basi depressum.

*Vibrissæ* ad os serie ciliari.

*Rictus* amplissimus.

*Lingua* acuta, intergerrima.

europæus. 1. *C. narium* tubis obsoletis. *Faun. svec.* 274. \* *Penn. brit. I. R.*

*Hirundo* cauda integra, ore setis ciliato. *Faun. svec.*  
1. n. 248.

*Caprimulgus.* *Bell. av.* 28. a. *Gesn. av.* 242. *Aldr. orn.* 1. p. 567. t. 569. *Jonst. av.* 53. t. 20. *Will. orn.* 70. t. 14. *Raj. av.* 26. n. 1. *Alb. av.* 1. p. 10. t. 10. *Frisch. av.* - - t. 101. *Catesb. car.* 1. p. 8. t. 8. *Briss. av.* 2. p. 470. t. 44.

β. *Caprimulgus minor americanus.* *Catesb. car.* 3. p. 16. t. 16. *Edw. av.* 63. t. 63. *Kalm. it.* 3. p. 93.

*Habitat* in Europa & America. *Nocturna* viſitat  
*Phalænis* & *inſectis nocturnis.* *Nidus* orbiculatus e lu-  
to inter rupes. *Carpere* dicuntur lactantia viscera ro-  
stris. *Ovid. fast.* 6.

Varietatem β. judico ex macula alarum & rectricum,  
ut in europæa ave.

*Mystaces* ex setis 8, pectinatim utrinque mandibulæ su-  
periori insertis, rostro longioribus. *Mas* remige 2  
& 3 macula magna alba in medio. *Rectrice* 1 &  
2 apice albo.

americana- 2. *C. narium* tubulis eminentibus.  
nus.

*Caprimulgus* s. *Noctua sylvatica jamaicensis.* *Sloan. jam.* 2. p. 298. t. 255. f. 1. *Raj. av.* 130.

*Caprimulgus jamaicensis.* *Briss. av.* 2. p. 480.

*Hirundo* major subfusca miscella, macula alba sphaeri-  
ca in utraque ala. *Brown. jam.* 467.

*Habitat* in America calidiore, *Nocturna.*

*Rectrices* tantum decem, ut in præcedenti.

CLAS-

---

*Caprimulgus* genere differt ab *Hirundine*, uti *Strix* a *Falcone*, *Phalæna* a  
*Papilione*; *Cauda* constat rectricibus 10, *Hirundinis* vero 12. *Unguis* in-  
termedius introrsum ciliatus; *Digitus* lateralis membranula medio annexus.  
*Aures* amplissimæ.

## CLASSIS III.

## AMPHIBIA.

---

*Terribilia sunt opera Tua, o Domine!*

*In multitudine virtutis Tuæ Te metientur contemptores Tui.*

---

**PESSIMA**, tetra, nuda, frigida æstuantium Animalia Corde uniloculari uniaurito, Pulmonibus arbitrariis, Pene duplici dignoscuntur.

**AMPHIBIA**, pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido, Sceletto cartilagineo, Vita tenaci, Cute nuda, Facie torva, Obtutu meditabundo, Odore tetro, Sono rauco, Loco squalido, Veneno horrendo; non itaque in horum numerum sese jactavit eorum Auctor.

**POLYMORPHA** in his Amphibiis natura duplicem vitam plerisque concessit: Aliis *Metamorphosin* subire, aliis *Senectam* exuere; aliis *Ova* nasci, aliis *nudos* foetus parere; aliis in *sicco humidoque* promiscue vivere, aliis dimidio anno *hyemare*; aliis Pulmonibus tantum, aliis etiam Branchiis *respirare*; aliis prædam nifu astute assequi, aliis fascino quasi eandem in fauces revocare.

**REPTILES** pedati, auribus plano-denudatis absque auriculis, variam vitam ex structura agunt: *Testudines* muniuntur Testa; *Dracones* evolant Alis; *Lacertæ* fugiunt Pedibus; *Ranæ* absconduntur Loco; nec omnes Veneno prorsus carent, ut Bufo, Salamandra, Gecko.

**SERPENTES** apodes, absque *Auribus* surdos, a Piscibus separant Pulmones, Ovorum catena, Penisque duplex muricatus, affinitas denique cum Lacertis tanta, ac Lacertarum cum Ranis, vixque limites admittens. Hos nuda in terra reiectos, artuum ministerio expertes, omnium injuriæ expositos, armavit Natura conservatrix suis armis, horrentibus execrabili Veneno, pessimorum pessimo; in diversis diverso. Sunt autem hæc Te-  
la

---

*Amphibia ossibus cartilagineis, circulatione tardiore, vesiculis pulmonum majoribus, non transpirant diutius abstemia.*



la dentibus simillima, sed extra maxillam superiorem collocata, proque lubitu exserenda & retrahenda, sacculo affixa sinistri, quam vulnere inflant in sanguinem, tum diri effectus causant, cæterum inertem; sicque Catonia hæc morfu virus habent, & fatum dente minantur, pocula morte carent, prout scribitur lide *Redi*. Ne vero hi spoliati miserique armis, quæ ipsis succurrerent, nimium sævirent, decimam quamque tantum speciem armavit (♂) imperans, sed versipelles eos voluit, ut dubium omnes metuerentur ab omnibus; at Beneficus Homini dedit Indis *Ichneumonem* cum *Ophiorhiza*, Americanis *Suem* cum *Senega*, Europæis *Ciconiam* cum *Olea*. Venenatos Serpentes *Marfil* *Psyllique* Arabiæ & Americæ excantant *Aristolochiam*. Speciebus teste *Jacquino* & *Forskohlio*. vide *Amæn. acad.* 6. p. 197.

**DIAGNOSIN**, qui velit horum, eandem desumat a Pedum succedaneis *Scutis abdominalibus caudalibusque*; ne vero numerus alteri demtus alterique additus seducat, juvat etiam utrumque connumeratus (*Act. stockh.* 1752. p. 206;) ab ano utriusque Longitudo illustrat, & Color in nonnullis; cave vero, ne renata sit mutilata Cauda.

**NANTES** pinnatos aquaticos (*Chondropterygios* cartilagineos dictos Pisces) Amphibiorum classem nunc subire jubent *Pumone* (\*) arbitrarii, latere etiam Branchiis, non liberis sed adnatis, respirantes; Maresque Pene duplici insidentes *Minis*, ovis concatenatis foetis, foedaque Cutis, Ossaque cartilaginea, cætera. Neque hi omnes Toxico expertes, testatur *Patinaca*, *Torpedine*, *Tetrodonte*.

**AMPHIBIOLOGI** omnium paucissimi sunt, nullique veri.

*Seba* numero stupendo sibi ignota pulchre collegit & delineavit, sed multiplicavit, minimeque descripsit. *Catesbæus* non paucos Serpentes pulchrius delineavit, quam notavit. *Gronovius* & *Garden* verum horum numerum auxerunt.

CHA-

(\*) Branchiæ horum pectinatae ut Piscium, sed adnatæ vasi arcuato cylindrico tubuloso, absque radio osseo, nec piscium similes, nisi externa figura; Branchiostegorum piscium propria structura, eorum larvæ singulares, foetus fissi extra ovum, defectus pinnarum ventralium mihi persvasere literis, a D. *Garden* in America habitante, petere, vellet dissecare *Diodontis* respiratoris organa & inquirere numne Pulmones haberent; stupefactus ipse dissectis piscibus, reperitque & Branchias externas, & pulmones internos, quos descriptos & conservatos remisit, unde constitit eos annumerandos Nantibus.

## CHARACTERES AMPHIBIORUM.

## I. REPTILES pedati, spirantes ore:

119. TESTUDO *Corpus Testa munitum.*  
 121. DRACO *Corpus Alis volatile.*  
 122. LACERTA *Corpus (Testa Alisve) nudum, caudatum.*  
 120. RANA *Corpus similiter nudum, ecaudatum.*

## II. SERPENTES apodes, spirantes ore:

123. CROTALUS *Scuta Abdominalia Caudaliaque cum Crepitaculo.*  
 124. BOA *Scuta Abdominalia Caudaliaque absque Crepitaculo.*  
 125. COLUBER *Scuta Abdominalia; Squamæ Caudales.*  
 126. ANGUIS *Squamæ Abdominales Caudalesque.*  
 127. AMPHISBÆNA *Annuli Abdominales Caudalesque.*  
 128. COECILIA *Rugæ nudæ laterales.*

## III. NANTES pinnati: spirantes etiam Branchiis lateralibus.

\* *Spiracula composita s. plura.*

129. PETROMYZON *Spiracula 7 lateralia.*  
 130. RAJA *Spiracula 5 subtus.*  
 131. SQUALUS *Spiracula 5 lateralia.*  
 132. CHIMÆRA *Spiracula 1 quadrifida.*

\* \* *Spiracula solitaria.*

133. LOPHIUS *Pinn. Ventrals 2. Os denticulatum.*  
 134. ACIPENSER *Pinn. Ventrals 2. Os edentulum.*  
 139. CYCLOPTERUS *Pinn. Ventrals 2. in orbiculum digestæ.*  
 135. BALISTES *Pinn. Ventrals 1. carinæ instar posita.*  
 136. OSTRACION *Pinn. Ventrals 0. Corpus lorica ossea.*  
 137. TETRODON *Pinn. Ventrals 0. Abdomen muricatum.*  
 138. DIODON *Pinn. Ventrals 0. Corpus aculeatum.*  
 140. CENTRISCUS *Pinn. Ventrals x. Corpus spina loricatum.*  
 141. SYNGNATHUS *Pinn. Ventrals 0. Corpus articulatum.*  
 142. PEGASUS *Pinn. Ventrals 2. Rostrum ciliato-dentatum.*



## I. REPTILES.

*Os respirans pulmonibus.**Pedes quatuor.*

119. TESTUDO. Corpus tetrapodum, caudatum.  
testa obtectum.

Os mandibulis nudis, edentulis.

coriacea. 1. T. pedibus pinniformibus muticis, testa coriacea, cauda angulis septem exaratis.

Testudo coriacea. Vandell. ad Linn. Patav. 1761. 4.

Testudo coriacea s. mercurii. Rond. pisc. 450. Gesn. aqu. 946.

Habitat in Mari mediterraneo, Adriatico rarius.

Testa non tecta scutellis, sed corio, pluribus angulis dorsata.

imbricata. 2. T. pedibus pinniformibus, testa cordata subcarinata serrata: scutellis imbricatis, cauda squamata. Gron. zooph. 72.

Bont. jav. 82. Testudo squamata.

Tetre antill. 2. p. 229. n. 24. Caret.

Raj. quadr. 258. Testudo Caretta.

Habitat in Mari Americano, Asiatico.

Lamellæ artificum ex hac desumuntur.

Mydas. 3. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binis, plantarum solitariis, testa ovata.

Amæn. acad. 1. p. 138. Testudo unguibus acuminatis: palmarum duobus, plantarum unico.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 50. Testudo atra.

Osb. iter. 293.

Gesn. quadr. 78. Testudo marina.

Aldr. quadr. 712. t. 714.

Grew. mus. 38. t. 3. f. 4?

Olear.

TESTA Testudinum constat duabus laminis coadunatis: Superiore dorsali, costis inædificata, obtecta scutellis disci 13, marginis 24.

Inferiore e sterno explanato, antice obtuso, postice emarginato, Suturis in scutella diviso. Apertura testæ anterior pro capite & brachiis; posterior pro cauda & femoribus. Pedes in marinis pinniformes, submutici; in terrestribus fissi, digitati aquarum dulcium, paludumque elephantini obtusi indivisi, ut terrestres, unguibus 5 - 4. Similitudo structuræ reddit harum diagnosin difficiliorem.

*Olear. mus. 27. t. 17. f. 1.*

*Bradl. natur. t. 4. f. 4.*

*β. Seb. mus. 1. t. 80. f. 9.* Testudo marina americana  
Mydas dicta.

*Amæn. acad. 1. p. 137.* Testudo eadem.

*Marcgr. bray. 241.* Jurucuja brasiliensibus.

*Raj. quadr. 256.*

*γ. Amæn. acad. 1. p. 287. n. 7.* Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque solitariis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 50.* Testudo eadem.

*Seb. mus. 1. t. 79. f. 5, 6.*

*Habitat ad insulas Pelagi: insulam Adscensionis &c.*  
*ova membranacea noctu in Arena calcarea rotunda*  
*defodit. Caro viridescens, esculenta; resupinata in*  
*mare dormiens natat; incedit tot hominibus, quot ei*  
*insistant; in terra resupinata non erigitur. Testa olim*  
*pro scutis, fornicibus.*

*Varietas γ videtur esse junior. α Testa apice bifido.*  
*Cauda non testæ margine longior. Scutella dorsalia fe-*  
*re lævia, obsolete excavato-punctata.*

Caretta. 4. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum plantarumque binis, testa ovata acute ferrata.

*Gron. mus. 2. p. 85. n. 69.* Testudo pedibus natatoriis, unguibus acuminatis binis.

*Brown. jam. 465.* Testudo unguibus utrinque binis acutis, squamis dorli quinque gibbis.

*Catesb. car. 2. p. 39. t. 39.* Testudo Caretta Rochef.

*Seb. mus. 1. t. 80. f. 9.*

*Habitat ad insulas Americanas.*

orbiculata- 5. T. pedibus palmatis, testa orbiculata planiuscula.

ris. *Habitat in meridionalibus Europæ.*

*Testa parva integerrima orbiculata, nec antice nec postice emarginata. Sternum postice bifidum, Pedum digiti membrana connexi in plantam orbiculatam.*

scabra. 6. T. pedibus palmatis, testa planiuscula, scutellis omnibus intermediis dorsatis.

*Seb. mus. 1. t. 69. f. 1, 2.*

*Gron. zooph. 74.*

*Habitat in India orientali; Carolina.*

Testa

---

*Testudines abscisso capite sæpe 14 dies vivunt; hyeme in frigidioribus hybernant terrestres. Nullum animal Testudine tardius; copula coherent sæpe per mensem.*



*Testa lateribus subtus albo nigroque varia; dorso carinata; antice retusa; sterno antice truncata. Pedes palmati unguibus acutis.*

lutaria. 7. T. pedibus subpalmatis, cauda corpore dimidio brevior, testa planiuscula: postice tribus scutellis carinata. *Amæn. acad. 1. p. 139. n. 23. Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque quaternis. \**

*Raj. quadr. 254. Testudo aquarum dulcium s. Lutaria.*

*Habitat in India, Oriente.*

*Palmæ magis palmatæ, plantæ minus. Sternum postice truncatum.*

scorpioi- 8. T. pedibus subdigitatis, fronte callosa triloba, cauda  
des. unguiculata.

*Habitat Surinami.*

*Testa ovali-oblonga, nigra: Dorso quasi angulis 3 obsoletis. Scuta dorsalia figura clypeorum nobilium. Caput antice tectum callo, qui postice trilobus est. Pedes 5 - 5 unguibus acutis, sed digitus plantarum extimus, muticus est. Caudæ apex armatus ungue incurvo.*

denticu- 9. T. pedibus subdigitatis, testa orbiculato-cordata mar-  
lata. gine eroso.

*Habitat in Virginia. Mus. De Geer.*

*Testa magnitudine ovi Meleagridis, sordide pallescens, antice retusa, margine toto denticulata ♂ quasi erosa, testæ squamis hexagonis scabris. Cauda pedibus brevior. Pedes 5-4 quasi elephantini absque digitis distinctis.*

græca. 10. T. pedibus subdigitatis, testa postice gibba margine laterali obtusissimo, scutellis planiusculis

*Raj. quadr. 243. Testudo terrestris vulgaris.*

*Habitat in Africa, terrestris. Mares irati occurrentes lepide arietant, ut plagæ eminus audiantur.*

*Corpus caudatum, palmis unguibus 5, plantis vero 4.*

carolina. 11. T. pedibus digitatis, testa gibba, cauda nulla.

*Testudo pedibus digitatis calloso-squamosis, testa ovali subconvexa, scutellis planis striatis medio punctatis.*

*Gron. zooph. 17. n. 77.*

Testudo tessellata minor caroliniana. *Edw. av. 205.*  
*t. 205.*

*Seb. mus. 1. t. 80. f. 1.* Testudo terrestris major americana.

*Habitat in Carolina.*

*Palmæ pentadactylæ. Plantæ tetradactylæ.*

carinata. 12. T. pedibus digitatis, testa gibbosa, scutellis dorsalibus quatuor anterioribus carinatis, sternō integro.  
*Habitat in Calidis regionibus.*

geometrica. 13. T. pedibus posticis palmatis, testæ scutellis elevatis truncatis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 50.* Testudo unguibus acuminatis: palmarum 5, plantarum 4.

*Worm. mus. 317.* Testudo picta f. stellata.

*Amæn. acad. 1. p. 139. n. 24.*

*Grew. mus. 36. t. 3. f. 1, 2.* Testudo testa tessellata major.

*Seb. mus. 1. t. 80. f. 8, 9.* Testudo minor amboinenfis.

*Pis. bras. t. 105.* Testudo nigricantibus & flavescens figuris geometricis.

*Raj. quadr. 259.* Testudo tessellata minor.

*Habitat in Asia.*

*Testa valde gibba nigra scutellis flavis elevatis striatis, radios flavos anastomosantes emittentibus. Sternum postice acute emarginatum.*

pusilla. 14. T. pedibus subdigitatis, testa hemisphærica. scutellis convexis trapeziis margine striatis disco punctatis.

*Grew. mus. 38. t. 3. f. 3.* Testudo virginica.

*Worm. mus. 313.* Testudo terrestris pusilla ex India orientali.

*Edw. av. t. 204.* Testudo tessellata minor africana.

*Raj. quadr. 259.* Testudo eadem.

*Habitat ad Cap. b. spei. Victitat stercorebus Gallinarum, Pane, Gramine.*

*Testa superior modice convexa, magnitudine vix manus, cincta intra marginem fascia albida. Scutella disci in medio elevato - punctata, quorum 1 ♂ 2 subcarinata; reliqua minime. Testa inferior subrubescens, antice integra, postice emarginata. Cauda brevis. Palmæ indivise unguibus 5; Plantæ vix digitatæ unguibus 4. Brachia ♂ femora nuda absque squamis.*



- Serpenti- 15. T. pedibus digitatis, testa subcarinata : postice obtu-  
na. sa acute quinque-dentata. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 36. \**  
*Habitat in Algiriæ, Chinæ aquis dulcibus, mordet,*  
*natat.*  
Caput serpentis. Cauda longitudine totius testæ.

## 120. RANA. Corpus tetrapodum, nudum, ecau- datum.

- Pipa. 1. R. digitis anticis muticis quadridentatis, posticis un-  
guiculatis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 49. Rana eadem.*  
*Gron. mus. 2. p. 84. n. 64.*  
*Seb. mus. 1. p. 121. t. 77. f. 1-4. Bufo. f. Pipa*  
*americana.*  
*Wagn. mus. 15. t. 7. Bufo major surinamensis.*  
*Vincent pip. 1726. t. 62. Bufo aquaticus surinamensis.*  
*Bradl. nat. t. 22. f. 1. Rana surinamensis.*  
*Vallisn. nat. 1. t. 41. f. 6.*  
*Habitat Surinami.*  
*Pullos e dorso nidulantes excludit.*

- Musica. 2. R. humeris gibbis punctatis.  
*Habitat Surinami in aqua dulci, vesperi, perque totam*  
*noctem loquax, Musica surinamensis.*  
*Corpus statura Bufonis, sed majus, lurido fuscoque*  
*maculatum ♂ verrucosum. Palpebra superior rugosa,*  
*subverrucosa. Humeri utrinque gibbo ovato, punctis*  
*pertuso. Femora punctis eminentibus, ut etiam abdo-*  
*men. Palmæ fissæ 5. Plantæ subpalmatæ 5. Un-*  
*gues vix ulli.*

- Bufo. 3. R. corpore ventricoso verrucoso lurido fuscoque. *Fn.*  
*svec. 275. \**  
*Fn. svec. 1. n. 253. Rana palmis tetradactylis fissis,*  
*plantis hexadactylis palmatis : pollice brevior.*  
*It. æl. 142.*  
*Gesn. pisc. 807. Rubeta f. Phrynum.*  
*Jonst. quadr.*  
*Bradl. nat. t. 21. f. 2.*

Raj.

*Raj. quadr. 252. Bufo f. Rubeta.*

*Habitat in Europæ nemorosis ruderatis umbrosis, imprimis Ucraniæ, ubi prædatur ab Erinaceis; qui ideo in domibus mansvescunt, auctore Joh. du Fay; etiam devoratur a Falcone Buteone. Gesn. pisc. 807. Verrucæ lactescentes venenatæ infuso, tactu, halitu. Delectatur Cotula, Actæa, Stachyde fætidis. Vivipara, mare, ut fertur, obstetricante. Insecta in fauces fascino revocat; nocturna, fodiens.*

*Paullini C. F. Bufo curiosus. Noriberg. 1686.*

Rubeta. 4. *R. corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato. Fn. svec. 276.*

*Syst. nat. 37. n. 5. Rana palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis subpalmatis, ano subtus punctato.*

*It. wgoth. 261.*

*Habitat in Europa, frequens post imbres, unde Rana cælitus dimissa Rondeletio; Pullo Bufonis similis.*

ibbosa 5. *R. corpore ovato-convexo: vitta longitudinali cinereo-dentata, pedibus fissis.*

*Amæn. acad. 1. p. 286. Rana palmis tetradactylis fissis, plantis hexadactylis fissis, pollice latiusculo brevissimo.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 48. Rana eadem.*

*Habitat in Exteris regionibus.*

ombina. 6. *R. corpore verrucoso, abdomine albido nigro-maculato, plica gulari. Fn. svec. 277.*

*Rana variegata. Syst. nat. 1. p. 211.*

*Habitat in Scania Germania. Sonus boatum campanarum e longinquo.*

*Bufoni similis sed parva, nigra, supra undique punctis exasperata, subtus albo flavove nigroque varia. Pedes mutici; Palmis tetradactylis fissis; Plantis pentadactylis palmatis. Ruga transversa sub collo.*

entrico- 7. *R. ore semiovato, jugulo prominulo.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 48. Rana eadem.*

*Habitat in Indiis.*

Z 2

8. R.

nes Ranarum an verrucæ pollicis palmarum? Penis enim uterque in Testudine ad lumbos femorum; in Serpentibus ad anum: Ova Ranarum plane nuda sunt.



marina. 8. *R. scapulis gibbosis, clunibus nodosis.*  
*Seb. mus. 1. t. 76. f. 1. Rana marina maxima.*  
*Habitat in America.*

*Palmæ tetradactylæ fissæ; Plantæ pentadactylæ subfissæ.*

typhonia. 9. *R. auricularibus lobis ovatis.*

*Habitat in America, clamitans nocte sono cornicis tetralucente. Rolander.*

*Dorsum rugis quatuor longitudinalibus, punctis elevatis, maculisque nigris. Pedes mutici. Palmæ tetradactylæ fissæ; Plantæ pentadactylæ palmatæ, digitis ac gustis: secundo longissimo, absque unguibus orbiculatis.*

ocellata. 10. *R. auribus ocellatis, pedibus muticis. Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 39. \**

*Brown. jam. 466. t. 41. f. 4. Rana maxima compres-  
sa miscella.*

*Kalm. it. 3. p. 45. Rana halecina.*

*Catesb. car. 2. p. 72. t. 72. Rana maxima americana aquatica.*

*Seb. mus. 1. t. 76. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Ad aures macula ocellaris utrinque. Palmæ tetradactylæ fissæ, Plantæ pentadactylæ, subpalmatæ.*

cornuta. 11. *R. palpebris conicis.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 48. Rana eadem.*

*Seb. mus. 1. t. 72. f. 1, 2. Bufo cornutus f. spinosus virginianus.*

*Habitat in Virginia, aspectu horrenda.*

marginata. 12. *R. lateribus marginatis, corpore lævi, plantis fissis.*

*Mus. Ad. Fr. p. 47. Rana lateribus marginatis. \**

*Habitat in Indiis.*

paradoxa. 13. *R. femoribus postice oblique striatis. Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 40. \**

*Syst. nat. 6. p. 36. n. 2. Lacerta cauda ancipiti, palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis, abdomine ventricoso.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 49. Rana-piscis.*

*Seb. mus. 1. t. 78. f. omnes.*

*Merian. surin. 71. t. 71.*

*Habitat Surinami.*

Larva piscem referens magnitudine cum ipsa Rana certat, unde Rana -- piscis perperam efficta a Meriana & Seba.

enipora- 14. R. dorso planiusculo subangulato. *Fn. svec. 278.\**  
 ria. *Faun. svec. 1. n. 250.* Rana palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis: pollice longiore.  
*It. æl. 154.* Rana temporaria.  
*Gesn. ovip. 46.* Rana aquatica innoxia. *aquat. 805.*  
*Aldr. ovip. 89.* Rana.  
*Jonst. quadr. t. 75. f. 5, 6, 7, 8.*  
*Raj. quadr. 247.* Rana aquatica.  
*Bradl. natur. t. 21. f. 1.*  
*Habitat in Europa; garrula limosis Rana coaxat aquis. Vere aquatica, æstate terrestris, victitat Culicibus. Devoratur ab Anatibus, Ardeis. Corde licet exempto salit.*

esculenta. 15. R. corpore angulato, dorso transverse gibbo, abdomine marginato. *Faun. svec. 279.*  
*Cesn. pisc. 809.* Rana gibbosa 4, 5.  
*Ræf. ran. t. 51. t. 13.* Rana viridis aquatica.  
*Habitat in Europæ fontibus.*  
*Viridis lineis 3 flavis: intermedia ab ore ad anum ducta. Dorsum transverse gibbo - diffractum. Pedes postici palmati. Mas auribus globoso - inflatis. Cantu vespertino frequentiore prædicit pluviam.*

arborea. 16. R. corpore lævi: subtus punctis contiguis tuberculato, pedibus fissis, unguibus orbiculato - dilatatis. *Fn. svec. 180.*  
*Amæn. acad. 1. p. 135.* Rana pedibus fissis; unguibus subrotundis, corpore lævi: postice angustato.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 47.* Rana eadem.  
*Gron. mus. 2. p. 84. n. 63.* Rana.  
*Seb. mus. 1. t. 73. f. 3.* Rana brasiliensis gracilis.  
*Seb. mus. 2. t. 70. f. 4.* Rana americana rubra.  
*Gesn. pisc. 808.* Ranunculus viridis.  
*Raj. quadr. 251.* Rana arborea f. Ranunculus viridis.  
*β. Amæn. acad. 1. p. 285.* Rana pedibus fissis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: geniculis subtus tuberosis.



*Habitat in foliis arborum Europæ, Americæ, Muscæ  
in fauces revocans.*

boans. 17. R. corpore lævi : subtus punctis contiguis, pedibus  
palmatis : unguibus orbiculato-dilatatis.

*Amæn. acad. 1. p. 285. Rana palmis tetradactylis,  
plantis pentadactylis palmatis, digitorum apicibus  
subrotundis.*

*Mus. ad. Fr. 1. p. 47. Rana eadem.*

*Seb. mus. 1. t. 72. f. 3. & t. 71. f. 3, 4. Rana suri-  
rinamensis.*

*Habitat in America.*

*Simillima R. arboreæ, sed pedes omnes palmati & cor-  
pus album magnum, maculis etiam lacteis, modo hæc  
sufficiant pro specie distinguenda.*

## 121. DRACO. Corpus tetrapodum, caudatum, ala- tum : alis propriis.

volans. 1. D. brachiis ab ala distinctis. *Syst. nat. 36. Gron-  
mus. 2. p. 73. n. 46.*

*Mus. Ad. Fr. 1. 40. Draco.*

*Amæn. acad. 1. p. 126. Lacerta cauda tereti, pedi-  
bus pentadactylis, alis femore connexis, crista gu-  
læ triplici.*

*Bont. jav. 57. t. 57. Lacertus volans f. Dracunculus.*

*Seb. mus. 2. t. 86. f. 3. Lacerta africana volans f.  
Draco volans.*

*Raj. quadr. 275. Lacerta volans indica.*

*Grim. E. N. C. ann. 12. Lacerta volans.*

*Bradl. natur. t. 9. f. 5. Lacerta volans.*

*Habitat in India, Africa.*

præpos. 2. D. brachiis alæ adnatis. †

*Seb. mus. 1. p. 160. t. 102. f. 2. Draco volans ame-  
ricanus.*

*Habitat in America.*

*Alas & pingunt & describunt a pedibus anterioribus  
separatas auctores.*

## 122. LA-

*Dracones omnes reliqui authorum fabulosi sunt, ut HYDRA Seb. mus. 1. t.  
102. f. 1. Hamburgi a nobis visa, non naturæ, sed artis opus eximium.  
Alæ Draconum, non e pedibus anterioribus formatæ ut in Avibus, Ve-  
spertilionibus, Pegaso, sed propriæ & radiatæ ut Pinnae piscium.*

122. LACERTA. *Corpus tetrapodum, caudatum, nudum.*

\* *Cauda compressa ; Corpore vestito subsquamoso.*

Crocodi- 1. L. cauda compressa ferrata, pedibus triunguiculatis, pal-  
lus. mis pentadactylis, plantis tetradactylis palmatis.

*Amæn. acad. 1. p. 121. Lacerta eadem.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 40. Lacerta eadem.*

*Gron. mus. 2. p. 74. n. 47. Crocodilus.*

*Bellon. aquat. 41. Crocodilus.*

*Gesn. quadr. 9. Crocodilus. aquat. 304.*

*Aldr. aquat. 677. Crocodilus.*

*Jonst. quadr. t. 79. f. 3. Crocodilus.*

*Raj. quadr. 261. Lacertus maximus.*

*Bont. jav. t. 55. Crocodilus Cayman.*

*Marcgr. bras. 242. Jacare.*

*Olear. mus. 8. t. 7. f. 3. Crocodilus.*

*Besl. mus. 47. t. 13. Crocodilus niloticus.*

*Jacob. mus. 1. t. 7. f. 55. Crocodilus niloticus.*

*Sloan. jam. 2. p. 332. Crocodilus.*

*Seb. mus. 1. t. 103, 104, 106. Crocodilus.*

*Merian. sur. 49. f. 69. Crocodil.*

*Vallisn. nat. 1. t. 43.*

*Catesb. car. 2. t. 63. Lacertus maximus.*

*Habitat in Africæ, Asiæ, Americæ Aquis, moschum olet. Ova centena in arena deponit, effouuntur ab Ichneumone, avicula; exclusos pullos Mater in tergum provocat, ad aquas ducit, deciduos Mas Femi- naque ingurgitant; sub aqua vorat; in catenam ad- sociati aquatilia exagitant. Leviathan Jobi. 40 : 20; 41 : 24. Fugientibus atrox; edocti dorso ipsius in- siliunt, regunt.*

*Longitudo sæpe 18 pedum. Rictus amplissimus. Palpe- bræ rugosæ truces. Aures lineares, supra valvula clausiles.*

*Varietates. Gron. zooph. 37, 38, 39, 40.*

*Anatome. Hasselq. it. 292.*

Caudi- 2. L. cauda depresso-plana pinnatifida, pedibus palmatis.  
verbera. *Fewill. per. 2. p. 319. t. 319.*

*Seb. mus. 2. p. 108. t. 103. f. 2.*

*Habitat in Peru.*



Dracæna. 3. L. cauda supra denticulata longa , corpore lævi , digitis subæqualibus.

Seb. mus. 1. t. 101. f. 1. Lacerta maxima Cordylus f. Caudiverbera.

Habitat in America.

supercilio- 4. L. cauda carinata , dorso superciliisque squamis ciliatis  
liosa.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 40. Lacerta eadem.

Seb. mus. 1. t. 109. f. 2.

1. t. 94. f. 4.

1. t. 109. f. 4.

Habitat in Indiis.

Caput retusum squamis erectis. Supercilia elata , capite altiora , a squamis obtusis. Crista dentata a nu-  
cha ad caudæ apicem.

scutata. 5. L. cauda subcompressa mediocri , sutura dorsali den-  
tata , occipite bimucronato.

Seb. mus. 1. p. 173. t. 109. f. 3. Salamandra pro-  
digiosa amboinensis scutata.

Habitat in Asia.

Monitor. 6. L. cauda carinata , corpore mutico maculis ocellatis.  
Mus. Ad. Fr. 1. p. 41. Lacerta cauda ancipiti in-  
tegra , pedibus pentadactylis , digitis omnibus un-  
guiculatis. \*

Seb. mus. 2. t. 86. f. 2.

2. t. 105. f. 1.

2. t. 30. f. 2.

2. t. 49. f. 2.

2. t. 99. f. 1.

2. t. 100. f. 3.

1. t. 97. f. 2.

1. t. 94. f. 1,2,3.

Habitat in Indiis.

Corpus maculis albis ocellatis verticillatum. Fasciæ ab-  
dominis albi lineares interruptæ.

principa- 7. L. cauda subcarinata , crista gulæ integerrima , dor-  
lis, so lævi.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 43.

Amæn. acad. 1. p. 286. t. 14. f. 2.

Habitat in America meridionali.

Cropus cute tenuissima. Cauda articulata , quovis ar-  
ticu-

*ticulo ex 5 annulis squamarum tenuissimarum. Digitorum articuli penultimi latiores sunt.*

bicarina- 8. *L. cauda compressa supra bicarinata mediocri, dorso ta. quadrifariam carinato-striato.*

*Habitat in Indiis.*

*Parva, grisea. Dorsum striis duabus elevatis & latera dorsi singula ex squamis carinato-striata; Latera squamis convexo-tuberculatis. Abdomen 24 ordinibus transversalibus squamarum (in singulo 6) tectum. Cauda corpore vix sesquialongior, compressa, subtus striata, lateribus lævis, supra duplici carina angulata. Crista nulla.*

\* \* *Cauda verticillata.*

Cordylus. 9. *L. cauda verticillata brevi: squamis denticulatis, corpore lævigato.*

*Amæn. acad. 1. p. 132, 292.*

*Gron. mus. 2. p. 79. n. 55. Cordylus.*

*Seb. mus. 1. t. 84. f. 3, 4. & 2. t. 62. f. 5.*

*Habitat in Africa, Asia.*

*Corpus squamis truncatis verticillatum.*

Stellio. 10. *L. cauda verticillata mediocri: squamis denticulatis, capite corporeque muricato. Mus. Ad. Fr. 2. p. 37.\**

*Hasselq. itin. 301. Lacerta Stellio.*

*Tournef. itin. 1. p. 119. t. 120. Lacerta Cossfordilos dicta.*

*Seb. mus. 2. t. 8. f. 7.*

*Habitat in Oriente: Delos, Ægypto, Africa; stercore lectum ad pyramides ægypti, Cordylea, optimum cosmeticum. Bell. it. 115.*

mauritanica. 11. *L. cauda subverticillata brevi muricata apice lævi, corpore supra muricato, digitis subtus lamellatis muticis.*

*Seb. mus. 1. t. 108. f. 2, 6, 7.*

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Corpus habitu & figura L. Gecko, sed luridum & ad latera capitis, supra collum, dorsum, femora*

Z 5

verru-

*Aures nullæ: palustri, aquaticæ, Salamandræ; sed & Chamæleo absque auribus. Palmæ tetradactylæ: palustri, aquaticæ, Salamandræ, vulgari, lineatæ; Plantæ tetradactylæ Crocodilo, reliquis plerisque pentadactylæ,*

*Muticis pedibus species: aquatica, palustris, carolina, Salamandra.*



*verrucosum mucronibus. Cauda corpore brevior, a basi ad medium spinis sexfariam muricata, inde ad apicem lævis. Digi pedum omnino ut in Gecko subtus lamelloso-squamati, unguibus minimis. Subtus totum corpus læve squamis minimis.*

azurca. 12. L. cauda verticillata brevi: squamis mucronatis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 42. Lacerta eadem.*

*Seb. mus. 2. t. 62. f. 6.*

*t. 97. f. 4.*

*Habitat in Africa.*

turcica. 13. L. cauda subverticillata mediocri, corpore griseo subverrucoso.

*Edw. av. 204. t. 204. Lacerta minor cinerea maculata asiatica.*

*Habitat in Oriente.*

*Cauda vix corpore longior, obsolete verticillata. Corpus parvum, griseum, punctis fuscis irroratum, inæquale & quasi verrucis obsoletis adpersum.*

Ameiva. 14. L. cauda verticillata longa, scutis abdominis triginta, collari subtus ruga duplici.

*Amæn. acad. 1. p. 127, 293. Lacerta cauda tereti corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, crista nulla, scutis abdominalibus 30.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 45. Lacerta eadem.*

*Gron. mus. 2. p. 80. t. 56. Lacerta cauda tereti corpore triplo longiore, squamis lævissimis, abdominalibus oblongo-quadratis.*

*Clus. exot. 115. Lacertus indicus.*

*Edw. av. 202. t. 202, 203. Lacertus major viridis.*

*Worm. mus. 313. f. 313.*

*Raj. quadr. 270. Lacertus indicus.*

*Seb. mus. 1. t. 85. f. 2, 3, 4.*

*1. t. 86. f. 4, 5.*

*1. t. 96. f. 2, 3.*

*2. t. 63. f. 4.*

*2. t. 103. f. 4.*

*1. t. 88. f. 1, 2, 4.*

*Sloan. jam. 2. p. 333. t. 273. f. 3. Lacertus major cinereus maculatus.*

*Habitat in America.*

*Caput L. agilis, sed Collare non constat majorum squamarum ordine.*

agilis.

15. *L. cauda verticillata longiuscula squamis acutis, collari subtus squamis constructo. Faun. svec. 284.*

*Faun. svec. 1. n. 1352. Lacerta cauda tereti verticillata longitudine corporis, pedibus pentadactylis unguiculatis.*

*Syst. nat. 36. n. 6. Lacerta cauda tereti longa verticillata squamis acutis, pedibus pentadactylis unguiculatis.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 43. Lacerta eadem.*

*Gron. mus. 2. p. 80. n. 57. Lacerta cauda corpore parum longiore, squamis lævissimis.*

*Raj. quadr. 264. Lacertus vulgaris, ventre nigro maculato.*

*Seb. mus. 2. t. 79. f. 5. Lacerta minor maculata indigena.*

*β. Raj. quadr. 264. Lacertus viridis.*

*Aldr. quadr. 634. Lacertus viridis.*

*Seb. mus. 2. t. 4. f. 4, 5. Lacerta viridis.*

*Edw. av. 3. p. 78. t. 247. f. 2.*

*Habitat in Europa, India.*

*Variat in australi Europa colore viridi; Indica pulchrius colorata. Femora postica subtus linea e punctis callosis notata, ut in L. Ameiva. Collare subtus squamis 7 majoribus. Caudæ squamæ lineares, parallelæ, acutæ, carinatæ.*

algira.

16. *L. cauda verticillata longiuscula, corpore lineis utrinque duabus flavis.*

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Corpus vix digito longius, supra fuscum, subtus flavescens. Squamæ dorsales carinatæ, acutiores. Linea utrinque flava dorsum includit, & alia utrinque abdomen distinguit a lateribus.*

Seps.

17. *L. cauda verticillata longiore, sutura laterali reflexa, squamis quadratis.*

*Amæn. acad. 1. p. 293. Lacerta cauda verticillata, pedibus subpentadactylis, squamis quadratis. \**

*Habitat in Meridionalibus.*

*Pedes breves, remotissimi, cursorii; Abdomen planum.*

*Corpus tectum squamis omnibus quadratis truncatis, adeoque striis longitudinalibus transversalibusque tam supra,*

---

*Femorum carina verrucosa Cordylus, Ameiva, Igvana, Seps, marmorata, agilis, fasciata.*



*supra, quam subtus. Cauda corpore sesquilingior  
verticillis circiter 50.*

6-lineata. 18. *L. cauda verticillata longa, dorso lineis sex albis.*

*Catesb. car. 2. p. 68. t. 68.*

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Similis L. lemniscatæ. Corpus supra utrinque lineis  
3 albis angustis & totidem nigris alternis. Dorsum  
lineis 3 mediis interjectum, canescens quasi ex duabus  
lineis albidis. Rugæ 2 sub collo. Femora postice  
ordine papillari ut in Ameiva.*

angulata. 19. *L. cauda hexagona longa, squamis carinatis mucro-  
natis.*

*Habitat in America. Roländer.*

*Parva dorso fusco. Squamæ omnes, exceptis abdomi-  
nalibus, mucronatæ, valde carinatæ. Caput nudum,  
rugis variis elevatis; postice, ubi squamæ colli in-  
cipiunt, quasi truncatum & annexum; sub Gula squa-  
mæ 2, magnæ, rotundatæ. Cauda corpore sesqui-  
longior, hexagona, valde angulata.*

\* \* \* *Cauda tereti imbricata, corpore brevior.*

Chamæ- 20. *L. cauda tereti brevi incurva, digitis duobus tribus-  
leon. que coadunatis.*

*Amæn. acad. 1. p. 290, 501. Idem.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 45. Idem.*

*Gron. mus. 2. p. 76. n. 50. Chamæleon.*

*Olear. mus. 9. t. 8. f. 3. Chamæleon.*

*Bellon. itin. 1. 2. c. 60. Chamæleon.*

*Besl. mus. t. 12. Chamæleon.*

*Calceol. mus. 658. t. 661. Chamæleon terrestris.*

*Valent. mus. 1. 3. c. 31. Chamæleon.*

*Kircher. mus. 275. t. 293. f. 44. Chamæleon.*

*Jonst. quadr. t. 79. Chamæleon.*

*Seb. mus. 1. t. 82. f. 1, 2, 3, 4, 5. & t. 83. f. 5.*

*Aldr. quadr. 670. Chamæleon.*

*Raj. quadr. Chamæleo.*

*Habitat in Africæ, Asiæ, Hispaniæ australis arbori-  
bus. Intumescit detumescitque lente corpus. Oculi  
tecti: pupilla nuda aurata fulgentissima. Incessus  
tardus pedibus opposite anomalis caudaque scandente.  
Lingua lumbriciformis, longissima, muscipapa. Colo-  
res mutat in calidis; noctu vigil.*

Variat *Pileo plano* ♂ *carinato*. *Singulare quod auribus destituatur.*

Anatome *Hasselq. iter.* 297. *Barthol. cent.* 2. c. 62.

Gecko. 21. *L. cauda tereti mediocri, digitis muticis subtus lamellatis, corpore verrucoso, auribus concavis.*

*Amæn. acad.* 1. p. 133, 232. *Lacerta cauda tereti mediocri, pedibus pentadactylis: digitis cristatis imbricatis, corpore verrucoso.*

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 46. *Idem.*

*Hasselq. iter.* 306. *Lacerta Gecko cauda tereti mediocri, pedibus cristatis subtus longitudinaliter lamellofis.*

*Gron. mus.* 2. p. 78. n. 53. *Salamandra.*

*Seb. mus.* 1. t. 108. f. 1, 3, 5.

*Petiv. pterogr. t.* 20. f. 1.

*Bont. jav.* 57. *Salamandra indica.*

*Habitat in Indiis, frequens etiam in domibus. Pedibus exhalat venenum in esculentis (an urina?)*

*Hasselq. Mansueta; homo asylum. Virosa saliva huius sua tela inficere Javanos fertur.*

Scincus. 22. *L. cauda tereti mediocri apice compressa, digitis muticis marginatis.*

*Gron. mus.* 2. p. 76. n. 49. *Scincus.*

*Seb. mus.* 2. p. 112. t. 105. f. 3.

*Imperat. nat.* 906. *Lacerta lybia.*

*Besl. mus.* 1, 12. f. 1.

*Olear. mus.* 9. t. 8. f. 1.

*Aldr. ovip. l.* 1. c. 12. *Lacertus cyprius scincoides.*

*Raj. quadr.* 271. *Scincus.*

*Amæn. acad.* 1. p. 294.

*Hasselq. act. upf.* 1750. p. 30.

- - - *itin.* 309. n. 58.

*Habitat in montosis Lybiæ, Ægypti, Arabiæ petreæ.*

*Corpus officinale pro aphrodisiaco.*

orbicula- 23. *L. cauda tereti mediocri, vertice trimuricato, abdomine subrotundo.*

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 44. *Lacerta eadem.*

*Seb. mus.* 1. t. 109. f. 6.

t. 83. f. 1, 2.

β. *Lacerta cauda tereti brevi, trunco subgloboso supra muricato. Syst. nat.* 10. p. 206. n. 26.



*Seb. mus.* 1. p. 134. t. 83. f. 1, 2. *Lacertus orbicularis spinosus.*

*Hern. mex.* 327, 328. *Lacertus orbicularis.*

*Raj. quadr.* 263. *Lacertus orbiculatus.*

*Habitat in Mexico.*

5-lineata. 24. *L. cauda tereti mediocri, dorso lineis quinque albidis.*

*Habitat in Carolina. Garden.*

Caput lineis 6 flavis, scilicet 2 inter oculos; 1 utrinque supra oculos & 1 utrinque sub oculis. Corpus supra nigricans lineis 5 flavis s. albidis, a capite fere ad medium caudæ ductis. Abdomen striato-imbricatum. Cauda corpore sesquialongior, non verticillata.

\* \* \* \* *Cauda tereti imbricata, corpore longiore.*

*Basiliscus.* 25. *L. cauda tereti longa, pinna dorsali radiata, occipite cristato.*

*Seb. mus.* 1. t. 100. f. 1.

*Habitat in America australi.*

*Igvana.* 26. *L. cauda tereti longa, futura dorsali dentata, crista gulæ denticulata.*

*Amæn. acad.* 1. p. 123, 287. *Lacerta cauda tereti, pedibus pentadactylis, crista dorsi longitudinali, gulæ pendula antice dentata.*

*Mus. Ad. Fr.* 1. 43. *Idem.*

*Gron. mus.* 2. p. 82. n. 60. *Igvana.*

*Marcgr. bras.* 236. f. 236.

*Jonst. quadr.* t. 77. f. 5.

*Jacob. mus.* t. 4.

*Olear. mus.* t. 6. f. 1. *Yvana.*

*Bont. jav.* 56. t. 56. *Lacerta Leguan.*

*Marcgr. bras.* 236. *Senembi s. Igvana.*

*Nieremb. nat.* 271. t. 271.

*Ovied. amer. l.* 13. c. 3.

*Rheed. exper.* 100. t. 101. *Igvane.*

*Worm. mus.* 313.

*Sloan. jam.* 2. p. 333.

*Raj. quadr.* 265. *Lacertus Senembi & Igvana.*

*Seb. mus.* 1. t. 95. f. 1, 2.

96. f. 4.

97. f. 3.

98. f. 1.

*Clus. exot.* 116. *Yvana.*

*Catesb.*

*Catesb. car. 2. p. 64. t. 64?*

*Habitat in Indiis. Capitur linea laqueari; Caro omnium  
sapidissima, Siphiliticis noxia.*

*Cauda verticillata est.*

Calotes. 27. *L. cauda tereti longa, dorso antice capiteque postice  
dentato. Amæn. acad. 1. p. 289.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 44.*

*Edw. av. 74. t. 245.*

*Seb. mus. 1. t. 95. j. 3, 4.*

*t. 93. f. 2.*

*1. t. 86. f. 6.*

*1. t. 89. f. 2.*

*2. t. 76. f. 5.*

*Habitat in Asia: Zeylona.*

*Corpus cæruleum squamis acutis, subtus striatum. Spi-  
næ dorsi lanceolatæ.*

Agama. 28. *L. cauda tereti longa, collo supra capiteque postice  
aculeato, occipitis squamis reversis.*

*Amæn. acad. 1. p. 288.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 44.*

*Gron. zooph. 13. n. 54.*

*Seb. mus. 1. t. 107. f. 1, 2, 3.*

*Habitat in America.*

*Color corporis pallidus. Abdomen minime striatum.*

*Squamæ Corporis acuminatæ, occipitis reversæ.*

Umbra. 29. *L. cauda tereti longa, nucha subcristata, occipite cal-  
loso, dorso striato. Mus. Ad. Fr. 2. p. 38. \**

*Habitat in Meridionalibus.*

*Plica profunda sub gula. Color corporis nebulosus.*

*Squamæ apice carinato-mucronatæ, unde dorsum ad  
angulum acutum striatum. Caput obtusius & rotun-  
dus quam reliquis. Occiput callo magno nudo.*

Plica. 30. *L. cauda tereti longa, occipite calloso, palpebris su-  
pra excoriatis, collo lateribus verrucoso subtus plicato.*

*Habitat in Indiis.*

*Corpus præter caudam vix digito majus, in meo spe-  
cimine, tectum undique squamis conicis (velut Cha-  
grin). Occiput callosum & Supercilia subcrenata,  
supra excoriata cicatrice membranacea, transverse in  
3 partes sulco distincta. Pone aures ad latera capi-  
tis & colli verrucæ 2, muricatæ. Collum subtus  
du-*



*duplici plica. Dorsi sutura majoribus squamis antice quasi crenata. Ruga elevata a collo supra brachia excurrit utrinque & in medio trunci deflectitur. Cauda teres, tecta squamis minutissimis; vix manifeste verticillata, corpore duplo longior. Digitus longi, subtus squamis acutioribus scabri; unguis compressi.*

marmorata.

31. *L. cauda tereti longa, gula subcristata antice dentata, dorso laevi.*

*Amæn. acad. 1. p. 129, 288.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 43.*

*Seb. mus. 2. t. 76. f. 4.*

*Edw. av. t. 245. f. 2.*

*Habitat in Hispania, America.*

*Corpus compressum. Cauda striata. Unguium dorsum nigrum est.*

bullaris.

32. *L. cauda tereti longa, vesica gulari.*

*Catesb. car. 2. t. 66. Lacerta viridis jamaicensis.*

*Habitat in Jamaica.*

*Parva, corpore viridi; sub gula globus ruber, vesicularis retractilis, quem inflat territa.*

strumosa.

33. *L. cauda tereti longa, pectore gibbo protenso.*

*Seb. mus. 2. t. 20. f. 4. Salamandra mexicana strumosa.*

*Habitat in America australi.*

*Pectus s. Sternum antice prominet in mucronem obtusum.*

Tegui-  
xin.

34. *L. cauda tereti longa, sutura laterali plicata.*

*Amæn. acad. 1. p. 128. Lacerta cauda tereti longa pedibus pentadactylis, crista nulla, hypochondrii plicatis.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 45.*

*Seb. mus. 1. t. 96. f. 1.*

*1. t. 98. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Collum subtus triplici plica. Dorsum & Cauda striata confertissimis verticillata.*

curata.

35. *L. cauda tereti longiuscula, squamis rotundatis|glabris, lateribus subfuscis,*

*Amæn. acad. 1. p. 294.* Lacerta cauda tereti, pedibus pentadactylis, squamis rotundatis lævissimis subgriseis, lateribus subfuscis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 46.* Lacerta barbara.

*Gron. mus. 2. p. 75. n. 84.* Scincus.

*Seb. mus. 1. t. 89. f. 3.*

*Edw. av. t. 247.*

*Aldr. quadr. 660.* Lacertus cyprius scincoides.

*Habitat in Jersea Anglorum, Cypro. Viva colore auri pulcherrime nitet, colore cum vita recedente.*

*Corpus teres quasi pingue. Aures concavae.*

nilotica. 37. L. cauda longa extimo triquetra, corpore glabro: dorso squamarum lineis quatuor.

Lacerta cauda tereti longa, corpore toto glabro: squamis angulo obtuso notatis. *Hasselq. itin. 311. n. 59.*

*Habitat in Ægypto.*

punctata. 38. L. cauda tereti longa, dorso lineis duabus flavis: punctis nigris interspersis.

*Mus. Ad. Fr. p. 46.* Lacerta eadem.

*Seb. mus. 2. t. 2. f. 9.*

*Habitat in Asia.*

*Lineæ 2 flavescentes includunt dorsum & a lateribus idem distinguunt.*

lemniscata. 39. L. cauda tereti longa, dorso lineis octo albidis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 47.* Lacerta eadem.

*Seb. mus. 1. t. 92. f. 4.*

*2. t. 9. f. 5.*

*1. t. 53. f. 9.*

*Habitat in Guinea.*

*Multum affinis L. Ameivæ. Femora albo punctata.*

fasciata. 40. L. cauda tereti longiuscula, dorso lineis quinque flavescentibus, cauda cærulea.

*Catesb. car. 2. t. 67.* Lacerta cauda cærulea.

*Pet. gaz. 1. t. 1. f. 1.* Lacertus marianus minor, cauda cærulea.

*Habitat in Carolina.*

Chalci des 41. L. cauda tereti longa, pedibus pentadactylis brevissimis.

*Syt. nat. 36. n. 7.* Lacerta eadem.



*Gron. zooph. 43.* Scincus pedibus brevissimis pentadactylis unguiculatis, cauda truncoque longissimis cylindraceis.

*Imperat. nat. 917.* Cæcilia major.

*Raj. quadr. 272.* Seps f. Lacerta chalcidica.

*Column. ecphr. 1. p. 35. t. XXXVI.* Seps, Lacerta Chalcidica f. Chalcides.

*Aldr. quadr. 638.* Lacerta chalcidica.

*Habitat in Europa australi, Africa.*

*Media inter Lacertas & Angues, sed auribus instructa.*

\* \* \* \* \* *Palmis tetradactylis; Corpore alepidoto nudo.*

vulgaris. 42. *L. cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis, palmis tetradactylis, dorso linea duplici fusca. Fn. svec. 283.*

*Fn. svec. 1. n. 254.* Lacerta pedibus inermibus, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore livido: linea dorsali duplici fusca.

*Raj. quadr. 264.* Lacerta vulgaris.

*Habitat in Europa; larva sub aquis.*

aquatica. 43. *L. cauda tereti uscula mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. Fn. svec. 282.*

*Gron. mus. 2. p. 78. n. 52.* Salamandra alepidota, cauda tereti uscula.

*Gesn. ovip. 31.* Lacertus aquaticus.

*Seb. mus. 2. p. 15. t. 12. f. 7.* Salamandra ceylanica.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus, stagnis, fossis.*

*Larva an præcedentis?*

palustris. 44. *L. cauda lanceolata mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. Fn. svec. 281.*

*Gron. mus. 2. p. 77. n. 51.* Salamandra alepidota verrucosa.

*Raj. quadr. 273.* Salamandra aquatica.

*Edw. av. t. 259.*

*Seb. mus. 1. t. 89. f. 4. 5.* Lacerta americana.

*Habitat in Europæ aquis stagnantibus, Piscibus infesta, muria e piscinis expellenda, uti præcedens.*

punctata. 45. *L. cauda tereti mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis, dorso longitudinaliter albo-punctata.*

*Catesb. car. 3. p. 10. t. 10. f. 10.* Stellio.

*Habitat in Carolina.*

*Corpus fuscum: Dorso duplici serie, cauda simplici albo punctata.*

4-lineata. 46. L. cauda tereti longa, pedibus subunguiculatis, palmis tetradactylis, corpore lineis quatuor flavis. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 46.* Lacerta cauda tereti longa, pedibus subunguiculatis fissis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.

*Habitat in America septentrionali?*

Salamandra. 47. L. cauda tereti brevi, pedibus muticis, palmis tetradactylis, corpore poroso nudo.

*Amoen. acad. 1. p. 131.* Lacerta cauda tereti brevi, pedibus inermibus, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 45.* Lacerta eadem.

*Matth. dioſc. 274. f. 274.* Salamandra.

*Gesn. quadr. 80.* Salamandra.

*Aldr. quadr. 641.* Salamandra terrestris.

*Jonst. quadr. t. 77. f. 10.*

*Imperat. nat. 918.*

*Olear. mus. t. 8. f. 4.*

*Raj. quadr. 273.* Salamandra terrestris.

*Seb. mus. 2. t. 15. f. 5.*

*Habitat in Europa australiore; antiquitus credita in igne vivere; sed expertus Bartholinus. Cent. 2. c. 50. Oleum e poris exsudans psilotrum præstantissimum fertur.*

*Wurffbainus Salamandrologia Norib. 1683. quart.*

\* \* \* \* \*

angvina. 48. L. cauda verticillata extremo rigidula, corpore striato, pedibus adactylis subulatis. †

*Gron. zooph. 44.* Scincus pedibus brevissimis subulatis monodactylis, anticis nullis, cauda apice nudo.

*Seb. mus. 2. t. 68. f. 7, 8.* Vermis serpentiformis ex Africa.

*Habitat in Cap. B Spei lutosi, mihi non visa.*

*Caput depressiusculum. Aures transversales. Corpus teres longissimum verticillatum, undique Squamis lineæ longitudinali exaratis. Anus transversus mox post femora. Cauda corpore duplo longior, apice acutissimo. Pedes sex adactyli subulati: anteriores angustiores, testæ squamis subacutis. A. Vosmaer.*

A a 2

II. SER-

Metamorphosin subeunt plures Lacertæ aquaticæ tetradactylæ (excepto Crocodylo.) Larvæ pisciformes apodæ declarantur in pedatas tetradactylas, sed quæ & quales evasuræ sunt, non dum perfecte constat. Salamandra forte larva, nec imago est. Siren lacertina an Larva Lacerta? conf. diff. nostr. de Sirene 1766.



## II. SERPENTES.

*Os respirans tantum pulmonibus.*  
*Pedes nulli, Pinnæve natatoriæ nullæ.*  
*Aures nullæ.*

123. **CROTALUS.** *Scuta abdominalia.*  
*Scuta Squamæque subcaudales.*  
*Crepitaculum terminale caudæ.*

*Scutis Scutellis.*

163. *miliarius.* 13—31. *C. D. Garden.*

♂

*Catesb. car. 2. t. 42.*

*Habitat in Carolina.*

*Cinereus Maculis nigris triplici ordine longitudinali; Macula rubra inter singulas dorsales.*

192. *horridus.* 167.—23. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 39.*

♂

*Bradl. natur. t. 9. f. 1.*

*Seb. mus. 2. t. 95. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Venenatissimus; antidotum Senega; a Sue consumitur; Aves Sciurosque ex arboribus in fauces revocat.*

195. *Dryinas.* 165.—30. *C. Amæn. acad. 1. p. 297.*

♂

164.—28. *Seb. mus. 2. t. 95. f. 3.*

2. t. 96. f. 1.

*Habitat in America.*

*Exalbidus maculis flavescentibus paucis.*

196. *Durissus.* 172—21. 3. *C. Amæn. acad. 1. p. 500.*

♂

*Kalm. æt. stockh. 1752. p. 310. ♀*  
 1753. p. 52, 185.

*Seb. mus. 2. t. 95. f. 2.*

*Gron. mus. 2. p. 70. n. 45. Crotalophorus 174: 22: 3.?*

*Habitat in America.*

*Albo flavoque varius, maculis rhombeis nigris disco albis.*

351. mutus. 217. — 34. C.

♂ *Habitat* Surinami.

*Magnus*, *Maculis dorsalis nigris, rhombeis, concatenatis. Linea nigra pone oculos. Maxillæ Telis maximis horrendæ. Cauda absque crepitaculo habet subius ordines 4 squamarum, minutissimarum, acuminatarum.*

124. BOA. *Scuta abdominalia*  
*Scuta subcaudalia (absque crepitaculo.)*

190. contortrix. 150 — 40. B. D. Garden.

*Syst. nat. 10. p. 216. n. 170. C. Constrictor.*

*Catesb. car. 2. p. 56. t. 56.*

*Habitat in Carolina.*

*Caput latum, valde convexum, sacculos venenatos habet, sed Tela non reperi. Corpus dorsatum, cinereum maculis fuscis areas efficientibus; aliisque maculis rotundis lateralibus. Cauda  $\frac{1}{3}$ .*

236. canina. 203 — 77. B. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 39. t. 3.*

*Seb. mus. 2. t. 96. f. 2.*

*t. 81. f. 1.*

*Habitat in Americæ arboribus.*

*Viridis, fasciis albis interruptis.*

299. Hipnale. 179 — 120. B. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 41. \**

*Seb. mus. 2. t. 34. f. 2.*

*Habitat in Asia.*

*Griseo-flavescente varius.*

300. Constri- 240 — 60. B. *Amæn. acad. 1. p. 497. t. 17. f. 3.*

ctor.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 38.*

*Gron. mus. 2. p. 69. n. 43. Cenchris*  
*248-60.*

*Seb. mus. 2. t. 98. f. 1.*

*t. 99. f. 1, 2.*

*t. 19. f. 1.*

*t. 100. f. 1.*



t. 101. f. 1.

t. 104. f. 1.

I. t. 53. f. 1.

t. 36. f. 5.

t. 62. f. 2, 1.

*Habitat in Indiis.**Adoratur ab Americanis. Dahlberg.*

319. murina. 254 — 65. B. Mus. Ad. Fr. 2. p. 42. \*  
 Gron. mus. 2. p. 70. n. 44. Coluber  
 254-69.  
 Seb. mus. 2. t. 29. f. 1.  
*Habitat in America.*  
*Glaucus maculis supra rotundatis.*

322. Cenchria. 265 — 57. B. Mus. Ad. Fr. 2. p. 41. \*  
*Habitat Surinami.*  
*Flavescens ocellis albidis iride grisea.*

323. Scytale. 250 — 70. B. Scheuch. sacr. t. 737. f. 1.  
 Gron. mus. 2. p. 55. n. 10.  
*Habitat in America, constringit* ♂ *de-*  
*glutit Capras, Oves* ♂ *c*  
 Corpus cinereo-glaucum: maculis dor-  
 salibus orbiculatis nigris. Lateralibus  
 annulatis, nigris disco albo; Ventrali-  
 bus oblongis, quasi e punctis nigris con-  
 catenatis.

345. Ophrias. 281 — 64. B. Mus. De Geer.  
*Habitat ---*  
*Facie Constrictoris, sed fuscus.*

375. Enydria. 270 — 105. B. Mus. De Geer.  
*Habitat in America.*  
*Variegatus colore griseo. Dentes inferio-*  
*res longi.*

418. Hortula. 290 — 123. B. Mus. Ad. Fr. 1. p. 37.  
 na. Seb. mus. 2. t. 84. f. 1.  
 t. 74. f. 1.  
*Habitat in America.*  
*Pallida maculis lividis cuneiformibus. Ca-*  
*put areolis luteis horti instar.*

125. COLUBER. *Scuta abdominalia.*  
*Squamæ subcaudales.*

140. Vipera. 118 — 22. C. Mus. Ad. Fr. 2. p. 43. \*  
 ♂ Hasselq. act. upf. 1750. p. 24.  
 itin. 314. n. 60.  
*Habitat in Ægypto.*  
*Corpus pallidum maculis fuscis, brevissimum, capite gibbo, squamis minutis. Officinalis hæc Vipera est ægyptiorum, nec Berus.*
153. Atropos. 131 — 22. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 22. t. 13. f. 1.  
 ♂ *Habitat in America.*  
*Canus, ocellis fuscis iride alba.*
160. Leberis. 110 — 50. C.  
 ♂ *Habitat in Canada. Kalm.*  
*Fasciæ lineares nigrae.*
161. Lutrix 134 — 27. C.  
*Habitat in Indiis.*  
*Dorsum & Abdomen flava; Latera caerulea.*
162. Calamarius. 140 — 22. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 23. t. 6. f. 3.  
*Habitat in America.*  
*Lividus fasciis punctisque linearibus fuscis; subtus fusco-tessellatus.*
170. fimus. 124 — 46. C. D. Garden.  
*Habitat in Carolina.*  
*Caput subrotundum, sinum, gibbum. Fasciola inter oculos nigra, curvata; vertex cruce albida, notata in medio puncto nigro. Corpus supra albo nigroque varium, & quasi albo fasciatum; subtus nigrum.*
173. striatulus. 126 — 45. C. D. Garden.  
 130 — 25. *Habitat in Carolina.*  
 A a 4 Par-

*Vipera cornuta Hasselq. act. upf. 1750. p. 27. est fictitius Coluber astu Arabum, qui unguibus aviculæ pertulerunt caput eidemque inseruerunt. vide 175.*



*Parvus dorso striato, fusco, subtus pallido. Caput levigatum.*

174. Ammodytes. 142.—32. C. *Amæn. acad.* 1. p. 506. n. 25.  
♂ dytes.

*Bell. itin.* 203. *Druinus.*

*Aldr. serp.* 169. *Ammodytes.*

*Habitat in Oriente.*

*Nasus terminatus verruca erecta.*

175. Cerastes. 150.—25. C. *Hasselq. act. upf.* 1750. p. 27.

*iter.* 315. n. 61. *Coluber cornutus.*

*Bellon. itin.* 203.

*Habitat in Oriente.*

*Squammæ capitis omnes parvæ rotundatæ.*

*Dens mollis exit e palpebra superiore.*

177. plicatilis. 131.—46. C. *Amæn. acad.* 1. p. 301. n. 26.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 23.

*Seb. mus.* 1. t. 57. f. 5.

*Habitat in Ternateis.*

*Lividus lateribus fuscis; subtus punctis quadruplici ordine fuscis.*

178. Domicella. 118.—60. C. *Amæn. acad.* 1. p. 117. n. 5.

*Seb. mus.* 2. t. 54. f. 1.

*Habitat in Asia.*

*Albus fasciis nigricantibus, subtus concurrentibus.*

179. Alidras. 121.—58. C. *Mus. De Geer.*

*Habitat in Indiis.*

*Albus totus.*

180. punctatus. 136.—43. C. *D. Garden.*

*Habitat in Carolina.*

*Cineus; subtus luteus ordine triplici punctorum nigrorum, tribus scilicet in singulo ordine. Cauda, etiam subtus flavæ.*

---

|            |   |
|------------|---|
| Fasciati : | 160, 162, 181, 212, 244, 258, 261, 270, 259, 316, 325.      |
| Annulati : | 178, 223, 234, 207, 246, 249, 285.                          |
| Lineati :  | 187, 218, 251, 252, 260, 275, 277, 281, 282, 290, 328, 359. |
| Cyanei :   | 161, 189, 193, 229, 279, 287, 313, 339, 385, 300.           |
| Arbi :     | 179, 190.   |

181. buccatus. 107 — 72. C. Mus. Ad. Fr. p. 29. t. 19. f. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Fuscus fasciis albis. Caput album : fuscis punctis 2 verticis & triangulo supra nares.*
183. Berus. 146 — 39. C. Faun. svec. 286.  
 ♂ *Amæn. acad. 1. p. 113. n. 1.*  
*Aldr. serp. 115, 116.*  
*Habitat in Europa, frequens ; delebitur ferro.*  
*Fusco-canescens vitta dorsali atra, dentato-repanda.*
184. Chersea. 150 — 34. C. Fn. svec. 285.  
 ♂ *L. Aët. stockh. 1749. p. 246. t. 6.*  
*Aldr. serp. 197. Alpis colore ferrugineo.*  
*Habitat in Sveciæ depressis, venenatissimus & morfu sæpius lethalis in Svecia ; An satis diversus ab Aspide, licet apud nos minor ?*
185. Prester. 152 — 32. C. Fn. svec. 287. \*  
 ♂ *Pet. mus. 17. n. 104. Vipera anglica nigrans.*  
*Habitat in Europa septentrionali.*  
*Ater toto corpore.*
187. angulatus. 117 — 70. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 23. t. 15. f. 1.  
 120 — 60. *Amæn. acad. 1. p. 119. n. 7.*  
*Seb. mus. 2. t. 12. f. 3.*  
 2. t. 73. f. 1.  
*Habitat in Asia.*  
*Griseo-fuscus vittis nigris.*
189. cæruleus. 165 — 24. C. Amæn. acad. 1. p. 303. n. 31.  
*Seb. mus. 2. t. 13. f. 3.*  
*Habitat in America.*  
*Cærulescens squamis altero latere albis ; subtus albus.*



190. albus. 170—20. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 24. t. 14. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Albus, immaculatus*
192. Aspis. 145—46. C. Gallis Aspice.  
 ♂ Ström. foudm. Col. 146 --34.  
*Habitat in Gallia.*  
*Rufus maculis dorsalibus fuscis, alternis confluentibus in vittam.*  
*Similis Cherseæ, sed major.*
193. Typhius. 140—53. C. Mus. De Geer.  
*Habitat in Indiis.*  
*Cærulescens.*
194. fasciatus. 128—67. C. D. Garden.  
*Catesb. car. 2. p. 58. t. 58.?*  
*Habitat in Carolina.*  
*Corpus squamis carinatis, nigricans:*  
*Fasciis obsoletis albis, lateribus bifidis. Abdomen fasciis obsoletis fuscis tot, quot scuta. Cauda  $\frac{1}{4}$ .*
201. Lebetinus. 155—46. C. Mus. Ad. Fr. 2. p. 43. \*  
 ♂ *Habitat in Oriente.*  
*Subnebulatus, subius punctis fuscis.*
202. melanocephalus. 140—62. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 24. t. 15. f. 2.  
*Habitat in America.*  
*Fuscus glaberrimus capite atro.*
204. Cobella. 150—54. C. Amæn. acad. 1. p. 117. n. 14.  
 p. 302. n. 28.  
 p. 496. n. 14.  
*Gron. mus. 2. p. 65. n. 32.*  
*Seb. mus. 2. t. 2. f. 6.*  
*Habitat in America frequentissimus.*  
*Cinereus adpersus lineolis obliquis albis. Macula obliqua plumbea pone singulos oculos.*
207. Reginae. 137—70. C. Mus. Ad. Fr. p. 24. t. 13. f. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Fuscus abdomine albo nigroque vario.*

208. doliatus. 164 — 43. C. D. Garden.  
*Habitat in Carolina.*  
*Minutus, albidus annulis s. scutis nigris, quorum duo semper propiora. Hæ fasciæ nigræ non perfecte cingunt abdomen, sed lateribus connectuntur cum remotiori, unde perfecti annuli dorsales.*
210. ordinatus. 138 — 72. C. D. Garden.  
*Catesb. car. 2. p. 53. t. 53.*  
*Seb. mus. 2. t. 20. f. 2.*  
*Gron. mus. 37.*  
*Habitat in Carolina.*  
*Parvus, cærulescens, nigro maculato nebulosus; latera serie punctorum nigrorum.*
211. mexicanus. 134 — 77. C.  
*Habitat in America.*
212. severus. 170 — 42. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 25. t. 8. f. 1.  
♂ *Seb. mus. 2. t. 54. f. 4.*  
*Habitat in Asia.*  
*Cinereus fasciis albis. Fascia cinerea inter oculos & pone nares.*
216. Aurora. 179 — 37. C. Mus. Ad. Fr. p. 25. t. 19. f. 1.  
*Seb. mus. 2. t. 78. f. 3.*  
*Habitat in America.*  
*Lividus dorso flavo.*
217. Sipedon. 144 — 73. C. Kalm.  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Fuscus.*
218. maurus. 152 — 66. C.  
*Habitat Algiriæ. E. Brander.*  
*Corpus supra fuscum lineis dorsalibus duabus; subtus atrum; a lineis dorsalibus ad abdomen utrinque fasciæ plures nigræ.*
219. stolatus. 143 — 76. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 26. t. 22. f. 1.  
♂ *Seb. mus. 2. t. 9. f. 1.*  
*Ha-*



*Habitat in Asia.*

*Griseus vitis 2 albis. Scuta utrinque puncto nigro.*

220. vitattus. 142—78. *C. Amæn. acad. 1. p. 30. n. 27.*  
*Mus. Ad. Fr. p. 26. t. 18. f. 2.*  
*Gron. mus. 2. p. 65. n. 31. Colu-*  
*ber 155--62.*

*Seb. mus. 2. t. 45. f. 5.*

*t. 60. f. 2, 3.*

*Habitat in America.*

*Scuta margine fusca. Vitta alba dentata sub cauda.*

221. miliaris. 162—59. *C. Mus. Ad. Fr. p. 27.*

*Habitat in Indiis.*

*Fuscus : squamis macula alba. Subtus albus.*

223. Æsculapii. 180—43. *C. Amæn. acad. 1. p. 497. n. 15.*

*174—47. Mus. Ad. Fr. 1. p. 29. t. 11. f. 2.*

*Gron. mus. 2. p. 59. n. 18.*

*Seb. mus. 2. t. 18. f. 4.*

*Habitat in Indiis.*

*Fasciæ albæ nigræque ; hæ lineæ annulove albo dimidiatæ.*

227. rhombeatus. 157—70. *C. Mus. Ad. Fr. p. 27. t. 24. f. 2.*

*Habitat in Indiis*

*Cærulescens maculis nigris medio cæruleis rhombeis.*

229. cyaneus. 119—110. *C. Amæn. acad. 1. p. 493. n. 10.*

*Seb. mus. 2. t. 43. f. 2.*

*Habitat in America.*

*Saturate cæruleus, habitu Ahetulla ; subtus virens.*

230. Natrix. 170—60. *C. Faun. svec. 288.*

*It. gotl. 146.*

*Raj. quadr. 334. Natrix torquata.*

*Amæn. acad. 1. p. 116. n. 3.*

*Gron.*

---

*Serpentes prædam, collo duplo crassiore, ingurgitant, ob maxillas dilatables, nec inarticulatas.*

*Gron. mus.* 2. p. 63. n. 27.

*Habitat in Europa ; in fimetis pa-*  
*riens.*

*Niger macula alba utrinque ad collum.*

234. *agilis.* 184—50. *C. Amæn. acad.* 1. p. 304. n. 33.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 27. t. 21. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Fasciæ fuscae albæque.*
235. *læteus.* 203—32. *C. Mus. Ad. Fr.* 1. p. 28. t. 18. f. 1.  
♂ *Habitat in Indiis.*  
*Albus maculis geminatis atris. Vertex*  
*ater linea longitudinali alba.*
240. *jaeulatrix.* 163—77. *C. Gron. mus.* 63. n. 26.  
*Habitat Surinami. D. Schene.*  
*Similis C. lineato.*
244. *aulicus.* 184—60. *C. Mus. Ad. Fr.* 1. p. 29. t. 12. f. 2.  
*Seb. mus.* 1. t. 91. f. 5.  
*Habitat in America.*  
*Griseus fasciis albis latere bifurcatis.*  
*Vertex albus.*
246. *monilis.* 164—82. *C. Mus. De Geer.*  
*Habitat in America.*  
*Corpus annulatum ; monile punctis*  
*3 albis a tergo.*
249. *fulvius.* 218—31. *C. D. Garden.*  
*Habitat in Carolina.*  
*Corpus annulis 22 nigris, totidem-*  
*que alternis fulvis fusco macula-*  
*tis, antice posticeque albis. Cau-*  
*da  $\frac{1}{12}$ .*
251. *pallidus.* 156—96. *C. Amæn. acad.* 1. p. 494. n. 11.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 31. t. 7. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Pallidus maculis griseis vagis punctis-*  
*que fuscis. Lineolæ binæ interruptæ*  
*laterales nigricantes.*



- 252 lineatus. 169 — 84. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 30. t. 12. f. 1.  
t. 20. f. 1.  
Seb. mus. 2. t. 12. f. 3.  
Habitat in Asia.  
Cærulescens vittis linearibus 4 fuscis.
253. Naja. 193 — 60. C. Mus. Ad. Fr. p. 30. t. 21. f. 1.  
♂ Seb. mus. 2. t. 90. f. 1, 2.  
t. 85. f. 1.  
t. 89. f. 1, 2, 3, 4.  
t. 97. f. 1, 2, 3, 4.  
t. 94. f. 1.  
1. t. 44. f. 1.  
Kæmph. amæn. 565. t. 567.  
Amæn. acad. 1. p. 305.  
Habitat in India orientali.  
Colli latera dilatata in membranam supra pictam perspicillis albis.  
Omnium venenatissimus; antidotum Ophiorhiza; ab Ichneumone occiditur.
254. Padera. 198 — 56. C. Mus. Ad. Fr. 2. p. 44.  
Habitat in Indiis.  
Albus, macularum fuscarum multa paria secundum dorsum connexa lineola; totidemque simplices maculae ad latera.
255. canus. 188 — 70. C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 31. t. 11.  
f. 1.  
Habitat in Indiis.  
Canus fasciis subfuscis; ad latera puncta 2 nivea.
259. getulus. 215 — 44. C. D. Garden.  
Catesb. car. 2. p. 52. t. 52.  
Habitat in Carolina.  
Corpus nigro - cærulescens fasciis linearibus flavis lateribus in fascias abdominales bifidas. Cauda  $\frac{1}{5}$ .

260. *fibilans*. 160 — 100. C. *Amæn. acad.* 1. p. 302. n. 30.  
*Seb. mus.* 2. t. 52. f. 4.  
t. 56. f. 4.  
t. 107. f. 4.  
*Habitat in Asia.*  
*Cærulescens vittis nigris, subtus albus.*
261. *laticaudatus*. 220 — 42. C. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 31. t. 16.  
f. 1.  
*Habitat in Indiis.*  
*Cinereus fasciis fuscis. Cauda obtusa, compresso - anceps.*
262. *Sirtalis*. 150 — 114. C. *Kalm.*  
*Habitat in Canada.*  
*Vittæ tres viridi - cærulescentes in corpore fusco tenui striato.*
263. *atrox*. 196 — 69. C. *Amæn. acad.* 1. p. 305. n. 35.  
♂ *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 33. t. 22. f. 2.  
*Seb. mus.* 1. t. 43. f. 5.  
*Habitat in Asia.*  
*Canus squamis carinatis. Caput depressum, compressum, angulatum squamis minimis.*
264. *Sibon*. 180 — 85. C. *Amæn. acad.* 1. p. 304. n. 32.  
*Seb. mus.* 1. t. 14. f. 4.  
*Habitat in Africa,*  
*Fusco - ferrugineus albo adpersus; subtus albus maculis fuscis.*
265. *nebulatus*. 185 — 81. C. *Mus. Ad. Fr.* p. 32. t. 24. f. 1.  
*Habitat in America.*  
*Fusco cinereoque nebulatus; subtus albo fuscoque varius.*
266. *fuscus*. 149 — 117. C. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 32. t. 17.  
f. 1.  
*Seb. mus.* 2. t. 54. f. 2.  
t. 71. f. 1.  
t. 72.



t. 72. f. 1.

t. 87. f. 1.

t. 91. f. 1.

*Habitat in Asia.**Cinereo - fuscus, habitu Ahetullae.  
Pone oculos macula oblonga  
fusca.*267. *faturninus.* 147 — 120. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 32. 1.  
9. f. 1.**Habitat in Indiis.**Lividus cinereo - nebulosus. Oculi  
magni.*270. *candidus.* 220 — 50. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 33. t. 77.  
f. 1.**Habitat in Indiis.**Albicans fasciis fuscis.*271. *niveus.* 209 — 62. *C. Mus. D. Geer.  
♂ Seb. mus. 2. t. 15. f. 1.**Habitat in Africa.**Albus immaculatus.*272. *scaber.* 228 — 44. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 36. t. 100.  
f. 1.**Habitat in Indiis.**Fusco nigroque nebulatus, squamis ca-  
rinatis. Vertex macula nigra po-  
stice bifida.*273. *carinatus.* 157 — 115. *C. Mus. Ad. Fr. p. 31.  
Habitat in Indiis.**Plumbeus squamis margine pali-  
dis. Subtus albus. Dorsum ca-  
rinatum.*275. *corallinus.* 193. — 82. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 33.  
♂ Seb. mus. 2. t. 17. f. 1.**Habitat in Asia.**Glucus vittis tribus fuscis, squa-  
mis distantibus; subtus pallidus  
punctis canis.*

276. ovivorus. 203 — 73. C. Kalm.  
*Pis. bras.* 279. Guinpuaguara.  
*Habitat in America.*
277. Saurita. 156. — 121. C. D. Garden.  
*Catesb. car.* 2. p. 50. t. 50.  
*Habitat in Carolina.*  
*Virescens, supra fuscus lineis 3 virescentibus.*
278. Constrictor. 186. — 92. C. Kalm. *it.* 3 p. 136.  
*Catesb. car.* 2. p. 48. t. 48.  
*Habitat in America septentrionali, adoritur homines circum pedes, sese volvens stringensque, citissime currens; mordens absque veneno.*  
*Niger, angustissimus, glaberrimus, subtus pallide cærulescens. Gula alba.*
279. exoletus. 147. — 132. C. Mus. *Ad. F.* 1. p. 34. t. 10. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Cinereo-cærulescens, habitu Ahætullæ.*
281. Situla. 236 — 45. C. Mus. *Ad. F.* 2. p. 44. \*  
*Habitat in Ægypto. Hasselquist.*  
*Griseus vitta longitudinali utrinque lineâ nigra marginata.*
282. Triscalis. 195 — 86. C.  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus glaucum: Lineolæ longitudinales dorsales tres fuscae ad nucham conjunctæ, quarum media supra desinit, insuper in singulo latere lineâ fusca cum prioribus duabus excurrentes ad apicem caudæ.*  
*Cauda  $\frac{1}{3}$ .*
284. guttatus. 227 — 60. C. D. Garden.  
*Catesb. car.* 2. p. 60. t. 60.  
*Habitat in Carolina.*  
*Lividus maculis dorsalibus rubris nigrisque. Lituræ nigrae laterales.*



Abdomen maculis nigris quadratis alternis. Scuta abdominis variant 223. f. 230. Cauda  $\frac{1}{2}$

285. lemniscatus. 250—35. C. Amæn. acad. 1. p. 118. n. 6.

p. 413. n. 9.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 34. t. 14. f. 1.

Seb. mus. 1. t. 10. f. ult.

2. t. 76. f. 3.

Habitat in Asia.

Annuli albi nigrique, & hi annulis duobus albis sæpe interrupti. Corpus glaberrimum.

286. annulatus. 190—96. C. Amæn. acad. 1. p. 120. n. 9.

p. 305. n. 34.

Mus. Ad. Fr. p. 34. t. 8. f. 2.

Seb. mus. 2. t. 38. f. 2.

Habitat in America.

Albus maculis alternis fuscis rotundis, passim confluentibus.

287. Dipfas. 152—135. C. Amæn. acad. 1. p. 302. n. 29.

Grew. mus. 2. p. 64. n. 30.

Seb. mus. 2. t. 24. f. 3.

Habitat in America.

Cerulescens squamis margine albidis. Cauda subtus sutura cerulescens.

290. Pelias. 187—103. C. Mus. De Geer.

Habitat in Indiis.

Fuscus pone oculos & verticem, reliqua nigro duplicata. Abdomen viride, utrinque linea flava.

293. Tyria. 210—83. C. Mus. Ad. Fr. 2. p. 45. \*

Habitat in Ægypto. Hasselquist.

Albidus triplici ordine longitudinali macularum rhombearum fuscicarum.

297.

Serpentum Cutis reticulata, Spina dorsalis cartilaginea, Abdomen costatum. Lingua filiformis bifida uti nonnullis Lacertis; deglutiunt non masticata serriplo crassiora, crescunt ætate absque termino, prorepunt distractis scutellis undulato nisu, fœtent glandulis putoriis.

97. jugularis. 195 — 102. *C. Mus. Ad. Fr. 2. p. 45. \**  
*Habitat in Ægypto. Hasselquist.*  
*Niger jugulo sanguinolento.*
99. Pethola. 209 — 90 *C. Amæn. acad. 1. p. 306. n. 36.*  
*p. 119. n. 8.*  
*p. 495. n. 13.*  
*Gron. mus. 2. p. 57. n. 13.*  
*Seb. mus. 1. t. 54. f. 4.*  
*Habitat in Africa.*  
*Plumbeus fasciis testaceis.*
100. æstivus. 155 — 144. *C. D. Garden.*  
*Catesb. car. 2. p. 57. t. 57.*  
*Habitat in Carolina.*  
*Similis Ahætullæ 313, totus cæ-*  
*ruleus, glaberrimus, subtus pal-*  
*lide virens. Cauda  $\frac{2}{3}$*
7. Molurus. 248 — 59. *C. Mus. De Geer.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Simillimus Boæ, sed scuta & squa-*  
*mæ capitis majores, ut in Co-*  
*lubris.*
3. Ahætulla. 163 — 150. *C. Amæn. acad. p. 115. n. 2.*  
*p. 495. n. 12.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 35. t. 22.*  
*f. 3.*  
*Gron. mus. 2. p. 61. n. 24.*  
*Seb. mus. 2. t. 82. f. 1.*  
*2. t. 63. f. 3.*  
*2. t. 12. f. 3.*  
*Bradl. natur. t. 9. f. 2.*  
*Habitat in Asia, America.*  
*Viridi-aureus squamis apice nigris;*  
*Fascia nigra trans oculos.*
- petalarius. 212 — 102. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 35. t.*  
*9. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fuscus fasciis albis; subtus pallidus.*
- Haje. 207 — 109. *C. Mus. Ad. Fr. 2. p. 46. \**  
*Hasselq. it. 317. n. 62. Colu-*  
*B b 2 ber*



ber scutis abd. 206, squam  
caudal. 60.

*Habitat in Ægypto inferiore.*

*Maximus, ater fasciis obliquis &  
squamis dimidiato-albis.*

323. filiformis.

165 — 158. *C. Mus. Ad. Fr. p. 36. t. 17. f.*

*Habitat in Indiis.*

*Niger, angustissimus, subtus albus.  
Caput corpore crassius.*

325. pullatus.

217 — 108. *C. Amæn. acad. 1. p. 300. n. 25.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 35. t. 20. f.*

*Gron. mus. 2. p. 56. n. 12. Colu-  
ber 215-104.*

*Habitat in Asia.*

*Fasciæ atræ punctis albis. Tem-  
pera nivea maculis atris.*

326. Hippocrepis.

232 — 94. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 36. t. 1.  
f. 2.*

*Habitat in America.*

*Lividus maculis fuscis. Fascia  
fusca inter oculos & arcuata  
capitis.*

328. minervæ.

238 — 90. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 36.*

*Habitat in Indiis.*

*Glaucus vitta dorsali fusca.  
tæ capitis 3 fusca.*

337. cinereus.

200 — 137. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 37.*

*Habitat in Indiis.*

*Cinereus abdomine albo angu-  
stius. Caudæ squamæ margine fu-  
sca.*

339. viridissimus.

217 — 122. *C. Mus. Ad. Fr. 2. p. 46. \**

*Habitat Surinami.*

*Viridissimus scutis abdominis  
dilatatis.*

340. mucosus.

200 — 140. *C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 37. t. 23.*

*Habitat in Indiis.*

*Caput cerulescens.*

41. domesticus. 245—94. C. *Habitat in Barbariæ domibus.*  
*Similis C. hippocrepi, sed diversus;*  
*fascia inter oculos bipartita, seu*  
*duabus maculis nigris notata.*
44. Cenchoa. 220—124. C. *Amæn. acad. 1. p. 306. n. 37.*  
*Seb. mus. 2. t. 16. f. 2, 3.*  
*Habitat in America.*  
*Fuscus maculis pallidis fasciis niveis.*  
*Caput subglobosum.*
59. mycterizans. 192—167. C. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 28. t. 5. f. 1.*  
*t. 19. f. 2.*  
*Seb. mus. 2. t. 23. f. 2.*  
*Gron. mus. 2. p. 59. n. 19.*  
*Catesb. car. 2. p. 47. t. 47.*  
*Habitat in America.*  
*Rostrum productum tetragonum; la-*  
*tera vitta lineari pallida.*
85. cærulescens. 215—170. C. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 37. t.*  
*20. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cærulescens,*
- Argus. - - - C. *Seb. mus. 2. t. 103. f. 1.*  
*Habitat in Africa.*

B b 3

Occi-

- COLUBRI a me non visi, a Cl. GRONOVIO in museo 2. descripti.
- 165 abd. 141 clauda 24. Gron. 41. Seb. 2. t. 98. f. 1.
- 175 - 136 - 39. Gron. 38. ferrugineo cæruleo alboque varius.
- 177 - 135 - 42. Gron. 39. albus maculis albis nigrisque.
- 201 - 159 - 42. Gron. 29. Seb. 1. t. 33. f. 6. albo-rufus.
- 202 - 142 - 60. Gron. 36. Seb. 2. t. 35. f. 4. cærulescens.
- 203 - 153 - 50. Gron. 34. albus lineis maculisque nigris.
- 212 - 149 - 63. Gron. 33. albus cinctus lineis nigris.
- 220 - 160 - 60. Gron. 28. cinctus lineis albis nigrisque.
- 230 - 165 - 74. Gron. 25. Seb. 2. t. 21. f. 3. albus fasciis obscuris.
- 234 - 174 - 60. Gron. 22. Seb. 2. t. 33. f. 1. cinereo-cæruleus.
- 240 - 163 - 77. Gron. 26. Seb. 2. t. 1. f. 9. & t. 9. f. 2. vitta nigra.
- 260 - 180 - 80. Gron. 20. albo brunneoque varius.
- 266 - 191 - 75. Gron. 15. brunneus punctis albis.
- 298 - 202 - 96. Gron. 14. maculis brunneis.
- 311 - 189 - 122. Gron. 17. purpurascens maculis atris.
- 314 - 172 - 142. Gron. 23. cæruleus linea laterali atra.
- 315 - 190 - 125. Gron. 28. cinctus lineis albis nigrisque.
- 342 - 272 - 70. Gron. 11. Seb. 2. t. 199. f. 2. nebulatus.



*Occiput bilobo gibbum. Corpus ocellis transversis per annulos distinctis. Mihi non visus, nec scuta notata.*

# 126. ANGUIS. *Squamæ abdominales & Squamæ subcaudales.*

quadrupes.

A. pedibus quatuor.

*Habitat in Java.*

*Corpus forma Anguis, teres, cinereum striis 14 s. 15, fuscis; longitudinalibus. Subtus cinerascens, squamosum, nec scutatulum. Os denticulis minutissimis. Aures non habet. Pedes remotissimi, brevissimi, pentadactyli, unguiculati, sed digitis adeo parvis, ut difficillime numerentur. Cum hæc auribus destituatur, nequit commode Lacertis annumerari.*

60. bipes.

100 — 60. A. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 28. f. 3.*

*Seb. mus. 1. t. 53. f. 8.*

*t. 86. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Pedes 2 brevissimi didactyli, ad anum. Pallida puncto fusco in singula squama.*

197. Meleagris

165 — 32. A. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 48. \**

*Seb. mus. 2. t. 21. f. 4.*

*Habitat in Indiis.*

*Similis A. bipedi, glauca punctis nigris multiplici ordine longitudinali.*

198. colubrina.

180 — 18. A. *Hasselq. it. 320. n. 65.*

*Habitat in Ægypto.*

*Pallido fuscoque pulchre variegata.*

209. *Jaculus*. 186 — 23. *A. Mus. Ad. Fr.* 2. p. 48.  
*Hasselq. iter.* 319. n. 64.  
*Habitat in Ægypto.*  
*Squamæ abdominis paulo latiores.*
212. *maculata*. 200 — 12. *A. Mus. Ad. Fr.* 1. p. 21. t. 21.  
 f. 3.  
*Gron. mus.* 2. p. 53. n. 5.  
*Seb. mus.* 2. t. 100. f. 2  
 1. t. 53. f. 7.  
*Habitat in America.*  
*Supra flava, vitta dorsali fasciisque*  
*linearibus fuscis.*
214. *reticulata*. 177 — 37. *A. Gron. mus.* 2. p. 54. n. 7.  
*Scheuch. sacr.* t. 747. f. 4.  
*Habitat in America.* †  
*Color squamarum fuscus disco albo.*
215. *Cerastes*. 200 — 15. *A. Hasselq. act. upf.* 1750. p. 28.  
 it. 320. n. 66. †  
*Habitat in Ægypto.* †
237. *lumbricalis*. 230 — 7. *A. Gron. mus.* 2. p. 52. n. 3.  
*Brown. jam.* 460. t. 44. f. 1.  
*Seb. mus.* 1. p. 137. t. 86. f. 2.  
*Habitat in America.* †  
*Color ex albido flavescens.*
349. *ventralis*. 127 — 222. *A.*  
*Catesb. car.* 2. t. 59.  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*
- - *platura*. - - *A. cauda compressa obtusa.*  
*Habitat - - e mus. Fr. Ziervogel.*  
*Pharmac. Holmens.*  
*Caput oblongum, edentulum, læ-*  
*viusculum. Corpus sesquipe-*  
*dale, supra nigrum, subtus al-*  
*bum. Dorsum subcarinatum,*  
*Cauda  $\frac{1}{5}$ , valde compressa, al-*  
*bo nigroque variegata. Squa-*  
*mæ totius suborbiculatæ, mi-*  
*nutæ, non imbricatæ, nequeunt*  
*numerari.*



250. *laticauda*. 200—50. *A. Mus. Ad. Fr. 2. p. 48.* \*  
*Habitat* Surinami.  
*Cauda compressa, acuta, pallida fasciis fuscis.*
253. *Scytale*. 240—13. *A. Amæn. acad. 1. p. 296.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 6. f. 2.*  
*Gron. mus. 2. n. 4. Anguis. 227.-14.*  
*Seb. mus. 2. t. 2. f. 1, 2, 3, 4.*  
*t. 7. f. 4.*  
*t. 20. f. 3.*  
*Habitat* in Indiis.  
*Albida squamarum marginibus passim ferrugineis, fasciis fuscis.*
262. *Eryx*. 126—136. *A. Gron. mus. 2. p. 35. n. 9.*  
*D. Schene mss, 120-137. misit.*  
*Habitat* in America, Anglia.  
*Cinerea lineis tribus nigris; subtus cærulescens.*
270. *fragilis*. 135—135. *A. Faun. svec. 289.*  
*Aldr. serp. 245. Cæcilia vulgaris.*  
*Imperat. nat. 916. Cæcilia geineri.*  
*Raj. quadr. 289. Cæcilia Typhlus.*  
*Habitat* in Europa.  
*Hujus maxima fragilitas lepide explicata a Lemery in dictionario.*
350. *ventralis*. 127—223. *A. D. Garden.*  
*Catesb. car. 2. p. 59. t. 59. Cæcilia maculata.*  
*Habitat* in Carolina.  
*Cinereo-virens, elevato-striatus, vitta laterali nigra. Abdomen breve, quasi sutura cava annexum fuisset. Cauda verticillata, corpore triplo longior.*

## 127. AMPHISBÆNA. *Annuli trunci caudæque.*

230. *fuliginosa*. 200—30. *A. Amæn. acad. 1. p. 295.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 20.*

*Gron.*

*Gron. mus.* 2. p. 1. Amphisbæna.  
209-25.

*Raj. quadr.* 288.

*Seb. mus.* 2. t. 1. f. 7.

t. 18. f. 2.

t. 22. f. 3.

t. 73. f. 4.

t. 100. f. 3.

1. t. 88. f. 3.

*Habitat in America.*

*Albo nigroque varia.*

239. alba.

223—16. *A. Mus. Ad. Fr.* 1. p. 26. t. 4. f. 2.

*Seb. mus.* 2. t. 24. f. 1.

t. 6. f. 4.

*Habitat in Americæ acervis formicarum.*

*Alba tota.*

128. CÆCILIA. *Rugæ trunci caudæque.*

*Labium superius tentaculis 2.*

135. tentaculata.

135—0. *C. Amæn. acad.* 1. p. 489. t. 17. f. 2.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 19. t. 5. f. 2.

*Gron. mus.* 2. n. 1. p. 52.

*Seb. mus.* 2. p. 26. t. 25. f. 2.

*Habitat in America.*

350. glutinosa.

340—10. *C. Mus. Ad. Fr.* 1. p. 19. t. 4.

f. 1.

*Habitat in Indiis.*

*Fusca, linea laterali albida.*



## III. N A N T E S.

*Branchiæ & Pulmones simul, arbitrarie respirantes.*

*Pinnae radiis cartilagineis.*

129. PETROMYZON. *Spiracula VII ad latera colli. Branchiæ nullæ. Fistula in vertice. Pinnae pectorales aut ventrales nullæ.*

marinus. 1. *P. ore intus papilloso, pinna dorsali posteriore a cauda distincta. Fn. svec. 292.*

*Art. gen. 64. Syn. 90. Petromyzon maculosus, ordinibus dentium circiter viginti.*

*Bell. pisc. 76. Mulletta f. Lampetra.*

*Gesn. pisc. 590. Mustella f. Lampetra.*

*Rond. pisc. 398. Will. icht. 105. Raj. pisc. 35. Lampetra.*

*Habitat in Mari Europæo.*

fluvialis. 2. *P. pinna dorsali posteriori angulata. Fn. svec. 290. Gron. zooph. 159.*

*Art. gen. 14. syn. 89. spec. 99. Petromyzon unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris, præter inferiores majores.*

*Gesn. pisc. 597. Lampredæ alterum genus.*

*Salv. pisc. 63. Pryck.*

*Jonst. pisc. t. 24. f. 6. Prycka.*

*Will. icht. 106. Raj. pisc. 35. Lampetræ medium genus.*

*Habitat in fluvii Europæ.*

*Adherent ore; noctibus tenebrosiss cono cavo piscatur.*

branchialis. 3. *P. pinna dorsali posteriore lineari, labio oris posteriore latere lobato. Fn. svec. 292.*

*Rond. pisc. 202. Gesn. pisc. 598. Gron. zooph. 160.*

*Will. icht. 104. Raj. pisc. 35. Lampetra parva & fluvialis.*

*Salv.*

*Petromyzon gaudet perfectioribus pulmonibus, quam reliqui ordinis, adeoque serpentibus propior, & fistula canalis descendit in pulmones.*

Salv. pisc. 63. Lampetra minor.

Plot. oxon. 184. t. 10. f. 6, 7.

Habitat in aquis dulcibus Europæ, branchiis piscium in-  
hærens.

130. RAJA. *Spiracula* V subtus ad collum.  
Corpus depressum.  
Os sub capite.

\* *Dentibus acutis.*

Torpedo. 1. R. tota lævis. Art. gen. 73. syn. 102. Mus. Ad. Fr.

2. p. 50. \* Gron. zooph. 153. t. 9. f. 3.

Bell. pisc. 89, 90. Rond. pisc. 358. Salv. pisc. 142.

Gesn. pisc. 988. Raj. pisc. 28. Torpedo.

Kæmph. exot. 509. t. 510. Torpedo.

Habitat in sinu Persico, M. Mediterraneo. Iners om-  
nium injuriæ obnoxius se vindicat motu tremulo proprio.

Act. hassn. 5. obs. 97. Rhed. exper. 53. Kæmph.

amæn. 514. Reaum. act. 1714. Ball. boerh. 4. p.

13. retardato spiritu præservatur tangens.

Corpus supra maculis 5 atris orbiculatis (quæ non in  
Gronoviana varietate;) puncta pertusa sparsa in dor-  
so & ad margines dilatatos ordinata. Cauda utrinque  
carinata. Pinna caudæ obtusissima, lobo superiore paulo  
majore.

Batis.

2. R. varia, dorso medio glabro, cauda unico aculeo-  
rum ordine. Art. gen. 73. syn. 102.

Gron. zooph. 157. Raja dorso dipterygio medio gla-  
bro, aculeorum ordine solitario ante pinnas dorsa-  
les, cauda gracili apice apterygio.

Rond. pisc. 346. Gesn. pisc. 791. Raj. pisc. 25. Ra-  
ja undulata s. cinerea.

Jonst. pisc. Raja undulata.

Habitat in Oceano Europæo.

Corpus supra lituris nigris flexuosis.

Oxyrin-  
chus.

3. R. varia, dorso medio tuberculis decem aculeatis. Art.  
gen. 72. syn. 101.

Salv. pisc. 149. Lævi-Raja.

Gesn. pisc. 792. Will. icht. 77. Raj. pisc. 26. Ra-  
ja oxyrinchos major.

Ha-



*Habitat in M. Mediterraneo & O. Europæo.*  
*Aculeus ante singulos oculos.*

Mirale-  
tus.

4. R. dorso ventreque glabris, aculeis ad oculos, terno-  
 que eorum ordine in cauda. *Art. gen. 72. syn. 101.*  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 50.*  
*Gron. zooph. 155.* Raja dorso dipterygio, aculeorum  
 ordine solitario, cauda gracili pinnata, ordine acu-  
 leorum terno, rostro subacuminato.  
*Salv. pisc. 150.* Raja stellaris.  
*Jonst. pisc. - t. 10. f. 4.* Raja oculata.  
*Will. icht. 72. Raj. pisc. 27.* Raja lævis oculata.  
*Habitat in mari Mediterraneo.*  
*Ocellus supra utramque alam.*

Fulloni-  
ca.

5. R. dorso toto aculeato, aculeorum ordine simplici ad  
 oculos, duplici in cauda. *Art. gen. 72. syn. 101.*  
*Rond. pisc. 356. Gesn. pisc. 797.* Raja fullonica.  
*Will. icht. 78.* Raja fullonica, Raja aspera.  
*Raj. pisc. 26.* Raja aspera.  
*Habitat in M. Europæo,*

\* \* *Dentibus obtusis.*

Aquila.

6. R. corpore glabro, aculeo longo ferrato in cauda  
 pinnata. *Art. gen. 72. syn. 100. Mus. Ad. Fr. 2.*  
*p. 51. \**  
*Salv. pisc. 146. Rond. pisc. 338. Bellon. pisc. 97.*  
*Gesn. pisc. 75.* Aquila marina.  
*Raj. pisc. 23.* Aquila.  
*Will. icht. 64.* Aquila.  
*Column. ecphr. 1. p. 3. t. 2.* Pastinaca marina lævis  
 altera oxypterydes.  
*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Pastinaca.

7. R. corpore glabro, aculeo longo anterieus ferrato in  
 cauda & dorso apterygio. *Art. gen. 71. syn. 100.*  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 51. \**  
*Bell. pisc. 94.* Pastinaca marina lævis.  
*Rond. pisc. 331. Salv. pisc. 144.* Pastinaca.  
*Gesn. pisc. 679.* Pastinaca marina.  
*Will. icht. 67.* Pastinaca marina 1.  
*Raj. pisc. 24.* Pastinaca marina lævis.  
 8. Raja *Altaveta* corpore glabro, aculeis duobus postice  
 ferratis in dorso apterygio. *Syst. nat. 10. p. 232. n. 7.*  
*Column.*

Column. aquat. 4. t. 2. Will. icht. 65. Raj. pisc. 24.

Pastinaca marina altera pteryplateja f. Altavela.

Habitat in Europa. Caudæ aculeus venenatus veteribus  
 & recentioribus, fatis Ulyssis clarus.

Cum aculeus quotannis renovetur, sæpe alter exit, antequam alter decidit, unde duo interdum aculei, ut in  $\beta$ . Baster.

clavata. 8. R. aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine transversa abdominali. Art. gen. 71. syn. 99. spec. 103. Fn. svec. 293. It. wgoth. 175.

Gron. zooph. 154. Raja dorso dipterygio aculeis scabro, cauda ordine aculeorum solitario, ano pinnato, rostro acuminato.

Rond. pisc. 353. Gesn. pisc. 795. Raja clavata.

Will. icht. 74. Raj. pisc. 26. Raja clavata.

Habitat in Oceano Europæo.

Rhinobatos. 9. R. oblonga, unico aculeorum ordine in medio dorso. Art. gen. 70. syn. 99. Mus. Ad. Fr. 2. p. 52, \*

Gron. zooph. 156. Raja dorso dipterygio, aculeorum ordine solitario, cauda lata pinnata inermi, rostro trigono productiore.

Bell. pisc. 78. Gesn. pisc. 903. Squato-Raja f. Rhinobatos.

Salv. pisc. 153. Will. icht. 79. Raj. pisc. 28. Rhinobatos f. Squatino-Raja.

Habitat Genuæ, Venetiis.

## 131. SQUALUS. Spiracula V ad latera colli.

Corpus oblongum teretiusculum.

Os in anteriore capitis parte.

\* Dorso spinoso: pinna ani nulla.

Acanthias.

1. S. pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore teretiusculo. Art. gen. 66. syn. 94. spec. 102. Fn. svec. 295. Mus. Ad. Fr. 1. p. 53. It. wgoth. 174.

Rond. pisc. 373. Galeus acanthias.

Gesn. pisc. 607. Galeus acanthias.

Bellon. pisc. 69. Mustelus spinax.

Salv. pisc. 135. f. 136. Mustelus spinax.

Will. icht. 56. Galeus acanthias f. spinax.

Raj.



*Raj. pisc. 21. Galeus acanthias f. spinax.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

**Centrina. 2.** *S. pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore subtriangulari. Art. gen. 67. n. 5. syn. 95. †*  
*Bellon. pisc. 63, 64. Vulpecula.*  
*Rond. pisc. 384. Centrina.*  
*Salv. pisc. 156-158. Centrina.*  
*Gesn. pisc. 609. Centrina.*  
*Will. icht. 58. Centrina.*  
*Raj. pisc. 21. Centrina.*  
*Habitat in Mari Mediterraneo.*  
*Pinna dorsi anterior spina antrorsum radios decussante, posterior retrorsum.*

**Spinax. 3.** *S. pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, naribus terminalibus. Art. gen. 67. syn. 95. Mus. Ad. Fr. 2. p. 49. \* Fn. suec. 296.*  
*Will. icht. 57. Galeus acanthias f. spinax fuscus.*  
*Raj. pisc. 21. Galeus acanthias f. spinax fuscus.*  
*Edw. av. t. 288. Mustelus Spinax.*  
*Gunn. act. nidros. 2. p. 213. t. 7, 8. Squalus niger.*  
*Habitat in Europa.*  
*Nares in apice capitis. Foramen ante oculos. Spina ante utramque pinnam dorsalem. Abdomen atrum. Penes retrorsum imbricati, ut in Rajis. Gunnerus.*

**Squatina. 4.** *S. pinna anali nulla, caudæ duabus, ore terminali, naribus cirrosis. Art. gen. 67. n. 6. syn. 95. Mus. Ad. Fr. 2. p. 49. \**  
*Gron. zooph. 151. Squalus capite plagioplateo lato, ore in apice capitis, naribus cirrosis.*  
*Bellon. pisc. 78. Squatina.*  
*Rondel. pisc. 367. Squatina.*  
*Gesn. pisc. 899. Squatina.*  
*Will. icht. 79. Squatina.*  
*Raj. pisc. 26. Squatina.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Media inter Squalos & Rajas, ore in apice capitis, nec subtus. Caput retusum, supra os fornicatum. Cirri duo, breves utrinque ad nares. P. Caudæ duæ.*  
\* \* Dor-

---

*Squali vivipari sunt, foramine in ore aperto, pone utrumque oculum; noctu splendent, naves sequuntur in Indias, ut cadaveribus satientur, resupinati vorant: Affert moram providentia naturæ, qui nisi resupini atque conversti, non corripiunt. Plin. IX. 8.*

\* \* *Dorso mutico, dentibus acutis; cum pinna ani.*

Zygæna. 5. *S. capite latissimo transverso malleiformi. Art. gen. 67. syn. 96. Mus. Ad. Fr. 1. p. 52. \**  
*Bell. pisc. 60. Zygæna f. Libella.*  
*Rondel. pisc. 389. Zygæna.*  
*Gesn. pisc. 1050. Zygæna.*  
*Salv. pisc. 128. Libella.*  
*Will. icht. 55. Zygæna.*  
*Raj. pisc. Zygæna.*  
*Habitat in Europa, America.*

Tiburo. 6. *S. capite latissimo cordato.*  
*Will. icht. 55. Zygænæ affinis capite triangulo.*  
*Marcgr. bras. 181. Tiburonis species minor.*  
*Habitat in America, præcedenti affinis; an mera va-*  
*rietas?*

Galeus. 7. *S. naribus ori vicinis, foraminibus ad oculos. Art. gen. 68. n. 9. syn. 97.*  
*Rond. pisc. 377. Galeus canis.*  
*Gesn. pisc. 167. Galeus canis.*  
*Salv. pisc. 130. Canis galeus.*  
*Will. icht. 51. Canis galeus.*  
*Raj. pisc. 20. Canis galeus.*  
*Habitat in Oceano Europæ.*  
*Nares ante & juxta os, subtus antice lobo membranaceo*  
*clausiles.*

Canicula. 8. *S. varius inermis, pinna ani medio inter anum cau-*  
*damque pinnatam. Art. gen. 68. syn. 97.*  
*Osbeck. iter. 70. Squalus conductus.*  
*Rond. pisc. 380. Canicula aristotelis.*  
*Gesn. pisc. 168. Canicula aristotelis.*  
*Salv. pisc. - - - Catulus major.*  
*Will. icht. 62. Raj. pisc. 22. Catulus major vulgaris.*  
*Habitat in Oceano Europæ.*

Stellaris. 9. *S. varius inermis, pinnis ventralibus discretis, dorfa-*  
*libus caudæ proximis. Art. gen. 69. syn. 97. Gron.*  
*zooph. 145. mus. 2. n. 200. †*  
*Will. icht. 63. Catulus maximus.*  
*Raj. pisc. 22. Catulus maximus.*  
*Habitat in Oceano Europæ.*  
*Speciem eandem cum S. canicula statuit Gronovius.*



Catulus. 10. S. dorso ocellato mutico, pinnis ventralibus concretis, dorsalibus caudæ approximatis, capite punctato. *Art. gen.* 69. *syn.* 97. *Gunn. act. nidros.* 2. p. 235. t. 1, 2.

*Gron. mus.* 2. n. 199. Squalus idem.

*Salv. pisc.* 137. Catulus minor.

*Will. icht.* 34. Catulus minor.

*Raj. pisc.* 22. Catulus minor vulgaris.

*Habitat in Oceano Europæ.*

Corpus supra lineam lateralem maculis ocellaribus. Caput punctis pertusis, ordine digestis. Foramen pone oculos. Pinna Dorsalis prior supra Ani regionem. Pinnae anales duæ, alternæ. Hepatis esus venenatus. *Sauv. nosol.* 2. 1. p. 421.

maximus. 11. S. dentibus canicis, pinna dorsali anteriore majore.

*Gunner. Act. nidros.* 3. p. 33. t. 2. \*

*Habitat in Oceano Arctico, visitans Medusas. Gunn.*

Corpus magnitudine certans cum Balanis, simillimum S. Carchariæ, sed absque foraminulo ante aut post oculos. Pinna ani parva paulo post regionem P. dorsalis posterioris.

Carcharias. 12. S. dorso plano, dentibus ferratis. *Art. gen.* 70. *syn.* 98.

*Gron. zooph.* 143. Squalus capite subdepresso, rostro subacuto, pinnis pectoralibus maximis.

*Gesn. pisc.* 173. *Will. icht.* 47. *Raj. pisc.* 18. Canis Carcharias f. Lamia.

*Gunn. act. nidros.* 2. p. 370. t. 10, 11. Squalus Carcharias.

*Habitat in Europa.*

Jonam Prophetam, ut veteres Herculem trinoctem, in hujus ventriculo tridui spatio, hæsisse verosimile est.

Pinnae dorsales lanceolatae, inermes: priore fere in medio dorso. P. Pectorales maximæ. P. Analis nulla. P. Caudalis biloba. Dentes 6 ordinum. Pupilla longior angusta. Chagrin officinarum.

\* \* \* Dentibus granulatis.

Mustelus. 13. S. dentibus obtusis. *Art. gen.* 66. *syn.* 93.

*Gron. zooph.* 142. Squalus rostro subacuto, corpore subrotundo, dorso unicolore fusco, pinnis pectoralibus curtis.

*Gesn.*

*Gesn. pisc. 608. Rond. pisc. 375. Galæus lævis.*  
*Salv. pisc. 135, 137. Mustelus lævis.*  
*Will. icht. 60. Raj. pisc. 22. Mustelus lævis primus.*  
*Habitat in Europa.*

*glaucus. 14. S. fossula triangulari in extremo dorso, foraminibus nullis ad oculos. Art. gen. 69. n. 13. syn. 98.*  
*Rond. pisc. 378.*  
*Gesn. pisc. 609.*  
*Will. icht. 49. Galeus glaucus.*  
*Raj. Pisc. 20. Galeus glaucus.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Speciem eandem cum Mustelo facit Gronovius.*

*Pristis. 15. S. pinna ani nulla, rostro ensiformi osseo plano utrinque dentato.*  
*Art. gen. 66. syn. 93. Fn. svec. 297. Mus. Ad. Fr. 1. p. 52. Squalus rostro longo cuspidato osseo plano utrinque dentato.*  
*Bellon. pisc. 66. Serra marina.*  
*Rond. pisc. 487. Pristis.*  
*Clus. exot. 136. Pristis s. Serra piscis.*  
*Will. icht. 61. Raj. pisc. 24. Pristis s. Serra piscis.*  
*Habitat in O. Europæ.*

132. CHIMÆRA. *Spiracula solitaria, quadripartita, sub collo.*

*Oris labium superius quinquepartitum.*

*Dentes primores incisores, bini supra infraque.*

*monstro. 1. C. rostro subtus plicis pertusis. Fn. svec. 294. Gunn. act. nidros. 2. p. 270. t. 5, 6.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 53. t. 25. Chimæra.*  
*Art. gen. 68. Squalus cauda longiore quam ipsum corpus.*  
*Clus. exot. 136. t. 137. Genus Galei.*  
*Will. icht. 57. Galeus acanthias clusii.*  
*Raj. pisc. 23. Galeus acanthias.*  
*Stræm. sændm. 289. Vulpecula.*  
*Habitat in Mari Atlantico, nocturna; visitat Conichiliis in Abyss.*



Corpus teretiusculum, læve, flavesceus. Caput venosum punctis excavatis, concatenatis, communicantibus. Oculi grandes. Maxilla superior Dentibus 2 incisoriis & 2 molaribus trigonis interioribus. M. inferior lamellis 2 osseis. Spiracula solitaria, intussusquadrifida. Pinna Dorsalis prior triangularis, serrata. P. Dorsalis posterior humilis, fere ad caudam extensa. Cauda corpore sesquialongior, lanceolata, subtus pinnata, desinens in filum. Mas penibus 2, habet in capitis vertice cirrum brevissimum, apice penicilliformi cincto aculeolis, & in Abdomine antepinnas ventrales pedicellos 2 brevissimos unguiculatos.

Callorynchus. 2. C. rostro subtus labro inflexo lævi.

Gron. mus. 59. n. 130. t. 4. Callorynchus.

Fresier. itin. 1. p. 211. t. 17. f. 4. Pejegallos.

Habitat in Mari Æthiopico, Chilli.

133. LOPHIUS. Spiracula solitaria, pone brachia.  
Dentes plurimi, minuti.  
Pinnæ pectorales brachiis infidentes.

Branchiæ tres tantum. Arted.

piscatorius. 1. L. depressus, capite rotundato. Fr. svec 298.

Art. gen. 63. syn. 87. Lophius ore cirroso.

It. scan. 327. Lophius ore cirroso.

Mus. Ad. Fr. 55. Lophius ore cirroso.

Stræm. foud. 271. Lophius B. 6. D. 11. P. 26. V. 55.

A. 10. C. 6.

Barlac. cornub. 265. t. 27. f. 3, 6. Rana piscatrix.

Gron. mus. 1. p. 57. Lophius ore cirroso.

Charl. onom. 199. t. 201. Rana piscatrix.

Olear. mus. 37. t. 23. f. 4. Rana piscatrix.

Habitat in Oceano Europæo, sub lapidum fornicibus.

Pinnæ D. 10. P. 24. V. 5. A. 9. C. 8.

Caput corpore majus. Piscatur tentaculis binis capitis tamquam lineis piscatoriis.

Confer. Act. angl. 1764. n. 53. p. 170. t. 13.

Vespertilio. 2. L. depressus, capite rostrato.

lic.

Art. syn. 88. Lophius fronte unicorni.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 55. Lophius fronte unicorni.*

*Edw. av. 2. t. 283. f. 1.*

*Gron. mus. 1. n. 129. Lophius fronte unicorni.*

*Seb. mus. 1. p. 118. t. 74. f. 2. Rana piscatrix americana.*

*Marcgr. bras. 143. Guacu-cuja.*

*Raj. pisc. 30. Guacu-cuja.*

*Habitat in Oceano Americano.*

*Pinnæ D. 5. P. 10. V. 6. A. o. C. 15.*

*Confer. Brown. jam. 157. t. 48. f. 3. differens capite retuso. Gron. zooph. 210. cui D. 12. P. 10. V. 6. A. o. C. 9.*

istrio.

3. *L. compressus.*

*Chin. Lagerstr. 21. Lophius pinnis dorsalibus tribus.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 56. Balistes f. Guaperua chinensis.*

*It. wgoth. 137. t. 3. f. 5. Balistes f. Guaperua.*

*Marcgr. bras. 150. Guaperua.*

*Pet. gaz. t. 20. f. 6. Piscis bras. cornutus.*

*Will. icht. 50. t. E. 2. f. 2. Guaperua.*

*Osborne. iter. 305. Lophius tumidus.*

*Habitat in Pelago inter Fucum natantem.*

*Pinnæ D. 1, 1, 12. P. 10. V. 5. A. 7. C. 10.*

34.

**ACIPENSER.** *Spiracula lateralia solitaria, linearia.*

*Os sub capite, retractile, edentulum. Cirri sub rostro, ante os.*

curio.

1. *A. cirris 4, squamis dorsalibus 11. Mus. Ad. Fr. 1. p. 54. t. 18. f. 2. In. svec. 299.*

*It. scan. 187. Acipenser.*

*Art. gen. 65. syn. 91. Acipenser corpore tuberculis spinosis aspero.*

*Faun. svec. 27. Acipenser idem.*

*Gron. mus. 2. p. 42. Acipenser idem.*

*Habitat in Mari Europæo.*

*Pinnæ D. 31. P. 30. V. 19. A. 24. C. 24.*

*Severi imp. ævo a coronatis ministris, præeunte tibicine, ad epulas adsportabatur.*

thenus.

2. *A. cirris 4, squamis dorsalibus 15. Mus. Ad. Fr. 1. p. 54. t. 18. f. 2. In. svec. 300.*



*Faun. svec.* 272. Acipenser ordinibus 5 squamarum  
ossearum : intermedio officulis 15.

*Brun. it.* 93. t. 33. Strelet.

*Habitat in Rutheno ; introductus a Rege Friderico  
in Mælerum Sveciæ.*

*Ova hujus ♂ Hufonis pro Garo Cavear dicto.*

**Huso.** 3. *A. cirris* 4, squamis dorsalibus XIII, caudalibus XL.

*Art. gen.* 65. *syn.* 92. Acipenser tuberculis carens.

*Kram. austr.* 385. Acipenser corpore tuberculis  
sito, rostro obtuso, oris diametro rostri longi-  
tudinem superante.

*Habitat in Danubio, Wolga fluviisque aliis Imp-  
Ruthenici. Corium pro lineis curvum præstans  
mum ; ab eo Ichthyocolla præparatur ♂ ex ovibus  
conficitur.*

*Corporis ossea tubercula senioribus evanescent ; junioribus  
dorsalia 13, lateralia utrinque 43. Kr.*

### 135. BALISTES. Caput compressum.

*Dentes* utriusque 8 ; horum  
teriores 2 longiores.

utrinque 3 interiores, intra  
tidem laterales, adpressi.

*Apertura* supra pinnas pectorales.

*Corpus* compressum squamis  
radio coadunatis. *Abdomen*  
rinatum.

**Monoce.** 1. *B. pinna* capitis uniradiata, radiis caudalibus carinatis.  
*ros.*

*Mus. Ad. It.* 2. p. 53. \* *D.* 1, 46. *P.* 14. *V. o. A.* 50. *C.*

*Osb. iter.* 110. Balistes

*Monoceros.* *D.* 1, 47. *P.* 13. *V. o. A.* 51. *C.*

*Catesb. car.* 2. t. 19. Uni-  
cornu piscis bahamensis.

*Habitat in Asia, America.*

*Carina abdominis intra cutem, sed ad apicem denticulis reversis 4 transverse positis. Spina verticis postice aculeis duplicis ordinis nutantibus.*

hispidus. 2. B. pinna capitis uniradiata, rostro subulato, pinna caudæ oculo nigro. D. 1, 30. P. 14. V. 1. A. 29. C. 12. Seb. mus. 3. p. 106. t. 34. f. 2.

Balistes varius dorso monocantho, rostro fuillo, macula nigra in externa cauda.

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Corpus hispidum, versus caudam setis exasperatum. Spina capitis inter oculos sita subdecumbens. Membranæ omnium pinnarum ad basin foramine inter radios hiantes. Rostrum subsubulatum. Pinn. ventralium loco spina ferrata acuta.*

omento- 3. B. pinna capitis biradiata, corpore posterius subvilloso.

Gron. mus. 1. n. 114. t. 6.

f. 5. Balistes aculeis dorfi 2, lateribus versus caudam hirsutis.

D.  $\frac{1}{2}$ , 29. P. 10. V. 0. A. 27. C. -

Clus. exot. 143. Raj. pisc.

47. Monoceros piscis.

Marcgr. bras. 154. Pira-aca.

Seb. mus. 3. t. 24. f. 18, 19.

*Habitat in America.*

papillo- 4. B. pinna dorsali anteriore  
sus. biradiata, corpore papilloso. Mus. Ad. Fr. 2.

54 \*

D.  $\frac{1}{2}$ , 29. P. 13. V. 0. A. 21. C. 12.

*Habitat - - -*

verruco- 5. B. pinna dorsali anteriore  
sus. triradiata, cauda ordine triplici verrucarum. Mus.

Ad. Fr. 1. p. 57. t. 27.

f. 4.

D. 3, 24. P. 13. V. 0. A. 21. C. 12.

*Habitat in India.*



*Pinnae ventralis loco radius magnus, crassus, verrucosus. Aculei ad latus caudæ circiter 25, quadruplici ordine dispositi, parvi, reversi; adeoque varietatem sequentis facit D. Gronovius.*

aculeatus, 6. B. pinna dorsali anteriore triradiata, caudæ lateribus spinis recumbentibus.

*It. wgoth. 138. Ostracion compressus, fasciis nigris, cauda lateribus muricata.*

D. 3, 24. P. 13. V. c. A. 21. C. 122

*Gron. zooph. 188. Balistes rostro subobtusum, radio dorsali antrorsum serrato, ventrali humili scabro.*

D. 2. P. -- V. 1. A. 22. C. --

*Seb. mus. 3. t. 24. f. 15, 15.*

*Habitat in India.*

*Simillimus priori statura 3 radiis; differt colore, sed imprimis nota illa singulari, quod ad latera caudæ utrinque notetur quadruplici circiter ordine spinarum recumbentium; cum præcedens eodem loco verrucas rotundas scabras gerat.*

Vetula. 7. B. pinna dorsali anteriore triradiata, ventrali longi-

• tudinali, caudali bifida. D. 3, 30. P. 16. V. 16. A. 28. C. 122

*Catesb. car. 2. p. 22. t. 22.*

*Turdus oculo radiato.*

*Art. gen. 53. syn. 82. Balistes aculeis dorsi tri-*

bus, cauda bifurca. D. 3, 30. P. 15. V. 17. A. 27. C. 122

*Osbeck. iter. 294. Balistes*

*Vetula.*

D. 3, 30. P. 14. V. 12. A. 28. C. 122

*Gron. zooph. 195. Balistes ossiculis lateralibus caudæ & anticis pinnae dorsalis posterioris filamentosis*

*Brown. jam. 456. Balistes major fasciata, dorso triacantho, cauda bifurca: radiis exterioribus longissimis.*

*Seb. mus. 3. t. 24. f. 14.*

*Habitat ad insulam Ascensionis.*

*E. Carolinæ eandem D.*

*Garden.*

*D. 3, 27. P. 14. V. 14. A. 25. C. 12.*

*Pinna ventralis longitudinalis, quasi carinata, huic speciei propria.*

*ringens. 8. B. pinna dorsali anteriore*

*triradiata, lateribus capit*

*is triplicatis, cauda bifi-*

*da. Mus. Ad. Fr. 1. p. 58.*

*It. wgoth. 139. Ostracion*

*compressus rufescens,*

*pinnae dorsalis radio lon-*

*go retrorsum denudato. D. 3, 30. P. 10. V. 0. A. 26. C. 10.*

*Osbeck. itin. 295. Balistes.*

*nigra.*

*D. 2, 34. P. 16. V. 0. A. 31. C. 13.*

*Gron. zooph. 195. Balistes*

*rostri obtuso, radio dor-*

*fali ventralique brevi re-*

*tuso scabro: lateribus pa-*

*rallele punctatis.*

*D. 2, 28. P. -- V. 1. A. 25. C. --*

*Habitat ad ins. Ascensionis.*

**136. OSTRACION.** *Caput: Dentes utrobique 10 por-*  
*recti, teretes, obtusiusculi.*

*Apertura linearis.*

*Corpus osse integro loricatum.*

*Pinnae ventrales nullae.*

*triqueter. 1. O. trigonus muticus.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 60.*

*Ostracion polyodon*

*inermis triqueter.*

*D. 10. P. 12. V. 0. A. 10. C. 10.*

*Art. gen. 57. syn. 85. O-*

*stracion triangulus, tu-*

*berculis exiguis innu-*

*meris, aculeis carens. D. 10. P. 12. V. 0. A. 10. C. 10.*

*Seb. mus. 3. t. 24. f. 6, 12.*

*Habitat in India.*



*Dorsum quasi rhombis transverse dissectis tectum, margine repandum.*

trigonus. 2. *O. trigonus* spinis subcaudalibus 2, pinna dorsali radiis XIV.

*Art. gen. 56. syn. 85. Ostracion triangulus, limbis figurarum hexagonarum eminentibus, aculeis 2 in imo ventre.*

*It. scan. 160. Ostracion polyodon tetragonus abdomine pone bicorni. D. 14. P. 10. V. 0. A. 9. C. 7. Habitat in India.*

bicaudalis. 3. *O. trigonus*, spinis subcaudalibus 2, pinna dorsali radiis decem.

*Art. gen. 57. syn. 85. Ostracion triangulatus, tuberculis hexagonis radiatis, aculeis 2 in imo ventre. D. 10. P. 12. V. 0. A. 10. C. 10.*

*Seb. mus. 3. t. 24. f. 3.*

β. *Art. gen. 57. syn. 85. Ostracion triangulatus totus maculosus ac tuberculatus, aculeis 2 in imo ventre.*

*D. 10. P. 11. V. 0. A. 10. C. 10.*

*Habitat in India.*

*Varietatem prioris putat Gronovius.*

tricornis. 4. *O. trigonus*, spinis frontilibus duabus, dorsali unica.

*Art. gen. 56. syn. 85. Ostracion triangulatus, aculeis 2 in capite & unico longiore superne ad caudam.*

*Edw. av. 3. p. 158. t. 284. f. 1.*

*Seb. mus. 3. t. 24. f. 2.*

*Habitat in India.*

quadri-  
cornis.

5. *O. trigonus*, spinis frontalibus subcaudalibusque binis.

*Art. gen.* 56. *syn.* 85. *Ostracion* triangulatus, 2 aculeis in fronte & totidem in imo ventre.

*D.* 10. *P.* 11. *V.* 0. *A.* 10. *C.* 10.

*Edw. av. t.* 284. *f.* 1.

*Habitat in* India, Guinea.

cornutus.

6. *O. tetragonus*, spinis frontalibus subcaudalibusque binis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 59. *Ostracion* polyodon tetragonus, antice postice dorsoque spinosus.

*D.* 9. *P.* 10. *V.* 0. *A.* 9. *C.* 10.

*Gron. mus.* 1. *n.* 118. *Ostracion* quadrangularis, aculeis 2 in fronte & totidem in imo ventre.

*D.* 11. *P.* 9. *V.* 0. *A.* -- *C.* 5.

*Will. icht. t.* J. 13. *f.* 1.

*Piscis cornutus.* *Bont.*

*jav.* 79.

*Seb. mus.* 3. *t.* 24. *f.* 8, 13.

*Habitat in* India,

tubercu-  
latus.

7. *O. tetragonus muticus*, tuberculatus dorsalibus 4.

*Art. gen.* 55. *syn.* 84. *Ostracion* quadrangulus, tuberculis 4 majoribus in dorso.

*Habitat in* India.

gibbosus.

8. *O. tetragonus muticus gibbosus*.

*Art. gen.* 55. *syn.* 83. *Ostracion* quadrangulus gibbosus.

*Habitat in* Africa.

*Varietatem speciei* 1 credit Gronovius.

C c 5

9. O.

Species hujus generis dubiæ ob sexus differentias, non dum notas, ideoque forte multiplicatæ.



cubicus. 9. *O. tetragonus muticus*, lateribus planiusculis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 59.* Ostracion polycodon tetragonus inermis.

D. 9. P. 10. V. 0. A. 10. C. 10.

*It. wgoth. p. 138.* nomen Artedii.

D. 10. P. 8. V. 0. A. 9. C. 10.

*Art. gen. 56. syn. 85.* Ostracion quadrangulus, maculis variis plurimis.

D. 9. P. 10. V. 0. A. 8. C. 10.

*Pet. gaz. 1. t. 1. f. 2.*

*Seb. mus. 3. t. 24. f. 4, 5.*

*Habitat in India.*

137. **TETRAODON.** *Caput: Maxillæ ossæ, porrectæ, apice bipartitæ.*

*Apertura linearis.*

*Corpus subtus muricatum.*

*Pinnæ ventrales nullæ.*

testudine- 1. *T. abdomine plano lævis.*  
us. ore, dorso futuris curvis albis picto.

*Art. gen. 60. syn. 86.* Ostracion oblongus glaber, corpore figuris variis ornato.

D. 14. P. 14. V. 0. A. 6. C. 9.

*Amæn. acad. 1. p. 309. t.*

14. f. 3. idem.

D. 6. P. 14. V. 0. A. 6. C. 9.

*Habitat in India.*

*Corpus supra scabriusculum, subtus punctis pertusum, intra quæ aculei latent.*

lagoce- 2. *T. abdomine aculeato,*  
phalus. corpore lævi, humeris prominentibus.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 59.* Ostracion tetraodon ventricosus, abdomine muricato.

D. 10. P. 18. V. 0. A. 8. C. 10.

*Art. gen. 58. syn. 86.* Ostracion cathetoplateo-ob-

longus, ventre tantum aculeato & subrotundo.

*Amæn. acad.* 1. p. 310. t.

14. f. 4. idem.

D. 9. P. 17. V. 6. A. 9. C. 7.

*Gron. mus.* 1. n. 120. zooph.

183. Ostracion catheto-

plateus tetraodon com-

pressus maculosus scaber. D. 9. P. 16. V. 6. A. -- C. --

*Seb. mus.* 3. t. 23. f. 5.

D. 10. P. 15. V. 6. A. 13. C. 12.

*Habitat in India.*

lineatus. 3. T. fasciis longitudinalibus fuscis pallidisque. *Mus.*

*Ad. Fr.* 2. p. 55. \*

D. 11. P. 18. V. 6. A. 9. C. 11.

*Hasselq. itin.* 400. Tetrao-

don Fahaca.

D. 12. P. 21. V. 6. A. 7. C. 11.

*Habitat in Nilo.*

*Aculei abdominis venenati pungunt, quasi urticatione.*

ocellatus. 4. T. fascia humerali ocellata. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 55.

D. 14. P. 18. V. 6. A. 12. C. 7.

*Osbeck. itin.* 226. Diodon

ocellatus.

D. 15. P. 18. V. 6. A. 11. C. 8.

*It. scan.* 260. Ostracion maculosus, abdomine muricato.

D. 12. P. 20. V. 6. A. 12. C. --

*Art. gen.* 58. *syn.* 85. Ostracion maculosus, aculeis undique densis exiguis.

*Seb. mus.* 3. t. 23. f. 7, 8.

*Habitat in Asiæ & Ægypti Aquis dulcibus.*

*Venenatus piscis, uti præcedens; venenumque Illicio acuitur. Kämpf. amæn.* 883, sed curatur Rege amaroris. *Rumph.* 11, 49.

lævigatus. 5. T. abdomine antice aculeato.

D. 13. P. 18. V. 6. A. 12. C. 11.

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Corpus magnum Dorso cærulescente, lateribus lineis utrinque duabus; Ventre albo ab ore ad finem p. pectoralium tantum aculeato.*

hispidus. 6. T. totus hispidus papillis setaceis.



*Chin. Lagerstr.* 23. Ostracion tetraodon ventricosus, corpore toto muricato.

D. 9. P. 17. V. o. A. 10. C. 10.

*Art. gen.* 58 *syn.* 83. Ostracion tetraodon sphaericus, aculeis undique exiguis.

*Habitat in India.*

Mola. 7. *T. lævis compressus*, cauda truncata: pinna brevissima dorsali analique annexa.

*Art. gen.* 61. *syn.* 83. Ostracion cathetoplateus subrotundus inermis asper, pinnis pectoralibus horizontalibus, foraminibus 4 in capite.

D. -- P. 14. V. -- A. -- C. --

*Act. bonon.* 2. pp. 2. p. 297. t. 17. Mola.

β. *Gron. mus.* 1. n. 125. Ostracion cathetoplateus subcompressus, pinna dorsali & anteriori cum cauda continuatis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

138. DIODON. *Caput* Maxillæ ossæ, porrectæ, indivisæ.

*Apertura* linearis.

*Corpus* spinis acutis mobilibus undique adpersum.

*Pinnæ ventrales* nullæ.

*Atranga.* 1. *D. sphaericus*, aculeis triquetris.

D. 14. P. 21. V. o. A. 6. C. 10.

*Art. gen.* 59. *syn.* 86. Ostracion bidens sphaericus, aculeis undique densis triquetris.

*Seb. mus.* 3. t. 23. f. 3.

β. *Diodon reticulatus* subrotundus, aculeis triquetris.

*Syst. nat.* 10. p. 334, n. 2.

*Art. gen.* 59. *syn.* 86. *Ostracion* subrotundus, aculeis undique brevibus triquetris raris.

*Habitat in* India.

γ. *D. echinatus* subrotundus, aculeis basi triquetris. *Syst. nat.* 10. p. 335.

*Art. gen.* 60. *syn.* 86. *Ostracion* subrotundus, aculeis undique densis basi triquetris.

*Seb. mus.* 3. t. 23. f. 1, 2.

*Habitat in* India.

*Conjunxit α. β. γ. Gronovius.*

**Hystrix.** 2. *D. oblongus*, aculeis teretibus.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 58. *Ostracion* diodon, corpore spinis undique armato. D. 14. P. 22. V. o. A. 14. C. 9.

*Art. gen.* 60. *syn.* 86. *Ostracion* conico-oblongis teretiformibus imprimis in lateribus.

*Amæn. acad.* 1. p. 310. idem.

*It. scan.* 285. idem. D. 14. P. 22. V. o. A. 14. C. 9.

*Seb. mus.* 3. t. 23. f. 1, 2, 4.

β. *D. holocanthus* aculeis capite collique longioribus.

*Syst. nat.* 10. n. 6.

*Art. gen.* 60. *syn.* 89. *Ostracion* oblongus holocanthus, aculeis longissimis teretiformibus in capite imprimis & in collo.

*Habitat ad* Cap. b. spei.



139. CYCLOPTERUS. *Caput obtusum.**Dentes maxillares.**Membr. branch. rad. IV.**Pinnæ ventrales in orbiculum connatæ.*Lumpus. 1. C. corpore squamis ossiis angulato. *Mus. Ad. Fr.*1. p. 57. *Fr. svec.* 320.*It. scan.* 188. Cyclopterus. D. 0, 21. P. 20. V. 6. A. 10. C. 9.*Art. gen.* 62. *syn.* 87. Cyclopterus.*Gron. mus.* 127 *zooph.* 197.

idem.

D. 21. P. 20. V. 15. A. 10. C. 12.

B. *Diodon spinosus* subrotundus aculeis planis, abdomine lævi. *Syst. nat.* 10. n. 4.*Art. gen.* 59. *syn.* 86. Ostracion subrotundus aculeis brevibus planis, ventre glabro.γ. *Diodon varior* pinna dorsiflongissima.*Syst. nat.* 10. p. 336. n. 7.*Art. gen.* 59. *syn.* 86. Ostracion rotundo-oblongus, tuberculis utrinque, pinna dorsiflongissima.*Habitat α in Europa. β, γ. in Indiis; orbiculo e pinnis ventralibus adheret lapidibus.*

Varietates β, γ. fecit Gronovius.

Nares solitariae. Pinna dorsalis prior adiposa; caudalis distincta a dorsali analique.

nudus.

2. C. corpore nudo, capite postice utrinque unispinoso. *Mus. Ad. Fr.* 1.

1. p. 57. t. 27. f. 1. B. 1. D. 6. P. 21. V. 10. A. C. 10.

*Habuat in India.*

Liparis.

3. C. corpore nudo, pinnis dorsali anali caudalique unitis.

*Art.*

Art. syn. 117? Liparis.

Gron. mus. 157. *Act. helv.*

4. p. 265. t. 23. *Act.*

harlem. 1. p. 581. t. 9. f.

3, 4. Cyclogaster.

B. 7. P. 29. V. -- A. 33. C. 9.

*Habitat in Oceano septentrionali.*

140. CENTRISCUS. *Caput productum in Rostrum angustissimum.*

*Apertura repanda.*

*Abdomen carinatum.*

*Pinnæ ventrales unitæ.*

scutatus. 1. C. dorso loricato levi.

Gron. mus. 2. p. 171. t. 7.

f. 3.

D. 3. 9. P. 10. V. 6. A. 11. C. 9.

Valentyn. amb. 4. p. 420. n.

243. f. 243, 254. Ikan.

Pisau.

Seb. mus. 3 p. 103 t. 34.

f. 5. Amphisclen cauda recta.

*Habitat in India orientali.*

*Singularis piscis loricatus testa ossea longitudinali postice in spinam terminata, sub qua cauda; sed, inter spinam & caudam, pinnæ dorsi sunt.*

Scolopax.

2. C. corpore squamoso scabro, cauda recta extensa.

Gron. zooph. 395.

B. 3. D. 4, 12. P. 17. V. 5. A. 25. C.

Syst. nat. 10. p. 329. n. 8.

Balistes Scolopax pinna dorsali anteriore 5-radiata, rostro longissimo maxilla inferiore operculato.

Art. gen. 54. syn. 82. Balistes aculeis 2 loco pinnarum ventralium, solitario infra anum.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Pinnæ ventrales binæ, 4-radiatæ; abdominales in carina abdominis reconditæ. Opercula branchialia monophylla. Dentes nulli.*



141. SYNGNATHUS. *Caput* : *Rostrum* subcylindricum, ore operculato maxilla inferiore.

*Apertura* branchiarum operculis clausis; nucha foramine spirans.

*Corpus* cataphractum.

*Pinnæ ventrales* nullæ.

Typhle. 1. *S. pinnis* caudæ ani pectoralibusque radiatis, corpore sexangulata. *Faun. svec.* 277.

*Art. gen.* 1. *syn.* 1. *spec.*

3. *Syngnathus* corpore medio hexagono, cauda pinnata.

*D.* 36. *P.* 14. *V. o. A.* 3. *C.* 102

*Gron. mus.* 1. n. 4. idem. *D.* 7. *P.* 9. *V. o. A.* 0. *C.* 121

*Habitat* in Europa.

*Laminæ corporis trunci* 18, *caudæ* 36.

*Varietatem sequentis facit Gronovius.*

Acus.

2. *S. pinnis* caudæ ani pectoralibusque radiatis, corpore septem - angulato. *Fn. svec.* 276.

*Art. gen.* 1. *syn.* 2. *spec.* 2.

*Syngnathus* corpore medio heptagono, cauda pinnata.

*D.* 38. *P.* 12. *V. o. A.* 5. *C.* 103

*Gron. mus.* 1. n. 3. idem. *D.* 37. *P.* - *V. o. A.* 0. *C.* 102

*Habitat* in Europa.

*Laminæ corporis trunci* 20, *caudæ* 43.

pelagicus. 3. *S. pinnis* pectoralibus caudæque radiatis, ani nulla, corpore septemangulato.

*Osbeck itin.* 105. *Syngnathus* pelagicus.

*D.* 31. *P.* 14. *V. o. A.* 0. *C.* 102

*Habitat* in *Fuco* natante.

*Laminæ corporis heptagoni* 18 *Caudæ tetragonæ* 32.

*Varie-*

Varietatem *simillimam* misit e Carolina D. Garden.  
Cui *laminæ corporis* 25, *P. dorsalis* 33. *C. tetrago-*  
*næ* 32.

æquo- 4. S. pinna caudæ radiata ,  
reus. pectoralibus anique nul-  
lis , corpore angulato D. 30. P. 0. V. 0. A. 0. C. 5.  
*Habitat in Pelago.*

Ophi- 5. S. pinnis caudæ ani pecto-  
dion. ralibusque nullis , cor-  
pore tereti. *Faun. svec.*  
275.  
*Art. gen. 1. syn. 2. spec.*  
1. Syngnathus teres ,  
pinnis pectoralibus cau-  
dæque carens. D. 34. P. 0. V. 0. A. 0. C. 0.  
*Gron. mus. 1. n. 2. idem.* D. 42. P. 0. V. 0. A. 0. C. 0.  
*Habitat in Europa.*

barbarus. 6. S. pinnis caudæ anique nul-  
lis , corpore sexangulato. D. 43. P. 22. V. 0. A. 0. C. 0.  
*Habitat in Pelago.*

Hippo- 7. S. pinna caudæ quadrangu-  
campus. læ nulla , corpore septem-  
angulato tuberculato. D. 20. P. 13. V. 0. A. 4. C. 0.  
*Art. gen. 1. syn. 1.* Syngna-  
thus corpore quadran-  
gulo, pinna caudæ carens. D. 35. P. -- V. 0. A. 0. C. 0.  
*Olear. mus. 53. t. 26. f. 4.*  
Hippocampus.  
*Bradl. natur. t. 4. f. 3.* E-  
quus marinus.  
*Habitat in Pelago.*  
*Laminæ corporis trunci* 17 , *caudæ* 45.  
Corpus cataphractum , antice lituris , postice punctis al-  
bis adpersum. Aculei in corpore 3 utrinque , 4  
in caudâ antica , 2 postice. Cirri supra oculos soli-  
tarii ; verticis 2 utrinque , frontis 3 transverhm positi :  
Pinna Dorsalis limbo nigro , margine albo. Analis  
minima , potius ventralis dicenda , cum ante anum  
sit collocata.



142. PEGASUS. *Caput* : Os proboscide retractili ;  
 maxilla superiore denticulata ,  
 sub rostro ensiformi , lineari.  
*Aperturâ* branchiarum ante pin-  
 nas pectorales.  
*Corpus* articulatum osseis incisuris ,  
 cataphractum.  
*Pinnæ* ventrales abdominales.

raconis. 1. P. rostro conico.

D. 4. P. 10. V. 1. A. 5. C. 13.

Gron. zooph. 356. t. 12. f.

2, 3. Cataphractus corpore  
 tetragono brevi scabro.

Gron. mus. 1. p. 65. n. 146.

Valent. ind. 3. p. 428. f. 271.

Ruysch. theatr. t. 7. f. 2, 3.

Seb. mus. 3. p. 106. t. 34.

f. 4.

*Habitat in India.*

volans. 2. P. rostro ensiformi denticu-  
 lato.

Mus. Ad. Fr. 2. p. 56. Pe-  
 gasus rostro conico.

*Habitat in India.*

atans. 3. P. rostro ensiformi inermi.

Gron. zooph. 357. Cata-  
 phractus rostro spatuli-  
 formi truncato.

*Habitat in India.*

D. 5. P. 9. V. 1. A. 5. C. 14.

## CLASSIS IV.

## PISCES.

---

*Quis, nisi vidisset, Pisces habitare sub unda  
crederet?*

---

AQUEI Elementi muti surdique Volucres compendiosissimi respirant *Branchiis* arcu osseo innexis, natant *Pinnis* radiatis, vestiuntur *Squamis* cartilagineis.

INSTRUUNTUR Capite, Thorace, Abdomine, Cauda, *Pinnis*; Cerebro Medullaque spinali, Corde uniloculari uniaurito, *Branchiis*, Diaphragmate, Hepate vesiculaque fellea, Liene, Pancreate, Renibus Vesicaque urinaria, vesiculis feminalibus Ovariisve, intestinis cæcoque, Membrana nictitante; imo & naribus, modo vere talibus; plerisque etiam Vesica natatoria.

DESTITUUNTUR Palpebris, Auribus Auriculisque, Collo, artuum *Brachii* *Tibiisque*, penè Vulvave.

DIVIDITUR horum Corpus externum in *Caput*, *Truncum*, *Pinnas*.

CAPUT compressum (*Cathetoplateum*) s. depressum\* (*Plagioplateum*;) nudum, squamosum, læve, spinosum s. muticum.

*Os* Labiis carnis, aut osseis clausile.

*Dentes* sæpe in *Maxillis*, *Palato*, *Lingua*, *Fauce*.

*Oculi* 2, nudi, membrana nictitante; *Pupilla* crystallina globosa.

*Nares*? pertusæ, binæ geminatae, minus prominentes.

*Cirri* filiformes, mollusci, labiis sæpius inserti, prætentantes.

*Aperturæ* branchiarum per *branchias* in os hiantes, instructæ operculis pinnaque branchioflega.

*Opercula* branchias tegentia, aperturas claudentia.

*Branchiæ* extus spirantes comprimendæ, sæpius quatuor, radio arcuato osseo (\*) adnatæ, radiis liberis pectinatae.

D d 2

TRUN-

---

(\*) Radius osseus Branchiarum deest in Nantibus.

Cataphracti: *Silurus cataphractus*, *Cottus cataphractus*, *Trigla cataphracta*, *Loricaria*.

Volitantes: *Exocoetus volitans volansque*, *Trigla volitans*, *Gasterosteus volitans*.



**TRUNCUS** teres, compressus, depressus; squamosus s. nudus (*alepidotus*) mucosus; oblongus, postice angustatus in Caudam; *Squamæ* plerisque cartilagineæ, rarius ciliatæ, nonnullis ossæ, ut piscis loricatus evadat Cataphractus.

*Linea lateralis* utrinque, distincta a *linea interstitiali*, sæpius ex glandulis punctata, rarius loricata, utraque recta aut curva; in quibusdam Caudam utrinque carinatum constituentem.

*Thorax* refertus Corde intra Pericardium suum.

*Abdomen* costatum Visceribus, intestinis, Vesicula aërea; Genitalia ovisque repletum.

*Anus* abdomen terminans, communis Intestinis, Vesicæ & Genitalibus.

*Cauda* postica Trunci pone anum, solida musculosa.

**PINNÆ** Membranaceæ explicandæ Radiis cartilagineis: qui *Spinosi* duriores, ossei, simplices, pungentes (\*) *acantopterygiis*.

*Mutici* flexiles, tendinei, dichotomi *malacopterygiis*.

*Branchiostegæ* sub operculis branchiarum pares, plicatiles radiata membrana; hæc Artedio primaria.

*Dorsalis* dorso longitudinalis imposita, impar; sæpe 1, rarius 2, paucissimis 3.

*Adiposa*, dorsalis spuria, radiis destituta, impar.

*Pectorales* ad latera thoracis positæ, pares.

*Ventrales* corpori subtus annexæ, inter caput & anum, pares.

*Anal* pone anum, sub cauda, longitudinalis, impar.

*Caudalis* terminalis, perpendicularis, impar: rotunda, integra bifurca s. lunula, cuneata.

**PISCES** hi muti surdique ætheris sonum non audiunt, aëris licet tremorem sentiant, *Respirant* latere extrorsum aquam, *Mouvent* se Pinnis explicatis, dum *Caudali* propelluntur, *Dorsali* *Analique* tamquam Gubernaculo reguntur, *Pectoralibus* tamquam Alis attolluntur, *Ventralibus* tamquam Pedibus insistant. *Fugiunt* natatu diversimodo; *Defenduntur* Spinis tamquam murice; *Vivunt* Muco, Insectis, Vermibus, Cadaveribus, Pisciculis, Plantis.

Hi.

(\*) Recumbens spina nonnullis antrorsum decumbit ante pinnam dorsi aut ani. Vesica aërea attollit pisces: pertusa facit ut in fundo repant: & hac destituti semper in fundo degant.

Ætas a circulis concentricis vertebrarum numeranda.

Spinæ a radiis geminis coadunatis ortæ, nec ut mutici radiis dichotomis.

*Historia* horum ex Structura , Alimento , Solo , Moribus , Migrationibus & Ufu in Piscatura , Culina , Oeconomia , Mechanica , Medicina.

**OCUS** omnium laquaticus est ; forte etiam omnes marini ; sed alii imprimis *lacustres* aquas dulces inhabitantes ; varii etiam *fluviatiles* , sæpe e mari adscendentes ; plurimi mere *marini* , qui aquas dulces non ferunt ; horum plerique littora adunt pro generandis ( \* ) & pariendis ovis , calidiore aqua excludendis , nisi mere *pelagici* natantibus ovis , a littoribus semper alieni , sed omnium alii *diurni* alii *nocturni* ; illi plerique natant in aquis , hi vero sæpius in fundo pascuntur. Alii demum subsolitarii vagantur , alii gregatim degunt. Disseminantur ab Anatibus.

**ONSERVANTUR** in *Spiritu vini* , vel dimidiati excoriati exsiccati adglutinati. ( *Act. angl.* 42. n. 463. p. 157. ) aut gypso pulcherrime farcti verniceque obducti , more *Cl. Schefferi*.

**SUS** : victus tenuis e piscibus nuper enectis , thoracicis , exercitatis , imprimis assatis , Veteribus in pretio *Mullus* , *Scarus cret.* *Aurata* , *Julis* , *Sphyræna* , *Muræna* , Hodiernis in deliciis *Carpio* , *Carassius* , *Aspius* , *Brama* , *Salmo*.

**CHTHYOLOGI** Practici *Bellonius* 1552 , *Rondeletius* 1554 , *Salvianus* 1554 , *Gesnerus* 1558 , *Aldrovandus* 1605 , *Willughbæus* 1685 , *Rajus* 1710 , *Seba* 1760.

Theoretici *Artedi* ! *Nos* , *Gronovii* , *Hasselquist* , radios pinnarum observarunt ; At *Valentynus* defectum artis exposuit ; *Catesbæus* pulchre quosdam depinxit americanos. *Garden P.* carolinæ descriptos misit.

Synonyma ab *Artedio* petenda , ego itaque ea seposui.

**DESCRIPTIONES** fistant præcipue *Corpus* compressum s. depressum ; squamosum s. alepidotum , *acanthopterygium* s. *malacopterygium* ; *cirros* , *Lineam lateralem* , *Pinnae* Branchiales , Dorsalem , Pectorales , Ventrals , Analem Caudalem cum *radiis spinosis* s. *muticis* , integram s. divisam , sed præprimis *Dentes* & *oris instrumenta* , ut *Generum* characteres perficiantur.

Generatio *Piscium* etiamnum obscura est.

*Renard Ludv.* *Poisons écrevisses* *Amst.* 1754. fol. colorat. figuris fictis.



**DIVISIONEM** Piscium , artis normam , a variis partibus tentarunt varii. Recentiorum immortalis Artedi Spinosos *Acanthopterygios* & Inermes *Malacopterygios* secundum Membranam *Branchiostegam* secutus est , sed deseruit non semel bivio constitutum ; propriam itaque tentavi viam a **PEDIBUS** ante *Alas* , sub *Ais* , pone *Alas* sitis.

**Pinnæ ventrales nullæ omnino APODES.**

— — ante pinnas Pectorales **JUGULARES.**

— — sub pinnis Pectoralibus **THORACICI.**

— — pone pinnas Pectorales **ABDOMINALES.**

## CHARACTERES PISCUM.

## I. APODES.

143. MURÆNA Aperturæ branchiarum ad latera thoracis.  
 144. GYMNOTUS Dorsum apterygium.  
 145. TRICHIURUS Cauda aptera.  
 146. ANARHICHAS Dentes rotundati.  
 147. AMMODYTES Caput corpore angustius.  
 148. OPHIDIUM Corpus ensiforme.  
 149. STROMATEUS Corpus ovatum.  
 150. XIPHIAS Rostrum ensiferum.

## II. JUGULARES.

151. CALLIONYMUS Aperturæ Branch. ad nucham.  
 152. URANOSCOPUS Os sinum.  
 153. TRACHINUS Anus prope pectus.  
 154. GADUS Pinne Pectorales elongatæ in acumen.  
 155. BLENNIUS Pinne Ventrals didactylæ muticæ.

## III. THORACICI.

156. CEPOLA Os sinum. Corpus ensiforme.  
 157. ECHENEIS Capitis dorsum planum transversim sulcatum.  
 158. CORYPHÆNA Caput antice truncato-obtusum.  
 159. GOBIUS Pinne Ventrals coadunatæ in pinnam ovatam.  
 160. COTTUS Caput corpore latius.  
 161. SCORPÆNA Caput cirris adpersum.  
 162. ZEUS. Labium superius membrana transversa fornicatum.  
 163. PLEURONECTES Oculi ambo in latere altero capitis.  
 164. CHÆTODON Dentes setacei, confertissimi, flexiles.  
 165. SPARUS Dentes validi, incisores s. molares.  
 166. LABRUS Pinna Dorsalis ramento post spinas notata.  
 167. SCIÆNA Pinna Dorsalis in fossula recondenda.  
 168. PERCA Opercula branchiarum serrata.  
 169. GASTEROSTEUS Cauda lateribus carinata; Spinæ dorsales distinctæ.  
 170. SCOMBER Cauda lateribus carinata; Pinnulæ spuriae plures.  
 171. MULLUS Squamæ, etiam capitis, laxæ.  
 172. TRIGLA Digiti distincti juxta pinnas pectorales.



## IV. ABDOMINALES.

- |                  |  |
|------------------|--|
| 173. COBITIS     | <i>Corpus vix ad Caudam angustatum.</i>                  |
| 174. AMIA        | <i>Caput nudum, osseum, scabrum.</i>                     |
| 175. SILURUS.    | <i>Radius 1 pinnae Dorsalis Pectoraliumque dentatus.</i> |
| 176. TEUTHIS     | <i>Caput antice truncatum.</i>                           |
| 177. LORICARIA   | <i>Corpus cataphractum.</i>                              |
| 178. SALMO       | <i>Pinna Dorsalis postica adiposa.</i>                   |
| 179. FISTULARIA. | <i>Rostrum cylindricum operculo clausile.</i>            |
| 180. ESOX        | <i>Mandibula inferior longior, punctata.</i>             |
| 181. ELOPS       | <i>Membr. branchiost. duplex: exteriore minore.</i>      |
| 182. ARGENTINA   | <i>Anus caudæ vicinus.</i>                               |
| 183. ATHERINA    | <i>Fascia lateralis longitudinalis argentea.</i>         |
| 184. MUGIL       | <i>Mandibula inferior intus carinata.</i>                |
| 185. MORMYRUS    | <i>Apertura branch. linearis absque operculis.</i>       |
| 186. EXOCOETUS   | <i>Pinnae Pectorales longitudine corporis.</i>           |
| 187. POLYNEMUS.  | <i>Digiti distincti juxta pinnas pectorales.</i>         |
| 188. CLUPEA      | <i>Abdomen carinatum serratum.</i>                       |
| 189. CYPRINUS    | <i>Membrana Branchiostega triradiata.</i>                |

## I. A P O D E S.

*Pinnæ ventrales nullæ.*

143. MURÆNA. *Caput læve. Nares tubulosæ.*  
*Membrana branchiostega radiis X.*  
*Oculi cute communi tecti.*  
*Corpus teretiusculum, lubricum.*  
*Pinna caudæ coadunata dor-*  
*fali anique.*  
*Spiracula pone caput vel pinnas*  
*pectorales.*

- Helena. 1. *M. pinnis pectoralibus nullis.*  
*Art. gen. 55. syn. 41. Gron.*  
*mus. 1. n. 16. Mus. Ad.*  
*Fr. 1. p. 319. Muræna pin-*  
*nis pectoralibus carens.*  
*Seb. mus. 2. t. 69. f. 4, 5.*  
*β. Catesb. car. 2. t. 20, 91. Mu-*  
*ræna maculata nigra, & vi-*  
*ridi.*  
*Habitat in Europæ, Americæ Oceano.*  
*Cenarum Helena, Romæ in piscinis: natat ad magistrum*  
*delicata Muræna, Martial; Ved. Pollio damnata man-*  
*cipia immergebat vivariis Murænarum, ut in visceri-*  
*bus suis aliquid de Servorum suorum corpore gustaret.*  
*Plin. XI. 23. Morsu infesta.*

- Ophis. 2. *M. cauda aptera cuspidata,*  
*corpore tereti.*  
*Art. gen. 24. syn. 41. Mu-*  
*ræna teres gracilis macu-*  
*losa, cauda tereti cuspi-*  
*data apterygia.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

- Serpens. 3. *M. cauda aptera acuta, cor-*  
*pore tereti.*



*Art. gen. 24. syn. 41. Muræna exacte teres, cauda acuta apterygia.*

*D. . . P. 16. V. . . A. . . C. . .*

*Habitat in Occeno Europæ australis.*

**Anguilla.** 4. *M. maxilla inferiore longiore, corpore unicolore. D. 1000 P. 19. V. 0. A. 100. C.*

*Art. spec. 66. gen. 24. syn.*

*39. Fn. svec. 301. Muræna unicolor, maxilla inferiore longiore.*

*Habitat in Europa; maxima in lacu Cornachio Ferrariensi; non fert Danubium, nisi rarissime. Nocturna; latet in cæno duplici foramine; coercetur trunco albo Betulæ; Cutis tenacissima: parit vivipara sub canicula. Act. holm. 1750. p. 194. Hybernatur; nocturne tenebrosa obambulat; Cadaveribus victitat.*

**Myrus.** 5. *M. pinna ambiente alba, margine nigro. Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 58. \**

*Art. gen. 24. syn. 40. Muræna rostro acuto lituris albis vario, margine pinnæ dorsalis nigro.*

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

*Caput antrorsum attenuatum. Tentacula 2 brevia labii superioris.*

**Conger.** 6. *M. rostro tentaculis duobus, lanea laterali ex punctis albida.*

*Art. gen. 24. syn. 40. Muræna supremo margine pinnæ dorsalis nigro.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

**cæca.** 7. *M. apterygia, rostro acutiusculo.*

*Habitat in Mari Mediterraneo. E. Brander.*

*Corpus Anguillæ absque omni pinna. Aperturæ branchiarum sub collo. Maxillæ acuminatæ dentibus acerosis. Nares tubulosæ sub rostro. Oculos nullos video; ad occiput puncta 7 perforata; itidem 7 supra caput in medio, 3 antérieus iterum quater duo-*

*duo. Anus propior capiti quam caudæ. Genus obscurum.*

**144. GYMNOTUS.** *Caput operculis lateralibus. Tentacula duo ad labium superius. Oculi cute communi tecti. Membr. branch. radiis V. Corpus compressum, subtus pinna carinatum.*

**Carapo.** 1. *G. nudus, dorso apterygio, pinna ani longitudine caudæ attenuatæ.*

*Gron. zooph. 168. Gymnotus maxilla superiore longiore, cauda elongata subulata.*

*Seb. mus. 3. t. 32. f. 1-4.*

*Art. gen. 25. syn. 43. Amæn. acad. 1. p. 318. t. 14. f.*

*C. Mus. Ad. Fr. 1. p. 76.*

*Gymnotus.*

*B.5.D.O.P.13.V.O.A.200.C.O.*

*Habitat in America.*

*Abdomen carnosum-carinatum; Pinna ani in caudæ apicem non excurrens, sed desinit ante pinnam caudæ. Apex caudæ absque pinna in filum terminatur.*

**electricus.** 2. *G. nudus, dorso apterygio, pinna caudali obtusissima anali annexa.*

*Gron. zooph. 169. t. 8. f. 1.*

*Gymnotus cauda truncata, maxilla inferiore longiore.*

*Act. helv. 4. p. 27. t. 3. f.*

*1, 2, 3.*

*Vitgez. verhand. 3. p. 468.*

*t. 26. f. 8.*

*Act. harlem. 2. p. 372. Sid-dervis.*



*Muschenb. intr. 1. p. 290.*

*Gymnotus.*

*Seb. mus. 3. p. 108. t. 34.*

*f. 6. Gymnotus nigricans,*  
*cauda curta obtusa.*

*Gumill. orenogu 3. p. 136.*

*Torpille.*

*Habitat in Surinamo aliisque Americæ meridionalis ostiis*  
*fluviorum.*

*Qualitas Torpedinis trementis, unde tangenti crepitant*  
*membra dolore, qualis a cubiti contusione, ut sæpe*  
*prosternatur, potissimum a pisce majore, & cujus vis*  
*non ab iterato tactu & percussione nuper fuit debili-*  
*tata. Percussio sentitur dolorifica tactu baculi, licet*  
*manubrio metallico, maxime aureo; etiam in scapha*  
*constituto, digito aquæ immisso per 15 pedes sentitur*  
*tremor; non vero tactu ceræ sigillatoriæ. Vis appro-*  
*priata morbis soporosis; metuenda natantibus, inde*  
*submergendis. Vide Gronovium. Caput punctis per-*  
*foratis adpersum.*

*albifrons. 3. G. dorso anteriore niveo. D. o. P. 15. V. o. A. 152. C. 24.*

*Habitat Surinami.*

*Statura G. Carapo. Aperturæ branchiarum ovatæ, an-*  
*te pin. pectoralium basin. Corpus cultratum plaga*  
*nivea a naribus ad medium dorsum. P. ani a gula*  
*fere ad caudæ pinnam. Cauda supra canaliculata;*  
*P. Caudalis rotundata. Caput compressum, longius*  
*hians. Oculi cute communi tecti. Nares 2 parium,*  
*tubulosæ.*

*rostratus. 4. G. rostro subulato, pinna*  
*ani cauda brevior.*

*D. -- P. 19. V. -- A. 296. C. --*

*Seb. mus. 3. p. 99. t. 32. f.*

*5. Gymnotus varius ro-*  
*stro productiore.*

*Gron. zooph. 167. mus. 73.*

*Gymnotus maxillis elon-*  
*gatis tubulosis subconnat-*  
*is, corpore maculoso,*  
*cauda subacuta.*

*Habitat in America.*

*asiaticus. 5. G. squamosus, dorso pin-*  
*nato.*

*D. 46 P. 14. V. o A. 28. C. 16.*

*Habi-*

*Habitat in Asia; dubii Generis, an Anarhichæ?*

Piscis plus quam spithameus, crassiusculus, sed tectus squamis levibus, rotundatis, distinctis, etiam supra caput, cui puncta 5 excavata, uti etiam aliquot in maxillis inferioribus. Anus in medio corporis. Linea lateralis elevata, recta, sed descendens supra anum. Color obscurus fasciis fuscis. Puncta alba in pinna dorsali & postica parte corporis. Ob opercula lateraliter ampla aperienda & ob squamas nequit esse Muræna; pinna dorsalis incipit pone caput & extenditur fere ad caudam. Caput depressum, leviusculum. Tentacula 2 truncata, ante nares postica. Membr. branch. 5. Corpus subcylindricum, postce compressum. Pinna dorsi mox post nucham incipiens. Foraminulum in fronte. Lingua lævis. Dentes acerosi in maxillis & insuper in maxilla superiore ordo dentium intra maxillam.

145. TRICHIURUS. Caput porrectum, operculis lateralibus.

Dentes ensiformes apice semisagittati: primores majores.

Membr. branch. radiis VII.

Corpus compresso-ensiforme.

Cauda subulata, aptera.

Lepturus. 1. TRICHIURUS.

Art. spec. III. Lepturus B. 7. D. 100. P. 11. V. 0. A. 105 C. 0.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 76. t. 26.

f. 2. Lepturus. B. 7. D. 124. P. 12. V. 0. A. 0. C. 0.

Gron. mus. 1. n. 47. Gymno-

gaster. B. 7. D. 138. P. 11. V. 0. A. 0. C. 0.

Brown. jam. 444. t. 45. f. 4.

Gymnogaster argenteus

compressus, cauda atte-

nuata impinna.

B. 7. D. . . P. 11. V. 0. A. 0. C. 0.

Seb. mus. 3 t. 33. f. 1. En-

chelyopus.

Will. app. t. 3. f. 3. Anguil-

la indica,



## PISCES. APODES. Anarhichas.

*Marcgr. bras. 161. Mucu.*

*Habitat in Amnerca, China. Exiliens ex aquis sæpe in Cymbam.*

*Totus argenteus, Pinna dorsalis plicatilis.*

146. ANARHICHAS. *Caput obtusiusculum.*

*Dentes primores supra infraque conici, divergentes, sex pluresve.*

*molares inferiores palatique rotundati.*

*Membr. branch. rad. VI.*

*Corpus teretiusculum. Pinna caudæ distincta.*

Lupus. I. ANARHICAS. *Art. gen.*

23. *syn.* 38.

*Gron. mus. 1. n. 44. Anarhicas.*

*D. 73. P. 20. V. 0. A. 45. C. 18.*

*Olear. mus. 53. t. 27. f. 2.*

*Habitat in Oceano septentrionali Angliæ, Balthico.*

*Lapis Bufonites ex hujus piscis dente. Merret.*

147. AMMODYTES. *Caput compressum, corpore angustius. Labium superius duplicatum. Mandibula inferior angusta acuminata. Dentes acerofi.*

*Memb. branch. rad. VII.*

*Corpus teretiusculum squamis vix conspicuis. Cauda distincta.*

Tobianus. I. AMMODYTES. *Art. gen.*

16. *syn.* 29. *spec.* 35. *B. 7. D. 54. P. 12. V. 0. A. 28. C. 15.*

*Gron.*

Gron. zooph. 404. Ammodytes.

B.7.D.57.P.9.V.0.A.26.C.16.

Raj. pisc. 38. t. 2. f. 12.

Faun. svec. 302. Ammodytes.

B.7.D.54.P.13.V.0.A.28.C.15.

It. scan. 141. Ammodytes.

B.5.D.50.P.12.V.0.A.26.C.15.

It. æl. 87. Ammodytes.

B.7.D.60.P.15.V.0.A.32.C.14.

Mus. Ad. Fr. 1. p.75. Ammodytes.

B.7.D.60.P.14.V.0.A.30.C.16.

*Habitat in Europæ Oceano arenoso scaturiginoso, in gyrum contractus, e centro apice capitis arenam penetrat; allicitur nivea albedine. Prædatur a Scombris.*

*Color dorso lateribusque cyaneus; subtus varius lineis 6, alternis albis & cyaneis. Ad ani regionem macula parva subrubra. Linea lateralis duplex.*

*Species mihi videntur in Svecia duæ esse distinctæ, uti Rajus quondam in Anglia subolfecit.*

**148. OPHIDIUM.** *Caput nudiusculum. Dentes maxillis, palato faucibus. Membr. branch. radiis VII, patula. Corpus ensiforme.*

barbatum.

1. O. maxilla inferiore, cirris quatuor.

D. 133.P.0.V.0.A. 112.C. --

*Art. gen. 25. syn. 42.*

*Habitat in Europa australi.*

*Corpus cinereo-argenteum. Linea lateralis fusca; undique maculæ lineares, sparsæ. P. dorsalis analisque caudali connatæ, nigro-marginatæ.*

imberbe. 2. O. maxillis imberbibus, cauda obtusiuscula.

*Art. gen. 24. syn. 42. Ophidion cirris carens.*

*Fn. svec. 319. Idem.*

D. 79.P.11.V.0.A. 41.C. 18.

*Gron. zooph. 401. Ophidion. D. 147.P. 26.V. 0 A. 101.C. --*

*Habitat in Europa.*

*Pinna dorsalis analisque caudali unitæ.*

**149. STRO-**



149. STROMATEUS. *Caput* compressum. *Dentes* in maxillis, palato.  
*Membr. branch.* ---  
*Corpus* ovatum, lubricum;  
*Cauda* bifida.

Fiatola. 1. *S. subfasciatus*.

*Art. gen.* 19. *syn.* 33. Stromateus.

*D.* 46. *P.* 25. *V. o.* A. 34. C. ---

*Habitat* in Mari Mediterraneo, & Mari Rubro.

*Piscis pulchre variegatus; ventriculi duo.*

Paru. 2. *S. unicolor*.

*Sloan. jam.* 2. p. 281. t. 250.

f. 4. Paru brasiliensi congener. *Raj. pisc.* 51.

*Habitat* in America.

150. XIPHIAS. *Caput* maxilla superiore terminatum rostro ensiformi; *Os* edentulum.

*Membr. branch.* radiis VIII.

*Corpus*, teretiusculum, alepidotum.

Gladius. 1. XIPHIAS. *Art. gen.* 30.

*syn.* 47. *Fn. svec.* 303. *D.* 41. *P.* 17. *V. o.* A. 15. C. ---  
*Kælpin. mss.* B. 7. *D.* 18, 3. *P.* 17. *V. o.* A. 10, 3. C. 20.

*Habitat* in Oceano Europæ.

*Schelhameri Anatome Xiphii piscis.* Hamb. 1707. quart.  
 & *Barthol. cent.* 2. cap. 16.

## II. JUGULARES.

*Pinnæ ventrales pectoralibus anteriores.*

151. CALLIONYMUS. Caput labio superiore duplicato ; Oculi approximati.

*Membr. branch. radiis VI. (Gron). Apertura nuchæ foraminibus respirante. Opercula clausa.*

*Corpus nudum. Pinnæ ventrales remotissimæ.*

Lyra.

1. C. dorsalis prioris radiis longitudine corporis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 71. Uranoscopus.*

D. 4, 10. P. 18. V. 6. A. 10. C. 10.

*Fn. svec. 304. Trachinus maxilla superiore longiore, pinna dorsi priore altissima.*

*Ström. sondm.*

B. 6. D. 5, 10. P. 19. V. 5. A. C. 10.

*Gron. mus. 1. n. 64. Uranoscopus officulo primo pinnæ dorsalis longitudine corporis.*

D. 4, 10. P. 19. V. 5. A. 10. C. 10.

*Gron. act. upf. 1740. p. 121.*

*t. 8. Cottus officulis pinnæ dorsalis longitudine corporis.*

D. 4, 10. P. 19. V. 5. A. 10. C. 10

*Act. angl. 293. p. 1749. Gurnardus luteus.*

*Pet. gaz. t. 22. f. 2. Lyra harvicensis.*

*Seb. mus. 3. t. 20. f. 17. Exocoetus 3.*

*Habitat in Mari Atlantico.*

*Corpus lineis cæruleis, imprimis p. dorsalis caudalisque. Pinnæ Dorsalis prioris radius 1 longitudine*

E e

cor-



*corporis. Cirrus ad anum. Capitis latera postice spina quintuplici. Labium superius singulare.*

Dracunculus.

2. *C. dorsalis prioris radiis corpore brevioribus.*

*Gron. mus. 1. n. 63. Uranoscopus officulo primo pinnae dorsalis primae unciali.*

*D. 4, 9. P. 20. V. 5. A. 9. C. 102.*

*Aët. helv. 4. p. 260. n. 125.*

*Art. gen. 49. syn. 77. Cottus.*

*pinna secunda dorfi alba. D. 4, 10. P. 12. V. 6. A. 9. C. 122.*

*Habitat Genuæ, Romæ, Ulyssipone.*

*Capitis latera spina triplici. Corpus luteo-maculatum.*

indicus.

3. *C. capite lævi longitudinaliter rugoso, operculis latere aperiendis.*

*B. 7. D. 7, 13. P. 20. V. 1. A. 13. C. 111.*

*Habitat in Asia. Mus. ac. holmens.*

*Caput depressum, supra longitudinaliter rugosum. Maxilla inferior paulo longior. Os scabrum. Lingua obtusa, emarginata. Aperturæ branchiarum magnæ laterales. Opercula anteriora spina gemina; postice spina solitaria. Corpus valde depressum, lividum. Anus in medio. Radius primus P. dorsalis prioris brevissimus, remotus. P. ventrales valde distantes.*

*Piscis medius quasi inter Callionymum, Uranoscopus & Trachinum.*

152. URANOSCOPUS. *Caput depressum, scabrum majus. Os firmum: maxilla superiore brevior. Membr. branch. rad. V, papilloso-dentata. Opercula membranaceo-ciliata. Corpus: anus in medio.*

scaber.

1. URANOSCOPUS. *Mus.*

*Ad. Fr. 2. p. 59. \* D. 4, 14. P. 16. V. 5. A. 13. C. 112.*

*Art. gen. 42. syn. 71. Trachinus cirris multis in maxilla inferiore.*

*D. 3, 14. P. 16. V. 5. A. 13. C. 112.*

*Ha-*

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Caput osseo-verrucosum, antice lacuna excavatum. O-  
ris labium ciliatum. Denticuli minuti maxillarum,  
palati, linguae. Foramina 2 in ore, sub labio supe-  
riore. Branchiae arcu osseo, adeo ad Nantes non  
spectat. Spinæ 2 recumbentes sub gula. Linea la-  
teralis adscendens, dorso parallela. Pinna dorsi prior  
nigra.

153. TRACHINUS. Caput minus læve, compressum.  
Memb. branch. rad. VI; oper-  
culorum lamina inferiore  
ferrata.

Corpus: anus prope pectus.

Draco. I. TRACHINUS. *It. scan.* 325.

*Fn. svec.* 305.

*Art. gen.* 42. *syn.* 70. Tra-  
chinus maxilla inferiore

longiore, cirris destituta. D. 5, 31. P. 16. V. 6. A. 32. C. 12.

*Gron. mus.* 1. n. 97. Idem  
nomen.

D. 6, 30. P. 15. V. 6. A. 34. C. --

*Gron. act. upf.* 1742. p. 95.

Idem nomen.

D. 6, 30. P. 16. V. 6. A. 30. C. 12.

*Habitat in Oceano septentrionali.*

Spinæ P. dorsalis prioris pungunt venenatissimæ. Barth.  
*act.* 3. obs. 84. Pinna dorsalis Analisque multum ferratæ.

154. GADUS. Caput læve.

Membr. branch. rad. VII, teretibus.

Corpus oblongum squamis deciduis.

Pinnæ omnes cute communi ve-  
stitæ: dorsales anique plures: ra-  
diis muticis. Pectorales in acu-  
men attenuatæ.

\* Pinnis dorsalibus tribus, ore cirroso.

Æglefi- I. G. tripterygius cirratus al-  
nus bicans, cauda biloba, ma-



xilla superiore longiore.

*Fn. svec.* 306.

*Art. gen.* 20. *syn.* 36. *spec.*

64. Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante, maxilla superiore longiore, cauda parum bifurca.

*Gron. mus.* 1. n. 59. Idem nomen. *Schelvis Belg.*

*It. scan.* 325. Gadus Kolja.

D.15,20,19.P.18.V.6.A.24,21.C.

*It. wgoth.* 178. Gadus dorso tripterygio, ore papilloso.

D.16,18,20.P.17.V.6.A.22,21.C.23

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Macula fusca in latere sinistro.*

*Linea lateralis atra; cirrus sub mento.*

Callarias. 2. *G. tripterygius cirratus* varius, cauda integra, maxilla superiore longiore.

*Fn. svec.* 307.\* D.15,19,19.P.20.V.6.A.18,18.C.23.

*Art. gen.* 16. *syn.* 35. *spec.*

63. Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda æquali.

D.15,19,18.P.20.V.6.A.19,17.C...

*Gron. mus.* 1. n. 58. Idem.

D.15,19,18.P.10.V.6.A.16,16.C.--

*It. æl.* 87. Gadus balthicus

Torsk.

D.14,19,17.P.17.V.6.A.20,16.C.--

*It. scan.* 220. Gadus Calla-

rias balthicus. D.15,19,17.P.18.V.6.A.17,16.C.24.

*Habitat in Oceano Europæo & balthico.*

Morhua. 3. *G. tripterygius* cirratus, cauda subæquali, radio primo anali spinoso. *Fn.*

*svec.* 308.

D.14,18,19.P.19.V.6.A.17,15.C.44.

*Art. syn.* 35. Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, cauda æquali fere cum radio primo spinoso.

*It. wgoth.* 176. Gadus Kab-  
beljä.

D. 15, 20, 16. P. 20. V. 6. A. 21, 16. C. --

*Ström. sondm.* 317. Cabliau.

D. 14, 19, 18. P. 17. V. 6. A. 22, 16. C. 36.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Ova quotannis 9344000 ponit. Leuwenh.*

*Pinna analis prior maculata.*

cus.

4. G. tripterygius cirratus, radio ventralium primo setaceo. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 60. \*

D. 13, 23, 18. P. 11. V. 6. A. 31, 18. C. 17.

*Art. gen.* 21. *syn.* 35. Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, officulo pinnarum ventralium primo in setam longam producto.

*Habitat in Oceano Europæo.*

5. G. tripterygius cirratus, maxilla inferiore punctis utrinque septem. *Fn. svec.* 311.

*Art. gen.* 21. *syn.* 37. *spec.*

65. Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitudinem tripla, pinna ani prima officulorum 30.

D. 13, 24, 21. P. 19. V. 6. A. 30, 21. C. --

*Art syn.* 111. Phycis (secundum D. Kehlerum).

D. 12, 18, 14. P. 14. V. 5. A. 25, 16. C. 30.

*It. wgoth.* 177. Gadus Torfk.

D. 12, 20, 20. P. 18. V. 6. A. 19, 19. C. 40.

*It. wgoth.* 178. Gadus linea excavata pone caput.

D. 13, 17, 19. P. 18. V. 6. A. 18, 17. C. --

*Ström. sondm.* 316. n. β.

D. 13, 19, 16. P. 18. V. 6. A. 19, 15. C. --

*Habitat in Oceano Europæo.*

Fico Romanis hodie, cirro in mento, puncta maxillæ inferioris utrinque 7; macula fuscæ ad pin. pectorales.

D. Kehler. Fossula inter caput & P. dorsalem. *Ström.*

Cirrus 1 maxillæ inferioris.



minutus. 6. *G. tripterygius cirratus*,  
ano in medio corporis.

*Art. gen. 21. syn. 36. Gadus*  
dorso tripterygio, ore  
cirrato, corpore sesqui-  
unciali, ano in medio  
corporis.

D.12,19,17.P.13.V.6.A.27.17.C

*Habitat in M. mediterraneo.*

\* \* *Pinnis dorsalibus tribus, ore imberbi.*

virens. 7. *G. tripterygius imberbi*,  
dorso virescente, cauda  
bifurca. *Fn. svec. 309. \**

D.13,20,19.P.17.V.6.A.24,20.C

*Gron. act. upf. 1742. p. 90.*

*Idem.*

D.13,20,19.P.17.V.6.A.24,20.C

*Habitat in Oceano Europæo in Norvegia copiose.*

*Similis G. Pollachio, sed maxillæ æquales, linea laterali*  
*non curvata, Caula bifida. Strom. sond. 294.*

Merlan- 8. *G. tripterygius imberbis al-*  
gus. bus, maxilla superiore  
longiore. *Fn. svec. 310.*

*Art. gen. 19. syn. 34. spec.*

62. *Gadus* dorso tripte-  
rygio, ore imberbi, cor-  
pore albo, maxilla supe-  
riore longiore.

D.14,21,20.P.21.V.6.A.33.23.C

*Gron. mus. 1. n. 55. Mole-*  
*naar. Belg.*

D.14,23,18.P.16.V.4.A.28,19.C

*It. scan. 326. t. 2. f. 2. Ga-*  
*dus Hvitling.*

D.14,18,10.P.20.V.6.A.30.20.C

*It. wgoth. 176. Gadus Hvit-*  
*ling.*

D.14,20,20.P.17.V.6.A.30,22.C

*Habitat in Oceano Europæo. Molenaar. f. W.*  
*Belgis.*

Carbona- 9. *G. tripterygius imberbis*,  
rius. maxilla inferiore longio-  
re, linea laterali recta.

*Art. gen. 20. syn. 34. Gadus*  
dorso tripterygio imberbi,  
maxilla inferiore longiore  
linea laterali recta.

D.14,20,22.P.18.V.6.A.22,11.C

*Habitat in Oceano Europæo.*

Polla-  
chius.10. *G. tripterygius imberbis*,  
maxilla inferiore longiore,  
linea laterali curva. *Faun.*  
*svec.* 312.*Art. gen.* 20. *syn.* 35. *Ga-*  
*dus* dorso tripterygio im-  
berbi, maxilla inferiore  
longiore, linea laterali  
curva.

D.11,19,16.P.17.V.6.A.16,18.C.--

*Gron. mus.* 1. n. 57. Idem.

D.13,17,23.P.17.V.6.A.24,23.C.--

*It. wgot.* 177. *Gadus* Lyr-  
blek,

D.13,19,18.P.16.V.6.A.27,18.C.--

*Habitat in Oceano Europæo.**Cauda lunata & fere integra.*\* \* \* *Pinnis dorsalibus duabus.*Merluc-  
cious.11. *G. dipterygius imberbis*,  
maxilla inferiore longiore,  
*Mus. Ad. Fr.* 2. p. 60. \**Faun. svec.* 314. \*

D.10,39.P.12.V.7.A.38.C.22.

*Art. gen.* 22. *syn.* 36. *Ga-*  
*dus* dorso dipterygio, ma-

xilla inferiore longiore. D.9,40.P.12.V.7.A.39.C.--

*Strom. sondm.* 295. *Lyfing.*

D.9,39.P.13.V.7.A.39.A.24.

*Habitat in Oceano.**Cirrus nullus Gron. similis Pollachio.*

Molva.

12. *G. dipterygius cirratus*,  
maxilla superiore longio-  
te. *Faun. svec.* 313.*Art. gen.* 22. *syn.* 36. *Ga-*  
*dus* dorso dipterygio, ore  
cirrato, maxilla superiore  
longiore.

D.15,65.P.15.V.6.A.62.C.--

*It. wgoth.* 177. *Gadus* lon-  
ga.

D.15,63.P.20.V.6.A.60.C.49.

*Habitat in Oceano Europæo.**Cauda rotundata, Pinnæ superiores nigricantes, mar-*  
*gine albido.*

Tau.

13. *G. dipterygius cirratus*,  
operculis triacanthis, pin-



na dorsali priore triradi-  
ata.

B.6.D.3,26.P.20.V.7.A.22.C.16.

*Habitat in Carolina. D. Garden. Toadfish.*

Caput magnum, inaequale, vertice T. notato. Oculorum iris aureus. Operculum inferius spina triacantha terminatum. Dentes plurimi, majores. Maxilla inferior longior subtus aliquot appendiculis. Corpus mucosum, fusco flavescent, maculis liturisque nigris. P. ventrales sunt jugulares: radio anteriore longissimo, longitudinaliter aucto membrana rugosa. Cauda rotundata.

Lota. 14. *G. dipterygius cirratus*,  
maxillis æqualibus. *Faun.*  
*svec.* 315.

*Art. gen.* 22. *syn.* 38. *Gadus* dorso dipterygio, ore cirrato, maxillis æqualibus.

D.13,76.P.21.V.7.A.55.C.--

*Art. spec.* 107. *Silurus* cirro in mento unico.

D.13,76.P.21.V.7.A.55.C.30.

*Habitat in lacubus Europæis, parit decembri.*

*Corpus e livido nigroque variegatum.*

Mustela. 15. *G. dipterygius cirratus*,  
cirris 5, pinna dorsali priore exoleta.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 75. *Gadus* dorso dipterygio, cirris maxillæ superioris 4, inferioris 1.

D.1,42.P.14.V.7.A.40.C.--

*Art. gen.* 22. *syn.* 37. *Gadus* dorso dipterygio, sulco ad pinnam dorsi primam ore cirrato.

D.1,56.P.-- V.7.A.47.C.--

*Gron. act. upf.* 1742. p. 93.

t. 3. Idem.

B.7.D.1,48.P.16.V.7.A.43.C.25.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Cirri labii superioris 4, inferioris 1.*

cimbrius. 16. *G. dipterygius cirratus*,  
cirris 4, pinna dorsali priore exoleta: radio primo hastato.

B.7.D.1,48.P.16.V.7.A.42.C.25.

*Habitat in O. Atlantico: Scanico. D. Struvsenfelt.*

Cirri

Cirri nasales 2; labii superioris 1; inferioris 1. Pinna dorsalis anterior exoleta: radio primo subulato majore apice brachiato forma T litteræ, quo imprimis a *Mustela* differt.

\* \* \* \* Pinna dorsali unica.

mediter-  
raneus.

17. *G. monopterygius* cirratus, maxilla superiore cirris duobus, inferiore unico. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 60. \*

D.54.P.15.V.2.A.44.C.--

*Habitat in Oceano Europæo.*

155. BLENNIUS. Caput declive, tectum.

*Membr. branch.* rad. VI.

*Corpus* lanceolatum. *Pinnæ* ventrales didactylæ, muticæ. Pinna ani distincta.

\* *Caput cristatum.*

Galerita. 1. *B.* crista capitis transversa cutacea. *Art. gen.* 27. *syn.* 44.

*Ström. sondm.* 322.

D.58.P.10.V.2.A.36.C.16.

*Habitat in Oceano Europæo.*

cristatus. 2. *B.* crista setacea longitudinali inter oculos. *Gron. mus.* 1. n. 75.

B.5.D.26.P.14.V.3.A.16.C.11.

*Raj. pisc.* 73. *Pinaru.*

*Habitat in Indiis.*

ornatus. 3. *B.* radio simplici supra oculos, pinna dorsali solitaria. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 61. \*

D.33.P.15.V.2.A.23.C.12.

*Amæn. acad.* 1. p. 316. *Blennius* pinnis ocularibus subulatis, pinna ani ossiculorum XXVI.

D.34.P.15.V.2.A.25.C.11.

*Habitat in India*



PISCES. JUGULARES. Blennius.

ocellaris. 4. B. radio simplici supra oculos, pinna dorsali anteriore oculo ornata. *Mus.*

*Ad. Fr. 2. p. 62. \**

D. 11, 15. P. 12. V. 2. A. 16. C. 11

*Art. gen. 26. syn. 44.* Blennius fulco inter oculos, macula magna in pinna dorsali.

D. -- P. 12. V. 2. A. 17. C. 266

*Habitat in Europa.*

Gattorugine. 5. B. pinnulis superciliarum nuchæque palmatis. *Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 61. \**

D. 30. P. 13. V. 2. A. 21. C. 15

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 68.* Blennius vertice superciliisque ciliato.

D.  $\frac{1}{3}$   $\frac{8}{0}$ . P. 14. V. 2. A. 20. C. 15

*Art. gen. 25. syn. 44.* Blennius pinnulis 2 ad oculos, pinna ani officulorum XXIII.

D.  $\frac{1}{3}$   $\frac{2}{1}$ . P. 14. V. 2. A. 23. C. 11

*Habitat in Europa.*

superciliolus. 6. B. pinnulis superciliarum palmatis, linea laterali curva.

*Amæn. acad. 1. p. 317.* Blennius pinnulis ocularibus brevissimis palmatis, linea laterali curva.

D.  $\frac{3}{4}$   $\frac{4}{0}$ . P. 12. V. 2. A. 26. C. 11

*Gron. mus. 2. n. 172. t. 5.*

*f. 5.* Blennius officulis anterioribus pinnae dorsalis majoribus.

D.  $\frac{3}{4}$   $\frac{6}{4}$ . P. 15. V. 2. A. 28. C. 11

*Habitat in India.*

Phycis. 7. B. naribus subcristatis, cirro labii inferioris, dorso bipenni. *Gouan.*

D. 10, 61. P. 15. V. 2. A. 57. C. 21

*Art. gen. 84. syn. III.*

Phycis.

D. 10, 62. P. 12. V. 2. A. 56. C. 11

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Membran. Branch. radiis 7. Narium anteriora foramina tentaculo lineari. Anus annulo nigro cinctus. Cauda rotundata.

\* \* *Caput absque cristis.*

- Pholis. 8. B. capite lævi, linea laterali curva subifida. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 62. \** D.  $\frac{12}{8}$ . P. 14. V. 2. A. 19. C. 10.  
*Art. gen. 27. syn. 45. (Pholis) 116.* Blennius capite summo acuminato, maxilla superiore longiore. D. 36. P. -- V. 2. A. 28. C. --  
*Gron. mus. 2. n. 175. Idem.* B. 6. D.  $\frac{12}{31}$ . P. 13. V. 2. A. 19. C. 10.  
*Habitat in Oceano & Mari Mediterraneo.*  
*Cirri setacei breves nares ambiunt. Gronov.*
- Gunnel- 9. B. pinna dorsali ocellis X  
lus. nigris. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 69. Fn. svec. 318.* D. 77. P. 10. V. 2. A. 43. C. 16.  
*Art. gen. 27. syn. 45.* Blennius maculis circiter X nigris limbo albo, utrinque ad pinnam dorsalem. D. 78. P. 11. V. 2. A.  $\frac{2}{40}$ . C. --  
*Seb. mus. 3. t. 30. f. 6.*  
*Habitat in Oceano Atlantico.*
- mustela- 10. B. pinna dorsali anteriore  
ris. triradiata. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 69.* D. 3, 43. P. 17. V. 2. A. 29. C. 13.  
*B. B. pinna dorfi anteriore radiis 3, posteriore 40. Mus. Ad. Fr. 1. p. 69.* D. 3, 40. P. 16. V. 2. A. 28. C. 12.  
*Habitat in India.*
- viviparus. 11. B. ore tentaculis duobus.  
*Fn. svec. 317.*  
*Art. syn. 45.* Blennius capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris, pinna ani flava.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 69. Idem.* B. 6. D. 80. P. 19. V. 2. A. 66. C. --  
*Gron. mus. 1. p. 65. Idem.* D. -- P. 19. V. 2. A. -- C. --  
*Gron. mus. upf. 1742. p. 87. Idem.* D. -- P. 19. V. 2. A. -- C. --  
*Act. stockh. 1748. p. 32. t. 2. Tânglake.* D. 79. P. 20. V. 2. A. 70. C. --  
*Habi-*



## PISCES. JUGULARES. Blennius.

*Habitat in M. Europæo.*

*Vivos parit fœtus, quod singulare in piscibus.*

Lumpe- 12. B. corpore areolis dorfa-  
nus. libus fuscis.

*Art. syn. 45. Blennius cir-  
ris sub gula pinniformi-  
bus quasi bifidis, areolis  
dorsi transversis.*

*Habitat in Europa.*

raninus. 13. B. pinnis ventralibus sub-  
sexfidis, cirrogulari. *Fn.*

*svec. 316.*

*B.7.D.66.P.22.V. $\frac{2}{8}$ .A.60.C.30.*

*Habitat in Sveciæ lacubus; ubi hic, ibi alii pisces rece-  
dunt; nec piscis ipse esculentus.*

*Cum radii pinnarum ventralium quidem 6, sed 2 primo-  
res in utraque setacei sint, & tanquam veri habendi,  
poterit forte piscis ad hoc genus referri ob habitum cum  
duobus præcedentibus.*

## III. THORACICI.

*Pinnae ventrales sub ipso Thorace sitae.*

156. CEPOLA. *Caput subrotundum, compressum. Os fimum. Dentes curvati, simplici ordine.*

*Membr. branch. radiis VI.*

*Corpus ensiforme, nudum, abdomine vix capitis longitudine.*

Tænia. 1. C. pinna caudæ attenuata, capite obtusissimo.

D.60.P.18.V. $\frac{1}{2}$ .A.58.C.9.

*Art. gen. 83. syn. 114. Tænia auctorum.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Corpus nudum, compressum. Caput obtusissimum, rotundatum, compressum. P. dorsalis incipit prope caput, desinit mox ante P. caudæ. Abdomen vix capitis longitudine, ubi pinna ani incipit, desinit ante P. caudæ. P. caudæ. attenuata, ut radii intermedii longiores sint.*

rubescens. 2. C. pinna caudæ attenuata, maxillis acutis. *Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 63. \**

B.6.D.68.P.17.V.6.A.58.C.12.

*Art. syn. 115. Tænia Serpens rubescens dicta.*

*Syst. nat. 10. p. 259. Ophidion macrophthalmum.*

D.69.P.15.V.6.A.62.C.12.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*



157. ECHENEIS. *Caput* pingue, nudum, depres-  
sum: supra planum, margina-  
tum, transverse sulcato - fer-  
ratum.

*Membr. branch. radiis* X.

*Corpus* nudum.

Remora. 1. E. cauda bifurca, striis ca-  
pitis 18.

*Amæn. acad.* 1. p. 320. E-  
cheneis.

D.22.P.28.V.5.A.22.C.16.

*Art. gen.* 15. *syn.* 28. Eche-  
neis.

*Gron. mus.* 1. n. 33. Eche-  
neis.

D.22.P.25.V.6.A.22.C.17.

*Habitat in* Pelago Indico.

*Capitis clypeo adheret aliis.*

Neucra- 2. E. cauda integra, striis ca-  
tes. pitis 24.

D.37.P.21.V.5.A.37.C.16.

*Valisn. nat.* 1. t. 44.

*Hasselq. itin.* 324. n. 68.

Echeneis Naucrates.

*Seb. mus.* 3. p. 103. t. 33.

f. 2. Echeneis in extremo  
subrotunda.

*Catesb. car.* 2. t. 26. Re-  
mora.

*Habitat in* Pelago indico.

*Differt a præcedenti cauda longiore, corpore majore, pin-  
nis acutioribus.*

158. CORYPHÆNA. *Caput* maxime truncato-de-  
clive.

*Membr. branch. radiis* V.

*Corpus:* Pinna dorsalis lon-  
gitudine dorsi.

Hippu- 1. C. cauda bifida, radiis dor-  
rus. salibus LX. *Læst. epist.*

D.60.P.21.V.6.A.26.C.188

*Osbeck itin.* 307. B.10.D.60.P.19.V.6.A.27.C.20.  
*Art. gen.* 15. *syn.* 28. Coryphæna cauda bifurca. D.--P.20.V.6.A.--C.18.  
*Habitat in Pelago*; *Nautis Dorado dictus a colore splendidiſſimo.*

*Equiselis.* 2. C. cauda bifurca, radiis dorsalis LIII.

*Osbeck iter.* 308. Dorado. B.6.D.53.P.19.V.6.A.23.C.20.  
*Marcgr. bras.* 160. Guara-capema.

*Habitat in alto Pelago.*

*Pulcherrimus, a priori parum distinctus.*

pentadactyla. 3. C. maculis nigris quinque versus caput longitudinalibus.

*Art. stockh.* 1740. p. 460. t.

3. f. 2. Blennius maculis

5 utrinque versus caput

nigris.

B.4.D. $\frac{5}{2}$ .P.11.V. $\frac{1}{8}$ .A. $\frac{3}{4}$ .C.18.

*Valent. amb.* 5. p. 435. t.

292. Rievier Doltyn.

*Will. icht. app.* 7. t. 8. f. 2.

*Raj. pisc.* 150. n. 23.

*Habitat in India.*

Novacula. 4. C. capite pinnisque cancellatis lineis cæruleſcentibus.

*Art. gen.* 15. *syn.* 29. Coryphæna palmaris pulchre

varia, dorso acuto.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Pompi- 5. C. dorso supra lineam lateralem curvam fasciis

flavescentibus picto. B.5.D. $\frac{5}{3}$ .P.14.V.6.A. $\frac{2}{4}$ .C.16.

*Art. gen.* 16. *syn.* 29. Coryphæna cauda æquali, li-

nea laterali curva.

*Habitat in Pelago.*

Corpus pingue, postice attenuatum. Lineolæ dorsi laterales curvæ, flavescentes. Linea lateralis curva, flavescent. Caput obtusum. Maxilla inferior ad-

scen-



*scendens. Os valde dehiscens, maxillis latere coheren-*  
*tibus, intus scabrum. Capitis latera cavernosa den-*  
*tata. Pinna dorsalis prior unita posteriori. Pinnæ pe-*  
*ctorales admodum acuminatæ.*

**Psittacus. 6.** C. linea laterali intercepta,  
 pinnis longitudinalibus co-  
 lore lineatis. D.  $\frac{2}{9}$ . P. 11. V. 6. A. 16. C. 14.

*Habitat in Carolina, pulchre coloratus, at colores cum*  
*vita disparent. D. Garden. Parrotfisch.*

*Caput gloria piscis, varie coloratum. Oculi iride ru-*  
*bro-flammeo, cincto cæruleo. Macula medii corpo-*  
*ris versus dorsum rhombeo-purpurea, flammeo viri-*  
*di luteo, cæruleo varia. Linea lateralis longitudine*  
*pinne dorsalis, abrupta, inferius continuata incipit.*  
*P. dorsalis linearis, a capite fere ad caudam. Ana-*  
*lis dorsali opposita similisque, sed incepta in medio pi-*  
*scis, ubi anus. Cauda integra.*

**acuta. 7.** C. cauda acuminata, linea  
 laterali convexa. D. 45. P. 16. V. 6. A. 9. C. 16.  
*Habitat in Oceano Asiatico.*

**fina. 8.** C. cauda integra, labio in-  
 feriore longiore. D. 32. P. 16. V. 6. A. 16. C. 16.  
*Habitat in Oceano Asiatico.*

**virens. 9.** C. pinnis appendiculis fili-  
 formibus. D. 26. P. 13. V. 6. A. 13. C. 16.  
*Habitat in Oceano Asiatico.*  
*Pinna dorsalis Analisque terminatur appendice filiformi*  
*elongato. P. ventralium radius 2 terminatur filo.*

**hemipte- 10.** C. maxillis subæqualibus,  
 ra. pinna dorsali brevi. D. 14. P. 15. V. 8. A. 10. C. 18.  
*Habitat in Oceano Asiatico.*

**branchio- 11.** C. apertura branchiarum  
 stega. rima transversa. D. 24. P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{10}$ . C. 16.  
*Habitat in Oceano Asiatico.*

**clypeata. 12.** C. lamina ossea inter ocu-  
 los. D. 32. P. 14. V. 5. A. 12. C. 7.  
*Habitat in Oceano Asiatico.*

159. GOBIUS. *Caput* poris 2 inter oculos approxi-  
matus : altero anteriore.

*Membr. branch. radiis* IV.

*Pinnæ ventrales unitæ in ovatam.*

niger.

1. G. pinna dorsali secunda ra-  
diis quatuordecim. *Mus.*

*Ad. Fr. 2. p. 64. \** D.6,14.P.18.V.10.A.11.C.14.

*Art. gen. 28. syn. 46. Go-*  
bius e nigricante varius,  
pinna dorsali secunda offi-  
culorum 14.

D.6,14.P.17.V.-- A.14.C.--

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 74. Idem.*

*Osbeck. iter 131. Apocry-*  
ptes cantonensis.

D.6,14.P.10.V.12.A.13.C.18.

*Habitat in Europa, Asia.*

Paganel-  
lus.

2. G. pinna caudali dorsali-  
que secunda basi purpu-  
rascente, priori linea  
lutea terminali.

*Art. gen. 29. syn. 46. Gobi-*  
us linea lutea transver-  
sa, in summo pinnæ  
dorsalis primæ.

*Hasselq. itin. 326. Gobi-*  
us Paganellus.

D.6,17.P.17.V.12.A.16. C.20.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Eleotris. 3. G. pinna anali radiis novem

*Chin. Lagerstr. 28. B. 5. D.6,11.P.20.V.10.A.9.C.10.*

*Osbeck. iter. 260. Gobi-*  
us chinen-  
sis.

B. 5. D.6,11.P.18.V.8.A.8.C.12.

*Amæn. acad. 1. p. 311. Tra-*  
chinus capite inermi nudo,  
pinnis pectoralibus coadu-  
natis.

D.10,6.P.16.V.12.A.10.C.14.

*Gron. zooph. 276. Gobi-*  
us albescens, pinnis utrisque  
dorsalibus altitudine æqua-  
libus, cauda subrotunda.

D.6,10.P.14.V.-- A.9.C.15.

*Habitat in China.*



- Aphya. 4. *G. fasciis etiam pinnarum fuscis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 64.* \* D.6,16.P.18.V.12.A.14.C.13.  
*Art. gen. 29. syn. 49. Gobius uncialis pinna dorsif secunda officulorum 17. D.6,17.P.17.V.6. A. 11. C. --*  
*Habitat in Nilo, M. Mediteraneo.*
- Jozo. 5. *G. radiis dorsalibus eminentibus setaceis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 65.* \* B.4.D.6,13.P.16.V.12.A.13.C.14.  
*Art. gen. 29. syn. 47. Gobius pinna ventrali cærulea, officulis pinnæ dorsalis supra membranam affurgentibus.*  
*Gron. mus. 176. Zooph. 275. Gobius albescens, radiis p. dorsalis primæ præaltis setiformibus.* D.6,16.P.19.V.12.A.  $\frac{1}{4}$ . C.15.  
*Habitat in Oceano Europæo: Italiae, Norvegiæ.*
- pectini-rostris. 6. *G. dentibus maxillæ inferioris horizontalibus.*  
*Chin. Lagerstr. 29. f. 3. D.5,26.P.19.V.12.A.25.C.15.*  
*Osbeck. iter. 130. Apocryptes chinensis.* B.5.D.5,26.P.18.V.10.A.26.C. --  
*Habitat in China.*
- barbarus. 7. *G. pinnis pectoralibus flabello insistentibus pinna dors. priore 12, posteriore 13.*  
*Habitat ---*
- anguilla-  
ris 8. *G. pinna dorsali unica.* D.52.P.12.V.10.A.43.C.12.  
*Habitat in China.*  
*Corpus lubricum Anguillæ pingue, subdiaphana cute ut venæ transpareant. Pinnae omnes rubrae: Dorsalis & Analis in caudam excurrentes. Os sinum dentibus exsertum. Pinnae pectorales valde parvae, rotundatae.*

160. COTTUS. *Caput* corpore latius, spinosum.  
*Membr. branch. radiis* VI.  
*Corpus* - - -

cataphra- 1. C. loricatus; rostro verru-  
 ctus. cis 2 bifidis, capite subtus  
 cirroso. *Fn. svec.* 324.

*Art. gen.* 49. *syn.* 77. *spec.*

87. Cottus cirris pluri-

mis, corpore octagono. D.  $\frac{5}{12}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{3}$ . A. 6. C. 11.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 70. Idem. D. 5, 7. P. 16. V. 2. A. 7. C. 11.

*Seb. mus.* 3. t. 28. f. 6.

*Habitat in Mari Europæo.*

quadri- 2. C. verrucis capitis 4 offeis.  
 cornis. *Fn. svec.* 321. *S yst. nat.*

6. p. 47. t. 4. f. 3. *Mus.*

*Ad. Fr.* 1. p. 70. t. 32. f. 4.

*Art. gen.* 48. *spec.* 84. Cot-

tus scaber, tuberculis 4

corniformibus in medio

capite.

D. 9, 14. P. 17. V. 4. A. 14. C. 12.

*Habitat in Mari Baltico.*

grun- 3. C. gula ramentis villosa,  
 niens. corpore nudo. *Mus. Ad.*

*Fr.* 2. p. 65. \*

D. 2, 26. P. 18. V.  $\frac{1}{3}$ . A. 22. C. 12.

Varietas alia.

D. 2, 21. P. 22. V.  $\frac{1}{3}$ . A. 16. C. 12.

*Gron. mus.* 1. n. 106. Cottus

alepidotus varius, ma-

xilla inferiore longiore

multum cirrata.

D.  $\frac{3}{25}$ . P. 23. V. 3. A. 19. C. 15.

*Marcgr. bras.* 178. Nigvi.

*Will. icht. app.* t. 4. f. 1.

Gallus grunniens.

*Seb. mus.* 3. t. 28. f. 4.

*Habitat in America.*

scaber. 4. C. capite striis corporisque  
 squamis ferratis, linea la-  
 terali elevata. *Mus. Ad.*

*Fr.* 2. p. 66.

B. 7. D. 9, 11. P. 2. V.  $\frac{1}{3}$ . A. 11. C. 12;

*Habitat* - - -



Scorpius. 5. C. capite spinis pluribus,  
maxilla superiore paulo  
longiore. *Fn. svec.* 323.

*It. scan.* 325. Ulka. D. 9. P. 16. V. 3. A. 12. C. 12.

*Art. gen.* 49. *syn.* 77. *spec.*

86. *Fn. svec.* 280. Cot-

tus alepidotus, capite

polyacantho, maxilla su-

periore paulo longiore D. 7, 17. P. 14. V. 4. A. 13. C. 8.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 70. Cot-

tus idem.

D. 10, 14.

*Gron. mus.* 1. n. 104. Idem. D. 10, 14. P. 16. V. 4. A. 10. C. 12.

*Edw. av.* 158. t. 284.

*Aët. nidros.* 2. p. 345. t. 13,

14. Fisk-Sympen.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Gobio. 6. C. lævis, capite spinis dua-  
bus.

*Art. gen.* 48. *syn.* 76. *spec.*

82. Cottus alepidotus gla-

ber, capite diacantho. D. 7, 17. P. 14. V. 4. A. 13. C. 8.

*Faun. svec.* 322. \*

D. 7, 18. P. 14. V. 4. A. 13. C. 10.

*Gron. mus.* 2. n. 166. Urano-

scopus capite utrinque

monacanthio.

D. 7, 18. P. 14. V. 4. A. 12. C. 13.

*Habitat in Europæ fluviiis, rivulis, fundo arenoso s. saxoso.*

*Nidum in fundo format, ovis incubat prius vitam de-*  
*ferturus, quam nidum.*

161. SCORPÆNA. Caput magnum, aculeatum:

Oculi vicini. Dentes maxil-

lis, palato faucibusque.

Membr. branch. radiis VII.

Corpus - - -

Porcus. 1. S. cirris ad oculos naresque. D.  $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{2}$ . P. 18. V. 7. A.  $\frac{3}{8}$ . C. 15.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 68. Zeus

cirris supra oculos & na-

res.

D.  $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{1}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{8}$ . C. 12.

*Art. gen. 47. syn. 75.* Scorpæna pinnulis ad oculos & nares.

$D. \frac{1}{2} \frac{2}{1}. P. 16. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{8}. C. - -$

*Hasselq. it. 330. Idem.*

$D. \frac{1}{2} \frac{2}{1}. P. 16. V. 6. A. \frac{3}{8}. C. 13.$

*Gron. zooph. 291.* Perca dorso monopterygio, capite subcavernoso aculeato alepidoto, cirrulis ad oculos, latera corporis, capitisque.

$D. \frac{1}{2} \frac{2}{2}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. - - C. 14.$

*Seb. mus. 3. t. 28. f. 3.* Cottus squamosus.

*Habitat in Mari Mediterraneo, Oceano.*

Scrofa. 2. *S. cirris* duobus ad labium inferius.

*Art. gen. 47. syn. 76.* Scorpæna tota rubens, cirris plurimis ad os.

$D. - - P. 19. V. - - A. - - C. - -$

*Gron. mus. 1. n. 103.* Scorpæna capite cavernoso, cirris geminis in maxilla inferiore?

$D. \frac{1}{2} \frac{2}{2}. P. 15. V. - - A. 6. C. 13.$

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

horrida. 3. *S. tuberculis* callosis adspersa.

*Gron. zooph. 292. t. 11, 12, 13. f. 1.* Perca alepidota, dorso monopterygio, capite cavernoso tuberculato, radiis dorsalibus anticis

membr. dilatata lobatis.  $B. 5. D. \frac{1}{2} \frac{1}{8}. P. 15. V. 6. A. \frac{3}{8}. C. 14.$

*Valent. ind. 3. f. 170.* To-verfisch.

*Habitat in India orientali.*



162. ZEUS. *Caput* compressum, declive: *Lab. superius* membrana transversa fornicatum. *Lingua* subulata.  
*Membr. branch.* radiis VII perpendicularibus: infimo transverso.  
*Corpus* compressum.

Vomer. 1. Z. cauda bifurca, spina ante pinnam analem dorsalemque recumbente.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 67. t. 31.*

*f. 9. Zeus cauda bifurca. D. 8.  $\frac{1}{2}$ . P. 18. V. 5. A.  $\frac{1}{20}$ . C. 23.*  
*Habitat in America.*

*Color argenteus. Pinna dorsi anterior radiis 5: posterioribus distinctis brevissimis spinosis; spinæ 2 pone anum. Linea lateralis valde curva. Abdomen valde rotundato-prominens.*

Gallus. 2. Z. radio dorsali decimo analique secundo corpore longioribus.

*Art. gen. 35. syn. 78. Zeus cauda bifurca.*

*Gron. mus. 1. n. 108. Idem. D.  $\frac{2}{31}$ . P. 20. V. 6. A.  $\frac{1}{20}$ . C. 17.*

*Brown. jam. 455. Rhomboida major alepidota, radiis anterioribus pinnæ dorsalis & ani longissimis.*

*Marcgr. bras. 161. Abuca-tuia.*

*Seb. mus. 3. p. 72. t. 26. f. 34.*

*Habitat in America.*

*Varietatem præcedentis facit Gron. zooph. 311; distinctam speciem Brown. jam. 455.*

Fabe.: 3. Z. cauda rotundata, lateribus mediis ocello fusco, pinnis analibus duabus. D. 10, 23. P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{4}{27}$ . C. 13.  
*Art. gen. 50. syn. 78. Zeus ventre aculeato, cauda in extremo circinata. D. 10, 24. P. 14. V.  $\frac{1}{7}$ . A.  $\frac{4}{26}$ . C. . .*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 67. t. 31.*

*f. 2. Zeus ventre aculeato,  
cauda rotundata.*

*D.10,23.P.13.V. $\frac{1}{7}$ .A21.C.15.*

*Gron. mus. 1. n. 107. Idem. D.10,21.P.13.V.7.A.4,22.C.14  
zooph. 311.*

*Habitat in Pelago.*

*Aper. 4. Z. cauda æquali , corpore  
rubente.*

*Art. gen. 50. syn. 78. Zeus  
cauda æquali totus ru-  
bens, rostro reflexo.*

*D. 9, 23. P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. --*

*Habitat Romæ, Genuæ.*

**163. PLEURONECTES (\*).** *Caput : Oculi ambo in  
eodem latere capi-  
pitis.*

*Membr. branch. radiis  
IV - VII.*

*Corpus compressum,  
latere altero dor-  
sum, altero abdo-  
men referente.*

*\* Oculis a latere dextro.*

*trichoda- 1. P. oculis dextris , corpore  
ctylus. aspero , pinnis pectorali-  
bus filiformibus.*

*D. 53. P. 4. V. 5. A. 43. C. 16.*

*Art. gen. 18. syn. 33. spec.*

*60. Pleuronectes asper ca-  
nescens , pinnis lateralibus  
vix conspicuis.*

*Habitat in Amboina.*

*Corpus fuscum , maculis obscuris varium.*

*Plagiusa. 2. P. oculis dextris , corpore  
oblongo scabriusculo , pin-*

**F f 4**

**na**

(\*) *Pleuronectes inter omnia animalia singularis oculis ambobus ab eodem la-  
tere capitis & corpore latere altero superiore colorato; altero inferiore pal-  
lido, natatu obliquo. Oculi dextri s. sinistri aliquando variant, sed rarius.*



na dorsali analique caudæ  
unitis.

*Habitat in Carolina D. Garden.*

*Corpus subcinereum. Pinna dorsalis analisque ita unite cum pinna caudæ, ut distingui nequeant, nequidem radiorum longitudine.*

ocellatus. 3. P. oculis dextris, corpore ocellis 4 atris iridibus albis.

*Mus. Ad. Fr. 2. p. 68. \* D.66.P.3.V.6.A.55.C.14.*

*Habitat Surinami.*

*Pinna dorsalis plicata. Pinna caudæ fascia nigra.*

Hippo- 4. P. oculis dextris, corpore  
glossus. toto glabro. *Fn. svec. 329.*

*Art. gen. 17. syn. 31. Pleuronectes oculis a dextra totus glaber.*

*D.105.P.15.V.6.A.79.C.--*

*Gron. mus. 2. n. 158. Idem. D.102.P.16.V.6.A.78.C.19.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Variat varius oculis sinistris.*

Cyno- 5. P. oculis dextris, corpore  
glossus. oblongo glabro, dentibus obtusis, cauda subrotunda.

*Gron. mus. 1. n. 39.*

*D.112.P.11.V.6.A.102.C.24.*

*Habitat in Oceano Belgium alluente.*

Plateffa. 6. P. oculis dextris, corpore glabro, tuberculis 6 capitis. *Fn. svec. 328.*

*Art. gen. 17. syn. 30. Pleuronectes oculis & tuberculis 6 in dextra capitis, lateribus glabris, spina ad anum.*

*D.77.P.12.V.6.A.55.C.--*

*It. wgoth. 179. nomen Fn. svec.*

*D.74.P.11,6.V.6.A.54.C.20.*

*It. scan. 326. Pleuronectes Slätvar.*

*D.76.P.12.V.6.A.54.C.17.*

*Gron. mus. 1. n. 36. nom.*

*Arted.*

*D.72.P.12.V.6.A.51.C.20.*

*Habitat in M. Europæo.*

*Corpus supra rubro-maculatum*

- Fleus.** 7. P. oculis dextris, linea laterali aspera, spinulis ad pinnae. *Faun. svec.* 327.  
*Mus. Ad. Fr.* 2. p. 67. \* D. 55. P. 11. V. 6. A. 40. C. 14.  
*Art. gen.* 17. *syn.* 31. Pleuronectes oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis superne ad radices pinnae, dentibus obtusis.  
*Art. spec.* 59. Pleuronectes linea laterali aspera, spinulis ad radices pinnae in latere oculato. D. 61. P. 12. V. 6. A. 42. C. 19.  
*Gron. mus.* 1. n. 40. Idem. D. 62. P. 12. V. 6. A. 43. C. 14.  
*It. scan.* 326. Idem. D. 54. P. 11, 10. V. 6. A. 41. C. 17.  
*Habitat in M. Europæo.*

- Limanda.** 8. P. oculis dextris, squamis ciliatis, spinulis ad radicem pinnae dorso anique, dentibus obtusis. *Art. gen.* D. 75. P. 12. V. 2. A. 61. C. --  
*17. syn.* 33. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 68. \* D. 79. P. 12. V. 6. A. 60. C. --  
*Habitat in M. Europæo.*

- Solea.** 9. P. oculis dextris, corpore aspero oblongo, maxilla superiore longiore. *Faun. svec.* 326.  
*Art. gen.* 18. *syn.* 32. *spec.* 60. Pleuronectes maxilla superiore longiore, corpore oblongo squamis utrinque asperis. D. 91. P. 9. V. 5. A. 74. C. 14.  
*It. wgoth.* 178. Pleuronectes Tunga. D. 71. P. 8. 7. V. 5. A. 40. C. 40.  
*Habitat in M. Europæo.*  
*Oris latus sinistrum cirrosum.*

- Lingua-** 10. P. oculis dextris, ano sinistro, dentibus acutis.  
*Art. gen.* 17. *syn.* 31. Pleuronectes oculis a dextra, ano ad latus sinistrum, dentibus acutis. D. 65. P. 9. V. -- A. 45. C. --  
*Gron.*



*Gron. mus. 1. n. 41. Idem. D. 68. P. 10. V. 6. A. 55. C. 19.*  
*Habitat in M. Europæo.*  
*Anus ad latus.*

\* \* *Oculis a latere sinistro.*

**lineatus.** 11. *P. oculis finistris, corpore*  
*scabro nigro fasciato, pin-*  
*nis pectoralibus nullis. D. 53. P. 0. V. 4, 5. A. 45. C. 16.*  
*Syst. nat. 10. p. 268. n. 1, 3.*

*Pleuronectes Achirus.*

*Gron. mus. 1. n. 42. Pleuro-*  
*nectes oculis dextris, cor-*  
*pore glabro, pinnis pecto-*  
*ralibus nullis. D. 60. P. 0. V. 4. A. 48. C. 16.*

*Brown. jam. 445. Pleurone-*  
*ctes fuscus subrotundus*  
*glaber, lineis 7 nigris trans-*  
*versis inter p. pectoralem*  
*& caudam.*

*Sloan. jam. 2. p. 77. t. 246.*  
*f. 2. Passer lineis trans-*  
*versis.*

*Raj. pis. 157. Idem.*

*Habitat in America septentrionali. D. Garden.*  
*Squamæ ciliares. Cauda rotundata.*

**Rhom-** 12. *P. oculis finistris, corpore*  
**bus.** *glabro. Art. gen. 18. syn.*  
*31. Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
*69. \* D. 76. P. 10. V. 6. A. 57. C. --*  
*It. wgoth. 178. Pleuronectes*  
*Pigghvarf. D. 71. P. 12. V. 6. A. 61. C. 18.*  
*Ström. sondm. Pleuronectes*  
*arenarius. D. 70. P. 10. V. 6. A. 57. C. 16.*  
*Gron. mus. 1. n. 43. nom.*  
*Arted. D. 78. P. 10. V. 6. A. 56. C. 16.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Maximus Domitiani tempore captus, unde Senatus*  
*consult:*  
*Ex hoc tempore, jam Caesar figuli tua castra sequantur.*

**dentatus.** 13. *P. oculis finistris, corpore*  
*oblongo glabro, dentibus*  
*exsertis. B. 7. D. 86. P. 12, 11. V. 66. C. 17.*  
*Habi-*

*Habitat in Carolina. D. Garden. Plaise.*  
*Dentes acuti, exserti. Cauda rotundata, squamosa.*

- maximus. 14. *P. oculis finistris, corpore aspero. Art. gen. 18. syn. 32. Mus. Ad. Fr. 2. p. 69. \* Fn. svec. 325. D. 70. P. 11. V. 6. A. 50. C. 17. Fn. svec. 298. Idem. D. 64. P. 11. V. 6. A. 48. C. 16. It. gotl. 178. Idem. D. 59. P. 12. V. 6. A. 39. C. 16. Gron. mus. 2. n. 159. Idem. D. 65. P. 13. V. 6. A. 50. C. 16. Habitat in Oceano Europæo.*
- Passer. 15. *P. oculis finistris, linea laterali sinistra aculeata. Art. gen. 18. syn. 32. Pleuronectes oculis a sinistra, linea laterali aculeata. D. 66. P. 9. V. 6. A. 50. C. -- Habitat in Oceano Europæo. Varietas Flesti secundum Gronovium.*
- papillo-  
fus. 16. *P. oculis finistris, linea laterali curva, corpore papilloso. D. 58. P. 12. V. 5. 6. A. 42. C. 16. Marcgr. bras. 181. Aramaca, Habitat in America.*
- unatus. 17. *P. oculis finistris, corpore ocellis dimidiatis sparsis cæruleis. D. 85. P. 12. V. 6. A. 79. C. 17. Catesb. car. 2. p. 27. t. 27. Solea lunata & punctata. Habitat in America septentrionali. Cauda lunata.*



164. CHÆTODON (\*). *Caput: Dentes setacei, flexiles, confertissimi, numeroſissimi.*

*Membr. branch. radiis VII*  
*Corpus pictum. Pinna dorsifianique carnosasquamosa.*

cane-  
scens.

1. C. cauda bifida, spinis dorsalibus 2: radio tertio longissimo, ore bidentato cauda bifida.

*Art. spec. 93. Chætodon canescens, aculeo utrinque ad os, officulo tertio pinnae dorsalis setiformi longissimo.*

*D.  $\frac{2}{45}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{8}{36}$ . C. 16*

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 7.*

*Habitat in Indiis.*

alepido-  
tus.

2. C. cauda bifida, spinis dorsalibus 3, pinnis ventralibus nullis.

*B. 6. D.  $\frac{2}{31}$ . P. 24. V. 0. A.  $\frac{3}{47}$ . C. 233*

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Corpus rhombeum, absque squamis, dorso cærulescente. Dentes unica serie in maxillis. Linea lateralis dorsæ parallela, punctata. Linea interstitialis recta a branchiis ad caudam. Pinna dorsalis analisque oppositæ, falcatæ.*

acumina-  
tus.

3. C. cauda integra, spinis dorsalibus 3: radio tertio longissimo.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 63. t. 33. f. 3. Chætodon fasciis 3 fuscis, pinna dorsali setiformi.*

*D.  $\frac{3}{28}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{1}{19}$ . C. 177*

*Habitat in Indiis.*

4. C.

(\*) Chætodon Caudæ pinna bifida: 1, 2, 5, 10, 11, 14, 18.

Roſtro cylindrico elongato: 8, 12, 16.

Radio pinnae dorſi 3 ſ. 4 longiſſimo: 1, 3, 5, 13.

- pinnatus*. 4. C. cauda integra, spinis dorsalibus 4, pinna dorsali analique longissima.  
*Mus. Ad. Fr. p. 64. t. 33. f.*  
 6. Chætodon griseus, fascia frontali apiceque caudæ albis. *D.* $\frac{4}{40}$ .*P.*18.*V.* $\frac{1}{2}$ .*A.*28.*C.*18.  
*Chin. Lagerstr. 25. Idem. D.*30.*P.*18.*V.* $\frac{1}{2}$ .*A.*28.*C.*18.  
*Gron. mus. 2. n. 193. Chæ-*  
*todon macrolepidotus, ca-*  
*pite inermi, radiis p. dorsi*  
*ani ventrisque setiformibus.*  
*Seb. mus. 3. t. 25. f. 15.*  
*Habitat in Indiis.*
- cornutus*. 5. C. cauda bifida, spinis pinnæ dorsalis 7, cauda bifida, radio dorsali tertio longissimo.  
*Art. syn. 79. Chætodon acu-*  
*leis 2 brevibus supra oculo-*  
*s, officulo tertio pinnæ*  
*dorsalis longissimo. D.* $\frac{7}{48}$ .*P.*18.*V.* $\frac{1}{6}$ .*A.* $\frac{3}{2}$ .*C.*16  
*Seb. mus. 3. t. 25. f. 6.*  
*Habitat in Indiis.*
- argenteus*. 6. C. cauda bifida, spinis pinnæ dorsalis 8, pinnis ventralibus ex spinis 2. *Amæn. acad.*  
*4. p. 249. D.* $\frac{8}{37}$ .*P.*26.*V.* $\frac{1}{6}$ .*A.* $\frac{3}{2}$ .*C.*17.  
*Habitat in Indico Mari.*  
*Differt a reliquis defectu pinnarum ventralium, harum*  
*vero loco par spinarum breviorum. Pinnæ dorsalis*  
*spinæ primæ adeo parvæ, ut vix conspiciantur.*
- punctatus*. 7. C. spinis pinnæ dorsalis 8, pinnis pectoralibus falcatis. *B.*4.*D.* $\frac{8}{50}$ .*P.*17.*V.* $\frac{1}{6}$ .*A.* $\frac{2}{5}$ .*C.*17.  
*Habitat in Asia. Mus. ac. holmens.*  
*Corpus albidum s. argenteum punctis fuscis, pone anum*  
*dilatatum, figura Cyprini. Oculi magni, rubri. Li-*  
*nea lateralis sursum curva. Radii 3 primi p. ani*  
*distantes.*

8. C.

---

Chætodontes, pulchrum piscium pictorum Indiæ cohortem constituentes, a me distinguuntur secundum spinas dorsales.



arcuatus. 8. C. cauda integra, spinis pinnæ dorsalis 8, arcubus 4 albis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 61. t. 33.*

*f. 5.* Chætodon fuscus, arcubus 5 nigris.

$D. \frac{2}{3} \frac{8}{8}. P. 20. V. \frac{1}{5}. A. \frac{3}{2} \frac{7}{7}. C. 19.$

*Art. syn. 79. spec. 91.* Chætodon niger, capite diacantho, lineis utrinque 4 transversis curvis.

$D. \frac{9}{4} \frac{1}{1}. P. \frac{2}{2} \frac{9}{9}. V. \frac{1}{6}. A. \frac{3}{2} \frac{3}{3}. C. 17.$

*Gron. zooph. 231.* Chætodon operculis aculeatis, ossiculis p. dorsi anique intermediis inermibus.

$D. \frac{1}{3} \frac{4}{4}. P. 19. V. \frac{1}{6}. A. \frac{3}{2} \frac{4}{4}. C. 17.$

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 5, 5.*

*Habitat in Indiis.*

rostratus. 9. C. cauda integra, spinis pinnæ dorsalis 9, maculaque ocellari, rostro cylindrico.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 61. t. 33.*

*f. 2.* Chætodon rostratus, pinna dorsali postice macula fusca.

$D. \frac{2}{4} \frac{6}{6}. P. 14. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{2} \frac{3}{3}. C. 14.$

*Act. angl. 1765. p. 89. t. 9.*

*Jaculator.*

*Gron. mus. 1. n. 109.* Chætodon macrolepidotus albo-flavescens, rostro longissimo osseo, macula nigra ad pinnam dorsalem.

$D. \frac{2}{3} \frac{9}{9}. P. 15. V. \frac{1}{6}. A. \frac{3}{2} \frac{4}{4}. C. -$

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 17.*

*Habitat in India; viſſitat Inſectis ſupra aquam volitantibus, in quæ explodit roſtro tubuloſo exquisitiſſime guttulam, ut ea cadant in aquam & devorentur. Act. angl.*

nigricans. 10. C. cauda ſubbifida, spinis pinnæ dorsalis 9, spina laterali utrinque caudæ integræ.

*Art. spec. 90.* Chætodon nigrescens, cauda albescente æquali utrinque aculeata.

$D. \frac{2}{3} \frac{8}{8}. P. 16. V. \frac{1}{6}. A. \frac{3}{2} \frac{9}{9}. C. 16.$

*Hasselq. itin* 332. Chætodon

aculeis in utroque latere

ad caudam duobus.

D.  $\frac{6}{3}$ . P. 17. V. 6. A.  $\frac{2}{2}$ . C. 26.

*Seb. mus.* 3. t. 25. f. 2, 3.

*Habitat in Mari rubro.*

leucurus. 11. C. cauda integra, spinis  
dorsalibus 9 : prima re-  
cumbente corpore nigro,  
cauda alba.

D.  $\frac{9}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{2}$ . A.  $\frac{3}{2}$ . C. 20.

*Habitat in America.*

Corpus parvum, nigrum. Spina recumbens ante P.  
dorsalem. P. ventrales acuminatæ. P. caudalis alba.

lineatus. 12. C. cauda bifida, spinis dor-  
salibus 9, spina laterali  
utrinque caudæ.

*Art. spec.* 89. Chætodon li-  
neis longitudinalibus varius,  
cauda bifurca utrinque acu-  
leata.

D.  $\frac{9}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{2}$ . A.  $\frac{3}{2}$ . C. 16.

*Seb. mus.* t. 25. f. 1.

*Habitat in Indiis.*

triofte- 13. C. cauda subbifida, spinis D.  $\frac{9}{3}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{2}$ . A.  $\frac{2}{2}$ . C. 16.  
gus. dorsalibus 9, branchioste-  
ga triradiata. *Mus. Ad. Fr.* 2.

p. 70. \*

D.  $\frac{9}{3}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{2}$ . A.  $\frac{3}{2}$ . C. 18.

*Brown. jam.* 454. Chætodon  
subgriseus lineis nigris obli-  
quis varius, ad caudam ma-  
cula majori.

*Seb. mus.* 3. p. 65. t. 25. f. 4.

Chætodon albescens fasciis  
quinque.

D.  $\frac{9}{3}$ . P. 15. V. 6. A.  $\frac{3}{2}$ . C. 16.

*Sloan. jam.* 2. p. 290. t. 251.

f. 4. Faber marinus fere  
quadratus.

*Raj. pisc.* 12. Faber marinus  
quadratus.

*Habitat in America. D. Garden. Angelfisk.*

Corpus cinereum fasciis 6, nigris, latis: prima obliqua  
per oculos; ultima per caudam. Linea lateralis cur-  
va. P. dorsalis antè nuda, in qua radius 3  
major. Cauda integra.



macrolepidotus. 14. C. cauda integra, spinis dorsalibus 11, radio dorsali quarto filiformi longissimo.

*Art. spec. 94.* Chætodon lineis utrinque 2 nigris, radio quarto dorsali longissimo setiformi.

$D. \frac{11}{7}. P. \frac{2}{18}. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{23}. C. 17.$

*Gron. mus. 2. n. 194.* Chætodon officulis dorsalibus 3 aculeatis, quarto setiformi, 7 subsequentibus iterum aculeatis.

$D. \frac{11}{37}. P. 19. V. \frac{1}{8}. A. \frac{2}{21}. C. 16.$

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 8.*

*Habitat in Indiis.*

Argus. 15. C. spinis dorsalibus 11, corpore punctis nigris plurimis, cauda integra. *M. T.*

*Brunnich.*

$D. \frac{11}{28}. P. 13. V. \frac{1}{8}. A. \frac{4}{18}. C. 12.$

*Habitat in India; e Mus. Schlosseri.*

striatus. 16. C. cauda integra, spinis pinnae dorsalis 12, corpore striato, rostro prominente.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 62. t. 33.*

*f. 7.* Chætodon flavescens, fasciis 5 fuscis.

$D. \frac{10}{30}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{21}. C. 18.$

*Art. spec. 95.* Chætodon macrolepidotus, lineis utrinque tribus nigris latis, linea quarta in cauda.

$D. \frac{12}{33}. P. 16. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{21}. C. 17.$

*Amæn. acad. 1. p. 313.* Labrus rostro reflexo, fasciis lateralibus 3 fuscis.

$D. \frac{12}{33}. P. 14. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{26}. C. 17.$

*Gron. mus. 1. n. 110.* Chætodon rostro longo osseo, macrolepidotus albo-flavescens lineis transversalibus 4 brunneis.

$D. \frac{11}{32}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{21}. C. —$

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 9.*

*Habitat in Indiis.*

aruanus. 17. C. cauda bifida, spinis pinnae dorsalis 12, corpore fasciis fuscis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 63. t. 33.*

*f. 8. Chætodon cauda bifurca, fasciis 3 fuscis.*

*D.*  $\frac{1}{3}\frac{2}{2}$ . *P.* 18. *V.*  $\frac{1}{6}$ . *A.*  $\frac{2}{1}\frac{2}{3}$ . *C.* 16.

*Habitat in Indiis.*

*Frons alba est.*

capistratus.

18. *C. cauda integra, spinis pinnæ dorsalis 12, corpore striato, ocello subcaudali.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 63. t. 33.*

*f. 4. Chætodon pallidus, fascia capitis ocelloque subcaudali fuscis.*

*D.*  $\frac{1}{3}\frac{2}{2}$ . *P.* 14. *V.*  $\frac{1}{6}$ . *A.*  $\frac{3}{2}\frac{1}{1}$ . *C.* 18.

*Gron. mus. 2. n. 195. Chætodon macrolepidotus, linea nigra ad oculos, macula rotunda ad pinnam dorsalem.*

*D.*  $\frac{1}{3}\frac{2}{0}$ . *P.* -- *V.*  $\frac{1}{6}$ . *A.*  $\frac{2}{1}\frac{2}{8}$ . *C.* --

*Amæn. acad. 1. p. 314. Labrus rostro reflexo, ocello purpureo iride alba juxta caudam.*

*D.*  $\frac{1}{2}\frac{3}{1}$ . *P.* 14. *V.*  $\frac{1}{6}$ . *A.*  $\frac{1}{1}\frac{2}{7}$ . *C.* --

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 16?*

*Habitat in Indiis.*

vagabundus.

19. *C. cauda integra, spinis pinnæ dorsalis 13, corpore striato, rostro cylindrico. Mus. Ad. Fr. 2. p. 71. \**

*D.*  $\frac{1}{4}\frac{1}{0}$ . *P.* 15. *V.*  $\frac{1}{8}$ . *A.* 24. *C.* 18.

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 18. Chætodon macrolepidotus albescens linea nigra ad oculos.*

*D.*  $\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . *P.* 15. *V.*  $\frac{1}{6}$ . *A.*  $\frac{3}{2}\frac{2}{3}$ . *C.* --

*Habitat in Indiis.*

ciliaris.

20. *C. cauda integra, spinis pinnæ dorsalis 14, operculis spinosis, squamis ciliatis.*

*Gron. mus. 2. n. 192. Chætodon macrolepidotus, aculeis utrinque 2 in operculis, postico longissimo.*

*D.*  $\frac{1}{3}\frac{4}{3}$ . *P.* 26. *V.*  $\frac{1}{6}$ . *A.*  $\frac{3}{2}\frac{3}{6}$ . *C.* 17.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 62. t. 33.*

*f. 1. Chætodon griseus fasciis 4 fuscis.*

*D.*  $\frac{1}{3}\frac{1}{4}$ . *P.* 20. *V.*  $\frac{1}{6}$ . *A.*  $\frac{3}{0}\frac{2}{2}$ . *C.* 18.



*Osborn. iter.* 273. *Sparus faxatilis*.

$D. \frac{13}{9}. P. 16. V. 6. A. \frac{3}{2}. C. 20.$

*Edw. av.* 2. p. 156. t. 283.

f. 4.

*Habitat in Indiis.*

*faxatilis.* 21. C. cauda bifida, spinis pinnæ dorsalis 14, pinnis ventralibus acuminatis, dentibus emarginatis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 64. Chætodon fasciis 5 albis, cauda bifurca.

$D. \frac{14}{2}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{2}{3}. C. 15.$

*Amæn. acad.* 1. p. 312. Sparus fasciis 5 transversis fuscis.

$D. \frac{13}{2}. P. 18. V. \frac{1}{8}. A. \frac{2}{4}. C. 15.$

*Gron. mus.* 1. n. 89. Idem

$D. \frac{13}{2}. P. 17. V. \frac{1}{8}. A. \frac{2}{4}. C. 18.$

*Gron. zooph.* 222. Sparus latissimus, cauda furcata, fasciis 5 subfuscis.

*Pis. bras.* 88. Jaguacaguare.

*Habitat in Brasilia.*

*Habitu toto Percæ a congeneribus recedit.*

*rotundus.* 22. C. spinis pinnæ dorsalis 23, fasciis quinque pallidis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 64. Chætodon rotundatus cinereus, fasciis 5.

$D. \frac{23}{2}. P. 10. V. \frac{1}{8}. A. \frac{2}{4}. C. \dots$

*Habitat in Indiis.*

*lanceolatus.* 23. C. cauda integra, corpore fasciis tribus: oculari pectorali longitudinalique.

*Edw. av.* 210. t. 210. Guaperva.

*Habitat in India.*

Corpus oblongum, lanceolatum: fasciæ nigræ margine griseæ 3: prima transversa per oculos; secunda transversa per thoracem; tertia a pinna dorsali anteriori ad pinnam caudæ.

65. SPARUS. *Caput: Dentes* incisores vel lanianarii robusti; molares obtusiusculi, conferti. *Labia* duplicata.

*Membr. branch. radiis* V. *Opercula* squamosa.

*Corpus* compressum. *Linea lateralis postice* curvata. *Pinnæ Pectorales* rotundatæ.

\* *Macula nigra* notati.

*Kurata.* 1. S. lunula aurea inter oculos. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 72. \*

D.  $\frac{11}{24}$ . P. 15. V. 6. A.  $\frac{3}{18}$ . C. 17.

*Art. gen.* 25. *syn.* 63. Sparus dorso acutissimo, linea arcuata aurea inter oculos.

D. 24. P. 17. V. 6. A. 14. C. --

*Gron. mus.* 1. n. 90. Idem.

D.  $\frac{12}{23}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{12}$ . C. 20.

*Læfl. epist.* Idem.

D.  $\frac{12}{22}$ . P. 15. V. 6. A. 11. C. 17.

*Hasselq. itin.* 337. Idem.

D.  $\frac{11}{24}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{14}$ . C. 22.

*Habitat in Mari Mediterraneo & Oceano inter Europam Americamque.*

*In meo exemplari macula nigra ad caudam.*

*Romanis olim pretiosissimus Sergi auctoritate; Veneri sacer.*

*annularis.* 2. S. ocello nigro subcaudali, corpore flavescente.

*Art. gen.* 37. *syn.* 57. Sparus unicolor flavesceus.

*Art. gen.* 37. *syn.* 57. Sparus unicolor flavesceus, macula nigra annulari ad caudam.

*Habitat in Mari Adriatico, infero.*

*Sargus.* 3. S. ocello subcaudali, corpore fasciis nigris. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 73. \*

D.  $\frac{12}{26}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{18}$ . C. 17

*Art. gen.* 37. *syn.* 58. Sparus lineis transversis variis, macula nigra insigni ad caudam.

D. 26. P. 14. V. 6. A. 17. C. --



*Gron. zooph. 219. Cynædus*  
corpore ovato lato, cau-  
da bifurca, dentibus æqua-  
libus obtusis.

*D.* $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{4}$ . *P.* 16. *V.* 6. *A.* $\frac{3}{4}$ . *C.* 17.

*Rond. pisc. 5. c. 5. Sargus.*

*Habitat in M. infero: Romæ, Genuæ*

*Melanurus.* 4. *S.* ocello nigro caudæ,  
corpore lineis longitudi-  
nalibus.

*Art. gen. 37. syn. 58. Spa-*  
rus lineis longitudinali-  
bus varius, macula utrin-  
que ad caudam.

*Habitat in M. infero.*

*Smaris.* 5. *S.* ocello nigro laterali, pin-  
nis pectoralibus caudæ-  
que rubris.

*Art. gen. 36. syn. 62. Sparus*  
macula nigra in utroque  
latere medio, pinnis pe-  
ctoralibus caudaque rubris.

*Habitat in Europa australi.*

*Mæna.* 6. *S.* ocello fusco laterali, cor-  
pore variegato.

*Art. gen. 36. syn. 61. Spa-*  
rus varius, macula nigri-  
cante in medio latere, den-  
tibus 4 majoribus.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*faxatilis.* 7. *S.* ocello subcaudali, cor-  
pore candicante.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 65. Sciæ-*  
na ocello ad basin pinnæ  
caudæ.

*D.* $\frac{1}{3}$  $\frac{2}{3}$ . *P.* 16. *V.* $\frac{1}{2}$ . *A.* $\frac{3}{4}$ . *C.* 17.

*Gron. mus. 2. n. 185. t. 6.*

*f. 3. Sparus* rostro plagio-  
plateo, rufescens, macula  
nigra iride alba ad caudam  
subrotundam.

*Habitat Surinami.*

*D.* $\frac{1}{3}$  $\frac{1}{3}$ . *P.* 17. *V.* $\frac{1}{2}$ . *A.* $\frac{3}{4}$ . *C.* 17.

orphus. 8. S. ocello subcaudali, capite rufescente, cauda integra. †

*Art. gen. 37. syn. 63. Sparus varius, macula nigra caudam in extremo æqualem.*

D. 17.

*Habitat - - -*

\* \* *Rubri.*

Hurta. 9. S. cauda bifida, corpore fasciis transversis rubris, dentibus laniariis exsertis.

*Mus. Ad. Fr. 2. p. 73. \* D.  $\frac{1}{2}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{1}{3}$ . C. 17.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*An Dentex 20?*

Erythrinus. 10. S. cauda subintegra, corpore rubro.

D.  $\frac{1}{2}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{4}$ . C. 18.

*Læsl. ir. 103.*

D.  $\frac{1}{2}$ . P. 17. V. 6. A.  $\frac{2}{3}$ . C. 17.

*Art. gen. 36. syn. 59. Sparus totus rubens, iride argentea.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Americano.*

Pagrus. 11. S. rubescens, cute ad radicem pinnarum dorsi & ani in sinum producta.

*Art. gen. 36. syn. 64.*

*Habitat in Europa Australi.*

\* \* \* *Lineati.*

Boops. 12. S. lineis longitudinalibus obscuris: inferioribus quatuor aureis argenteisque.

*Art. gen. 36. syn. 61. Sparus lineis utrinque 4 aureis ac argenteis longitudinalibus parallelis.*

D. 30. P. - V. - A. 19. C. -

*Habitat in M. infero.*



Cantharus.

13. S. cauda immaculata, corpore lineis longitudinalibus luteis.

*Art. gen. 36. syn. 58. Sparus lineis utrinque luteis longitudinalibus parallelis, iride argentea.*

*Habitat in M. infero.*

*Dentes laniarii.*

Chromis. 14. S. cauda bifida, radio ventralium secundo setaceo.

*Art. gen. 37. syn. 62. Sparus officulo secundo pinnarum ventralium in longam setam quasi producto. D. 23. P. 17. V. 6. A. 12. C.*

*Habitat in Europa australi.*

Salpa.

15. S. cauda bifida, lineis fulvis longitudinalibus utrinque undecim. *Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 74. \**

*D.  $\frac{11}{8}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{7}$ . C. 15.*

*Art. gen. 38. syn. 60. Sparus lineis utrinque undecim aureis parallelis longitudinalibus.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Synagris. 16. S. cauda bifida rubra, corpore purpurascente lineis utrinque 7 aureis. †

*Catesb. car. 2 p. 17. t. 17. Salpa purpurascens variegata.*

*Habitat in America septentrionali.*

Rhomboides. 17. S. cauda integra, dorso canaliculato, corpore luteo-lineato.

*B. 6. D.  $\frac{12}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{7}{15}$ . C. 20.*

*Brown. jam. 446. Sparus striis longitudinalibus varius.*

*Catesb. car. 2. p. 4. t. 4.*

*Perca rhomboides.*

*Habitat in America. D. Garden Saltwater Bream.*

*Dentes obtusi. Fossula dorsalis ut in Sciaenid. M.*

cula

cula nigra inter radices *P. pectoralium*, & *dorsalis*.  
*P. ventralis*, & *analis caudalisque fulvæ*.

\* \* \* \* *Varii.*

*chrysops*. 18. *S. cauda lunata*, dorso canaliculato, oculorum iridibus aureis. B. 6. D.  $\frac{1}{2}\frac{3}{4}$ . P. 17. V. 6. A.  $\frac{1}{8}$ . C. 19.

*Catesb. car. 2. p. 16. t. 16.*

*Aurata bahamensis.*

*Habitat in Carolina. D. Garden. Porgee.*

*Corpus cærulescens. P. pectorales, ventrales, analis, caudalisque rubræ. Caput lituris cæruleis.*

*argyrops*. 19. *S. cauda lunata*, dorso canaliculato, oculorum iridibus argenteis. D.  $\frac{1}{2}\frac{2}{8}$ . P. 17. V. 6. A. 15. C. 20.

*Brown. jam. 447. Sparus iride argentea, dentibus anterioribus conicis.*

*Will. app. t. 3. Zanthurus indicus.*

*Habitat in Jamaica, Carolina. D. Garden.*

*Similis S. chrysopi, sed oculi argentei. Pinnae dorsalis radii tres primi in setam longam elongati.*

*Dentex*. 20. *S. cauda bifida*, corpore variegato, dentibus quatuor majoribus.

*Art. gen. 36. syn. 60. Sparus varius, dorso acuto, dentibus 4 majoribus.*

D. 90. P. -- V. -- A. 10. C. --

*Gron. zooph. 214. Cynædus cauda lunata, dente secundo utriusque maxillæ maximo.*

B. 6. D.  $\frac{1}{2}\frac{2}{8}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{11}$ . C. 15.

*Will. pisc. t. X. 7. f. 6.*

*Raj. pisc. 132. Dentex f.*

*Cynodon.*

*Habitat in M. infero & supero, Cap. b. Spei.*

*Spinus*. 21. *S. cauda bifida*, spina dorsali recumbente. *Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 74. \**

D.  $\frac{1}{2}\frac{3}{8}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{5}$ . A.  $\frac{7}{18}$ . C. 16.

*Læfl. epist. msc. An idem? D.  $\frac{1}{2}\frac{2}{4}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{14}$ . C. 17.*

Gg 4

Osb.



*Osb. iter.* 273. Sparus javanensis.

$D. \frac{1}{2} \frac{3}{4}. P. 15. V. \frac{2}{5}. A. \frac{7}{15}. C. 18.$

*Habitat in* Indiis.

*Corpus lituris cæruleis repandis variis pictum.*

radiatus, 22. S. cauda integra linea laterali stigmatibus trifidis bifidis.

$B. 6. D. \frac{1}{2} \frac{1}{2}. P. 12. V. 6. A. \frac{3}{18}. C. 17.$

*Catesb. car.* 2. p. 12. t. 12.

f. 1. Turdus oculo radiato?

*Habitat in* Carolina. D. Garden. Puddingfisk.

*Corpus dorso viride, lateribus purpureum, ventre rufum. Caput pictum striis cæruleis luteis, viridibus. Superciliares lineæ punctatæ. Labium superius ductile. Dentes conici: primoribus majoribus duobus. Pupilla nigra iride aureo, cæruleo, rubescente. Opercula maculis 2: purpurea & lutea. Pinnæ omnes variegatæ. Cauda rotundata. Linea lateralis dorso parallela, ad finem p. dorsalis declinata, confecta quasi ex squamis linearibus trifidis: ramis bifidis.*

virginicus,

23. S. cauda bifida, fasciis duabus nigris transversis, lineis cæruleis plurimis.

$D. \frac{1}{2} \frac{1}{7}. P. 18. V. \frac{1}{8}. A. \frac{1}{14}. C. 18.$

*Habitat in* America septentrionali. Mus. de Geer.

*Opercula subserrata. Fascia prior ab humeris per oculos ad maxillam inferiorem, altera ab humeris per latera thoracis ad pinnas pectorales. Lineæ cæruleæ plures longitudinales, parallelæ. Caudæ pinna biloba, obtusa.*

Mormyrus,

24. S. cauda bifida, fasciis argenteis nigrisque plurimis.

*Art. gen.* 37. *syn.* 62. Sparus maxilla superiore longiore, lineis utrinque duabus nigris transversis parallelis.

$D. 23. P. 14. V. 6. A. 13. C. --$

*Hasselq. iter.* 335. Sparus Mormyrus.

$D. \frac{1}{2} \frac{1}{4}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{18}. C. 18.$

*Gron. zooph.* 295. Perca dorso monopterygio, capite lævi operculisque diacanthis squamosis.

$D. \frac{1}{2} \frac{2}{3}. P. 13. V. \frac{1}{8}. A. 10. C. 3.$

Seb.

*Seb. mus. 3. t. 27. f. 4. Perca maxilla inferiore longiore.*

*Habitat in M. infero.*

*capistratus.* 25. S. cauda integra, corpore albo-reticulato.  $D. \frac{2}{8}. P. 12. V. \frac{1}{8}. A. \frac{1}{8}. C. 14.$

*Habitat in America. Mus. de Geer.*

*Corpus oblongum, figura Pl. Hippoglossi. Squamæ laxæ ante marginem fascia alba ad angulum rectum inflexa, unde piscis reticulatus. Dentes primores magni 2 superiores, 4 inferiores. Pinna dorsalis longitudine fere dorsi.*

*galilæus.* 26. S. cauda integra, corpore supra virescente, subtus albo. †

*Hasselq. itin. 343. n. 76. Sparus galilæus.*

$B. 5. D. \frac{1}{2}. P. 11. V. 7. A. \frac{3}{5}. C. 20.$

*Habitat in Lacu Genezareth Galilææ. Piscatura prodigiosa Lucæ V. ex hoc pisce.*

166. LABRUS. Caput: Dentes acuti. Labia simplicia.

*Membr. branch. radiis VI. Opercula squamosa.*

*Corpus: Pinnæ dorsalis radii postice ramento filiformi aucti. Pectorales acuminatæ. Linea lateralis recta.*

\* Cauda bifurca.

*Scarus.* 1. L. appendicibus transversis ad caudæ latera. †

*Art. syn. 54. Scarus auctorum.*

*Habitat in Græciæ littoribus, Sicilia tenuis.*

*Sub Tiberio Claudio in deliciis, ruminans; jecinora in Vitellii patina s. clypeo minervæ. Piscis hodie obscurus.*

Gg 5

2. L.



cretensis. 2. L. dentibus 4, virescens, cauda bifurca. Art. gen. 34.

Syn. 57. †

Habitat in Creta & adjacentibus.

Anthias. 3. L. totus rubescens, cauda bifurca. Art. syn. 54. D.  $\frac{1}{1}\frac{2}{9}$ .

Catesb. car. 2. p. 25. t. 25.

Anthea IV. Rondel.

Habitat in Europa, Meridionali & America.

Opercula serrata.

Hepatus. 4. L. maxilla inferiore longiore, cauda bifurca, lineis utrinque transversis nigris.

Art. gen. 35. syn. 53.

D.  $\frac{1}{2}\frac{2}{1}$ . P. 13. V. 6. A. 9. C. -.

Habitat in Mari Mediterraneo.

Pinna dorsalis post radios spinosos, parte superiore, notatur macula nigra. Raj.

griseus. 5. L. cauda subbifida, corpore subgriseo. †

Catesb. car. 2. p. 9. t. 9.

Turdus pinnis branchialibus carens. \*

Habitat in America.

Catesbæus absque pinnis pectoralibus pinxit; an rite?

lunaris. 6. L. pinna caudali medio truncata, dorsali anique linea purpurea, labiis plicatis. D.  $\frac{8}{2}\frac{3}{3}$ . P. 15. V.  $\frac{2}{8}$ . A.  $\frac{2}{1}\frac{3}{3}$ . C. 16.

Gron. mus. 2. n. 180. t. 6.

f. 2. Labrus oblongus, cauda bifurca, capite purpurasciente.

D.  $\frac{8}{2}\frac{2}{2}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{1}\frac{3}{7}$ . C. 14.

Habitat in Indiis.

opercularis. 7. L. cauda bifida, corpore fasciis 10, maculaque operculorum fuscis. Amæn. acad.

cad. 4. p. 248.

D.  $\frac{1}{2}\frac{3}{8}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{1}{4}\frac{5}{8}$ . C. 16.

Habitat in Asia.

Pavo. 8. L. viridi cæruleo sanguineo canoque varius, cauda bifida.

*Art. gen. 34. syn. 55. Labrus pulchre varius, pinnis pectoralibus rotundatis.*

*Hasselq. iter. 344. n. 77.*

*Labrus Pavo.*

*B.6.D.31.P.14.V.6.A. $\frac{3}{4}$ .C.16.*

*Habitat in M. Mediterraneo ad Syriam.*

auritus.

9. *L. cauda bifida, operculis branchiarum pinniformibus.*

*B.6.D. $\frac{1}{2}$ .P.15.V.6.A. $\frac{3}{4}$ .C.17.*

*Catesb. car. 2. p. 8. t. 8. f.*

3. *Perca fluviatilis gibbosa, ventre luteo?*

*Habitat in Americæ septentrionalis aquis dulcibus. D. Garden.*

*Cauda biloba. Irides lutei. Opercula apice membranaceo, elongato, obtuso, nigro.*

falcatus.

10. *L. pinna dorsali analique radiis quinque primis inermibus falcata.*

*D. $\frac{7}{27}$ .P.17.V.5.A. $\frac{3}{4}$ .C.20.*

*Habitat in America. Mus. de Geer.*

*Corpus latitudine Bramæ, argenteum. Radii 5 primi e mollibus dorsalis analisque elongati, sequentibus æqualibus, unde hæ pinne falcatæ. Dentes acuti sunt. Pinne ventrales parvæ.*

rufus.

11. *L. cauda lunata, corpore toto fulvo. Læfl.*

*D.23.P.17.V.6.A.12.C.16.*

*Catesb. car. 2. p. 11. t. 11.*

*Turdus flavus.*

*Habitat in America.*

\* \* *Cauda integra (secundum spinas dorsales enumerati.)*

Hiatula.

12. *L. cauda integra, pinna anali nulla.*

*B.5.D. $\frac{17}{8}$ .P.16.V. $\frac{1}{8}$ .A.0.C.21.*

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Os labio retractili, intus rugoso. Dentes in mandibulis laniarii, in palato orbiculati. Operculum antèrius squamosum margine punctato. Corpus fasciis nigris 6 f. 7. Linea lateralis recta. P. dorsalis fere longitudinalis: anterior radiis spinosis, æqualibus, ramento filiformi; posterior intermis, nigra, rotundata. P. ani omnino nulla. Cauda integra.*



- marginalis. 13. L. subfuscus, margine pin-  
narum dorſi pectoralium-  
que fulvo. *Læſt. it.* 103.  $D. \frac{2}{2} . P. 17 . V. 6 . A. 12 . C. 17 .$   
*Habitat in Pelago.*
- ferrugineus. 14. L. ferrugineus immaculatus,  
cauda integra.  $D. \frac{2}{2} . P. 16 . V. \frac{1}{6} . A. 17 . C. 17 .$   
*Habitat in India.*
- Julis. 15. L. lateribus cæruleſcenti-  
bus: vitta longitudinali ful-  
va utrinque dentata. *Muf.*  
*Ad. Fr.* 2. p. 75 \*  $D. \frac{2}{2} . P. 13 . V. \frac{1}{6} . A. 13 . C. 12 .$   
*Art. gen.* 34. *ſyn.* 53. La-  
brus palmaris varius, den-  
tibus 2 majoribus maxillæ  
ſuperioris.  $D. 21 . P. 14 . V. 6 . A. 14 . C. - -$   
*Gron. muſ.* 2. n. 184. La-  
brus oblongus nigricans,  
lateribus linea alba utrinque  
ſinuata varius, cauda indi-  
viſa.  $D. \frac{2}{2} . P. 13 . V. \frac{1}{6} . A. 13 . C. 16 .$   
*Habitat Genuæ.*  
*Formoſiſſimus piſcis Europæorum ob colores varios.*
- paroticus. 16. L. cauda integra, linea la-  
terali curva, pinnis ruſis,  
operculis cyaneis. *Muf.*  
*Ad. Fr.* 2. p. 76. \*  $D. \frac{2}{2} . P. 12 . V. 6 . A. 14 . C. 14 .$   
*Habitat in India.*
- ſuillus. 17. L. pinna dorſali ramenta-  
cea, macula nigra ſupra  
caudam, ſpinis dorſalibus  
novem. *Fn. ſvec.* 330.  
*It. wgoth.* 179. Sparus Berg-  
ſnyltra.  $D. \frac{2}{2} . P. 13 . V. \frac{1}{6} . A. 13 . C. 14 .$   
*Habitat in Oceano Europæo.*
- friatus. 18. L. pinna dorſali ramentacea  
lineis albis fuſciſque. *Muf.*  
*Ad. Fr.* 2. p. 77. \*  $D. \frac{1}{2} . P. 17 . V. \frac{1}{6} . A. 17 . C. 12 .$   
*Habitat in America.*

Gvaza. 19. *L. fuscus*, cauda rotunda-  
ta, radiis membranam su-  
perantibus. *Læfl. it.* 104.  $D.\frac{1}{2}\frac{1}{4}.P.16.V.6.A.13.C.15.$   
*Habitat in Pelago.*

ocellaris. 20. *L. pinna dorsali ramenta-*  
*cea, ocello in medio ad*  
*basin caudæ. Mus. Ad. Fr.*  
*2. p. 78. \**  $D.\frac{1}{2}\frac{1}{4}.P.15.V.\frac{1}{2}.A.\frac{3}{2}.C.13.$   
*Habitat - - - -*

Tinca. 21. *L. rostro sursum reflexo,*  
*cauda in extremo circulari.*  
*Art. gen. 33. syn. 56.*  $D.\frac{1}{2}\frac{1}{2}.P.14.V.6.A.\frac{3}{2}.C.-$   
*Habitat in M. Britannico.*

bimacula- 22. *L. pinna dorsali ramenta-*  
*tus. cea, macula fusca in late-*  
*re medio & ad caudam.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 66. Sciæ-*  
*na macula fusca in medio*  
*corporis & supra basin*  
*caudæ.*  $D.\frac{1}{2}\frac{1}{2}.P.15.V.\frac{1}{2}.A.\frac{1}{2}.C.-$   
*Habitat in M. Mediterraneo.*

puncta- 23. *L. pinna dorsali ramenta-*  
*tus. cea, lineis parallelis fusco-*  
*punctatis.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 66. Sciæ-*  
*na lineis longitudinalibus*  
*plurimis fusco-punctatis.*  $D.\frac{1}{2}\frac{1}{4}.P.14.V.\frac{1}{2}.A.\frac{3}{2}.C.16.$   
*Gron. mus. 1. n. 87. La-*  
*brus brunneus, osficulo se-*  
*cundo p. ventralium seti-*  
*formi.*  $D.\frac{1}{2}\frac{1}{5}.P.15.V.\frac{1}{2}.A.\frac{1}{2}.C.18.$   
*Habitat Surinami.*

Melops. 24. *L. pinna dorsali ramenta-*  
*cea anique variegata, lunu-*  
*la fusca pone oculos. Mus.*  
*Ad. Fr. 2. p. 78. \**  $D.\frac{1}{2}\frac{1}{3}.P.13.V.\frac{1}{2}.A.\frac{3}{2}.C.11.$   
*Habitat in Europa australi.*

niloticus. 25. *L. cauda integra, pinnis*  
*dorsali ani caudæque ne-*



bulatis. *Mus. Ad. Fr.* 2.

*p.* 79. \*

$D. \frac{17}{36}. P. 14. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{12}. C. 17.$

*Hasselt. iter.* 346. n. 78. La-

brus niloticus.

$D. \frac{17}{36}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{12}. C. 20.$

*Habitat in Ægypto.*

offifagus. 26. L. labiis plicatis, pinna dor-  
sali radiis 30.

$D. \frac{17}{31}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{15}. C. 13.$

*Habitat in Europa.*

rupestris. 27. L. pinna dorsi ramentacea  
antice macula fusca.

*Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 65. Sciæ-

na margine superiore cau-

dæ macula fusca notato.

$D. \frac{17}{28}. P. 14. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{16}. C. 13.$

*Ström. fönadm.* 291. Carudse.  $D. \frac{17}{28}. P. 13. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{14}. C. -$

*Habitat in M. Norvegico ad littora.*

Onitis. 28. L. pinna dorsali ramenta-  
cea, abdomine cinereo fu-  
scoque maculato. *Mus. Ad.*

*Fr.* 2. *p.* 79. \*

$D. \frac{17}{27}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{11}. C. 14.$

*Habitat* - - - -

viridis. 29. L. viridis: linea utrinque  
cærulea. *Art. gen.* 34.

$D. \frac{18}{36}.$

*Habitat in M. Mediterraneo.*

luscus. 30. L. cauda integra pinnis o-  
mnibus flavis, palpebra su-  
periore nigra. *Mus. Ad.*

*Fr.* 2. *p.* 80. \*

$D. \frac{18}{31}. P. 14. V. 6. A. \frac{3}{14}. C. 14.$

*Habitat* - - - -

livens. 31. L. cauda rotundata, pinna  
dorsi ramentacea, corpore  
fusco-livido. *Mus. Ad. Fr.*

2. *p.* 80. \*

$D. \frac{18}{36}. P. 14. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{12}. C. 11.$

*Habitat* - - - -

Turdus. 32. L. oblongus viridis, iride  
aurea. *Art. gen.* 34. *syn.*

57.

$D. \frac{19}{33}.$

*Habitat in M. Europæo.*

- exoletus. 33. L. pinna dorsali ramentacea, corpore lineis cæruleis, pinna ani spinis 5. *Fn. fuec.* 331.  $D. \frac{1}{2} \frac{7}{5}. P. 13. V. \frac{1}{8}. A. 1 \frac{1}{2}. C. 18.$   
*Ström. söndm.* 267. n. 3.  
*Habitat in Oceano Atlantico.*
- chinenfis. 34. L. pinna dorsali ramentacea, corpore livido, vertice retuso.  $D. \frac{1}{2} \frac{2}{4}. P. 13. V. \frac{1}{8}. A. 1 \frac{1}{2}. C. 12.$   
*Habitat in Asia.*
- Cromis. 35. L. cauda integra, pinnis dorsalibus subunitis, analis radio secundo validissimo.  $D. 10 - \frac{1}{2} \frac{1}{2}. P. 18. V. 6. A. 2. C. 19.$   
*Brown. jam.* 449. Cromis subargenteus oblongus, radiis anterioribus dorsalis ægre pungentibus.  
*Raj. pisc.* 96. Coracinus brasiliensis.  
*Marcgr. bras.* 177. Guatucupa.  
*Habitat in Carolina.* D. Garden. Drum.  
 Corpus statura *Perce fluviatilis*, fasciis fuscis. Opercula non serrata, uno dente. Pinne dorsales parum connexæ. P. analis radius 1 rigidus brevissimus; 2 magnus crassissimus compressus.
- linearis. 36. L. oblongus, pinnæ dorsalis radio ultimo inermi.  $D. \frac{2}{2} \frac{0}{1}. P. 12. V. \frac{2}{8}. A. 15. C. 12.$   
*Amæn. acad.* 1. p. 315.  
*Habitat in Indiis.*
- \* \* \* Cauda integra (spinis dorsalibus adhuc ignotis.)
- mixtus. 37. L. e flavo cæruleoque varius, dentibus anterioribus majoribus. *Art. gen.* 34.  
*syn.* 57.  
*Habitat Liburni.*  
*Artedi dubitat an differat a L. Pavone.*
- fulvus. 38. L. cauda integra, corpore fulvo.



*Catesb. car. 2. p. 10. t. 10. f.*

2. *Turdus cauda convexa.*

*Habitat in America.*

varius. 39. *L. e purpureo viride cæruleo nigroque varius. Art. gen. 35. syn. 55.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

Merula. 40. *L. cæruleo-nigricans. Art. syn. 55.*  
*Habitat in Europa.*

Cynæ- 41. *L. luteus, dorso purpureo, dus. pinna a capite ad caudam continuata. Art. syn. 56.*  
*Habitat in Mari Mediterraneo.*

167. SCIÆNA. *Caput. - - -*

*Membr. branch. radiis VI. Opercu- la squamosa & totum caput.*

*Corpus: Fossula dorsi pro pinna dorfali recondenda.*

Cappa. 1. *S. capitis lateribus squamarum ordine duplici. Mus. Ad. Fr. 2. p. 81. \** *D.  $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 17.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

Lepisma. 2. *S. pinna dorfali intra 2 folia squamea recondenda. D.  $\frac{1}{12}$ . P. 11. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 13.*  
*Habitat - - -*

unimacu- 3. *S. macula fusca in medio u- lata. triusque lateris. D.  $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 17.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

Umbra. 4. *S. nigro varia, pinnis ventralibus integerrimis. Art. gen. 39. syn. 65. Mus. Ad. Fr. 2. p. 81. \** *D. 11. 24. P. 17. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. . .*  
*Hasselq.*

*Hasselq. iter. 352. n. 80.*

*Sciæna umbra.*

*D. 10. 26. P. 18. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. 18.*

*Habitat in M. Mediterraneo & infero.*

*cirrofa.* 5. S. maxilla superiore longiore, inferiore cirro unico.

*Art. gen. 38. syn. 65.*

*D.  $\frac{2}{3}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{1}{8}$ . C. --*

*Gron. mus. 1. n. 92?*

*Habitat in M. Mediterraneo & infero.*

168. PERCA. Caput : Opercula squamosa, ferrata.  
Membr. branch. radiis VII.  
Corpus pinnis spinosis.

\* *Pinnis dorsalibus 2 distinctis.*

*fluviatilis.* 1. P. pinnis dorsalibus distinctis : secunda radiis XVI. *Fn. svec. 332.*

*Art. gen. 39. syn. 66. spec. 74.*

*Perca lineis utrinque sex nigris, pinnis ventralibus rubris.*

*D. 14, 16. P. 14. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{12}$ . C. 17.*

*Gron. mus. 1. n. 96. Idem nomen.*

*D. 14, 14. P. 13. V. 6. A. 11. C. 17.*

*Habitat in Europæ Lacubus imprimis, Ovarium unicum. Piscatur in determinato profundo; cibo salutaris cum Petroselino laudatur.*

*Macula nigra ad finem p. dorsalis prioris.*

*Lucioperca* 2. P. pinnis dorsalibus distinctis : secunda radiis XXIII. *Fn. svec. 334.*

*Art. gen. 39. syn. 67. spec. 76.*

*Perca pallide maculosa, duobus dentibus maxillaribus utrinque majoribus.*

*D. 14,  $\frac{2}{3}$ . P. 16. V. 6. A. 14. C. 17.*

*Habitat in Europæ Lacubus.*

H h

3. P.

*Percæ genus difficile distinguitur a tribus præcedentibus, quoniam differt solis operculis dentato-ferratis.*



- Asper. 3. *P. pinnis dorsalibus distinctis, secundæ radiis XIII. D. 14, 20. P. 14. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{1}{13}$ . C. 17.*  
*Art. gen. 40. syn. 67. Perca lineis utrinque 8. s. 9. transversis nigris. D. 8, 13. P. 14. V. 5. A. 12. C. —*  
*Habitat in Europa australiore.*

- Zingel. *Gron. Zooph. 303. Perca dorso dipterygio, capite plagioplateo squamoso, maxilla inferiore multo brevior.* *D. 13,  $\frac{1}{8}$ . P. 14. V.  $\frac{2}{8}$ . A. 13. C. 17.*  
*Schæff. ratisb. 58. t. 3. f. 1. Zingel. D. 14, 20. P. 14. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{13}$ . C. 17.*  
*Kram. austr. 386. Zingel. D. 13,  $\frac{1}{20}$ . P. 12. V. 5.*  
*Habitat in Danubio aliisque Germaniæ. Antecedenti nimis affinis.*

- punctatus. 4. *P. pinnis dorsalibus subdistinctis, corpore lineato punctis nigris, cauda integra. B. 7. D. 11,  $\frac{1}{23}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{12}$ . C. 19.*  
*Habitat in Carolina. D. Garden. Yellowtaill. Caput argenteum. Corpus lineis plurimis e punctis nigris.*

- Labrax. 5. *P. pinnis dorsalibus distinctis, secundæ radiis XIV. Mus. Ad. Fr. 2. p. 82. \* Gron. Act. upf. 1750. p. 39. t. 4. D. 9,  $\frac{1}{14}$ . P. 19. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{14}$ . C. 18.*  
*Art. gen. 41. syn. 69. Perca radiis pinnæ dorsalis secundæ 13, ani 14. D. 9, 13. P. 15. V. 6. A.  $\frac{3}{14}$ . C. —*  
*Habitat in Europa australiore. Hic, Muræna Helena, Myxo in Tripatino; Romæ optimus inter duos pontes. Pretio proximus Acipenser.*

- Alburnus. 6. *P. pinnis dorsalibus distinctis muticis, branchiostega triradiata, cauda integra. B. 3. D.  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{24}$ . P. 22. V.  $\frac{2}{8}$ . A.  $\frac{1}{8}$ . C. 19.*  
*Catesb. car. 2. p. 12. t. 12. f. 2. Alburnus americanus. Habitat in Carolina. D. Garden. Whiting.*

Corpus oblongum fasciis fuscis, obliquis, plurimis. Os denticulatum ut in Percis. Opercula subserrata. P. dorsalis prior radio 1. spinoso brevissimo, reliquis rigidis.

nilotica. 7. P. pinnis dorsalibus subdistinctis, caudali integra.

*Mus. Ad. Fr. 2. p. 83. \* D. 8,  $\frac{1}{3}$ . P. 14. V. 6. A.  $\frac{3}{1\frac{1}{2}}$ . C. 15.*

*Hasselq. iter. 359. n. 83.*

Perca nilotica. D. 8,  $\frac{1}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{1\frac{1}{2}}$ . C. 20.

*Habitat in Nilo. Hasselquist.*

\* \* Dorso monopterygio, cauda indivisa.

undulata. 8. P. pinnis dorsalibus subunitis, corpore fusco-undulato, macula fusca ad pinna pectorales. B. 6. D. 10,  $\frac{1}{2}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{1\frac{1}{2}}$ . C. 19.

*Catesb. car. 2. p. 3. t. 3. f. 1.*

Perca marina pinna dorsifidivisa.

*Habitat in Carolina. D. Garden. Croker.*

Opercula anteriora Dentibus 5 brevibus. Cauda integra.

marina. 9. P. pinnis dorsalibus unitis; radiis XV. spinosis, XIV. muticis, corpore lituris variegato. *Mus. Ad. Fr. 2.*

*p. 83. \* Fn. svec. 233. D.  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{5}{9}$ . P. 19. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{1\frac{1}{2}}$ . C. 14.*

*Art. gen. 40. syn. 68. Perca*

lineis utrinque 7 transversis nigris, ductibus

miniaceis cæruleisque in

capite & antica ventris. D.  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ . P. — V. — A.  $\frac{3}{1\frac{1}{2}}$ . —

*Habitat in Norvegia, Italia.*

ocellata. 10. P. pinnis dorsalibus subunitis, oculo ad pinnæ caudæ basin. B. 7. D. 10,  $\frac{1}{2}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{1}{1\frac{1}{2}}$ . C. 16

*Habitat in Carolina. D. Garden. Bass.*

Pinnæ dorsalis primus radius brevissimus. Ventralium radius 1 brevior, simplex, muticus. Ocellus niger iride alba ad apicem caudæ superiorem ante ejus pinnam. Cauda integra.



- nobilis. 11. *P. pinnis dorsalibus unitis, cauda integra, corpore argenteo fasciis octo fuscis.* *D.*  $\frac{1}{2}\frac{2}{5}$ . *P.* 15. *V.*  $\frac{1}{8}$ . *A.*  $\frac{3}{16}$ . *C.* 17. *Seb. mus. 3. t. 25. f. 12.* *Chætodon macrolepidotus albescens, lineis utrinque 8 transversis nigris.* *D.*  $\frac{1}{3}\frac{1}{5}$ . *P.* — *V.* — *A.*  $\frac{3}{20}$ . *C.* — *Habitat in America septentrionali. Mus. De Geer.* *Radii spinosi dorsales lateribus argentei sunt.*
- polymna. 12. *P. pinnis dorsalibus unitis, corpore nigro : fasciis 3 albis.* *Mus. acad.* *D.*  $\frac{1}{2}\frac{1}{8}$ . *P.* 18. *V.*  $\frac{1}{8}$ . *A.*  $\frac{1}{16}$ . *C.* 16. *Gron. mus. 190.* *Perca dorso monopterygio, cauda subrotunda corpore fasciis transversis albis.* *D.*  $\frac{1}{2}\frac{1}{8}$ . *P.* 18. *V.*  $\frac{1}{8}$ . *A.*  $\frac{3}{11}$ . *C.* 17. *Seb. mus. 3. t. 26. f. 20-24.* *Chætodon lineis 2 candidis.* *D.*  $\frac{1}{2}\frac{1}{5}$ . *P.* 19. *V.* 6. *A.*  $\frac{2}{16}$ . *C.* — *Habitat in Indiis.* *Conjungit hæc Percas, Labros, Sparos, Chætodontes, sed operculis spinosis ad Percam refert. P. dorsales unitæ. Fascia media excurrit per P. dorsalem posticam.*
- cottoides. 13. *P. pinnis dorsalibus unitis, cauda indivisa, pinnis omnibus lineis duabus punctatis.* *Mus. Ad. Fr. 2. p. 84.* *D.*  $\frac{1}{2}\frac{4}{5}$ . *P.* 14. *V.*  $\frac{7}{5}$ . *A.*  $\frac{3}{16}$ . *C.* 12. *Habitat in India.*
- philadel-  
phica. 14. *P. pinnis dorsalibus unitis, macula nigra in medio, squamis operculis ciliatis.* *B.*  $\frac{1}{7}$ . *D.*  $\frac{1}{2}\frac{0}{1}$ . *P.* 16. *V.*  $\frac{1}{8}$ . *A.*  $\frac{3}{16}$ . *C.* 11. *Habitat in America septentrionali. D. Garden. Chub.* *Corpus nigro maculatum fasciis quibusdam nigris; subtus rubrum. Squamæ ciliatæ. Opercula ciliata : postice mucronata. P. dorsalis, ubi connexa humiliorque, Macula nigra. Radii dorsales 1 ♂ 2 breviores.*
- palpebro-  
sa. 15. *P. pinnis dorsalibus unitis, palpebris macula fusca, li-*

nea laterali curva, cauda  
integra.

D.  $\frac{1}{3}$   $\frac{2}{3}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{11}$ . C. 17.

*Habitat in America.*

*Parvus. Macula palpebræ superioris fusca.*

- atraria. 16. P. pinnis dorsalibus unitis  
corpore nigro, pinnis al-  
bido maculatis. B. 7. D. 8. 33. P. 20. V. 7. A. 26. C. 20.  
*Habitat in Carolina. D. Garden. Blackfisk.*  
Corpus nigrum. Linea lateralis recta. Opercula anti-  
ce denticulata, postice ciliata. P. dorsalis albido linea-  
ta. Cauda integra.

- chryso- 17. P. pinnis dorsalibus unitis,  
ptera. pinnis inferioribus flavis  
fusco maculatis, cauda in-  
tegra.  
*Catesb. car. 2. p. 2. t. 2. f. 1.*  
Perca marina gibbosa.  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*  
Pinnæ ventrales, analis caudalisque flavæ maculis fuscis  
sparsis. Linea lateralis recta. Opercula obsoletissi-  
me dentata.

- mediter- 18. P. pinnis dorsalibus unitis,  
ranea. reliquis fulvis, macula ni-  
gra ad pectorales. *Mus.*  
*Ad. Fr. 2. p. 85. \** D.  $\frac{1}{2}$   $\frac{5}{5}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{13}$ . C. 13.  
*Habitat in America.*

- vittata. 19. P. pinnis dorsalibus unitis,  
lineis 5 albis fuscisque.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 85. \** D.  $\frac{1}{1}$   $\frac{2}{8}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{3}$ . A.  $\frac{2}{13}$ . C. 13.  
*Habitat in America.*

- punctata. 20. P. pinnis dorsalibus unitis,  
cauda integra, corpore  
cæruleo punctato.  
*Catesb. car. 2. p. 7. t. 7. f. 1.*  
Perca marina punctata.  
*Habitat in America.*

- guttata. 21. P. pinnis dorsalibus unitis,  
cauda integra, corpore  
punctis sanguineis adspersis.  
fo. † H h 3



*Marcgr. bras. 169. Cugupugvacu.*

*Sloan. jam. 2. p. 280. t. 247. f. 2.*

*Will. icht. 303. t. 1.*

*Raj. pisc. 127.*

*Catesb. car. 2. p. 14. t. 14.*

*Habitat in America.*

*Scriba. 22. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda integra, pinnis caudæ pectoralibusque flavis, capite scripto. Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 86. \**

*D.  $\frac{1}{2}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{10}$ . C. 15.*

*Habitat - - -*

*\* \* \* Dorso monopterygio, cauda bifida.*

*venenosa. 23. P. pinnis dorsalibus unitis, pectoralibus apice flavis, cauda lunata, corpore punctis sanguineis. †*

*Catesb. car. 2. p. 5. t. 5.*

*Perca marina venenosa punctata.*

*Habitat in America.*

*melanura. 24. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifida nigra margine albo, corpore lineis luteis. †*

*Catesb. car. 2. p. 7. t. 7. f.*

*2. Perca marina cauda nigra.*

*Habitat in America.*

*saltatrix. 25. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifurca postice rubra, abdomine luteo griseo-lineato. †*

*Catesb. car. 2. p. 8. t. 8. f.*

*2. Perca marina saltatrix.*

*Habitat in America.*

- stigma. 26. *P. pinna dorsali ramentacea, operculis inuistis.*  
*Mus. acad.* D.  $\frac{18}{27}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. 17.  
*Habitat in India.*
- diagramma. 27. *P. pinnis dorsalibus unitis, corpore lineis luteis.*  
*Gron. mus. 1. n. 88. ♀ 187.*  
*Sparus lineis longitudinalibus luteis varius, aculeis XI. in pinna dorsi.* D.  $\frac{11}{28}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{1}{11}$ . C. 18.  
*Seb. mus. 3. t. 27. f. 18.*  
*Habitat - - -*
- striata. 28. *P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifida, corpore striato.*  
D.  $\frac{13}{28}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{11}$ . C. 17.  
*Habitat in America septentrionali. Mus. de Geer.*  
*Opercula subserrata. Radius secundus analis validissimus. Cauda nigra non est, qua differt a P. Melanura.*
- lineata. 29. *P. pinna dorsali ramentacea, corpore lineis 5 albis fuscisque.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 66. Sciæna fasciis 5 longitudinalibus albis fuscisque alternis.*  
D.  $\frac{17}{32}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{1}{10}$ . C. 16.  
*Habitat - - -*
- Cernua. 30. *P. pinnis dorsalibus unitis radiis 27, spinis 15, cauda bifida. Fn. suec. 335.*  
*Art. gen. 40. syn. 68. spec. 77.*  
*Perca dorso monopterygio, capite cavernoso.*  
*Gron. mus. 1. n. 94. Idem.*  
*Kram. austr. 386. Idem.*  
*Schæff. ratisb. 37. t. 2. f. 1.*  
*Cernua.*  
*Habitat in Europæ Lacubus.*  
D.  $\frac{15}{28}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. —  
D.  $\frac{15}{28}$ . P. — V. 6. A.  $\frac{2}{9}$ . C. 16.  
D.  $\frac{15}{28}$ . P. 12. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. —  
D.  $\frac{15}{28}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. 17.
- Schræter. 31. *P. pinnis dorsalibus unitis, lineis corporis nigris.*  
H h 4  
Art.



*Art. gen. 40. syn. 68. Perca*  
dorso monopterygio, li-  
neis utrinque longitudina-  
libus nigris.

$D. \frac{1}{3} \frac{8}{8}. P. 16. V. 6. A. \frac{2}{8}. C. —$

*Gron. zooph. 289. Perca dor-*  
so monopterygio, capite  
cavernoso alepidoto acu-  
leato, cauda sublunata,  
corpore lineari.

$D. \frac{1}{2} \frac{8}{8}. P. — V. — A. 8. C. —$

*Kram. austr. 387. n. 5.*

$D. \frac{1}{3} \frac{8}{8}. P. 14. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{7}. C. 188$

*Schæff. ratisb. 48. t. 2. f. 2.*

Schraitser.

$D. \frac{1}{3} \frac{8}{2}. P. 15. V. \frac{1}{8}. A. \frac{2}{9}. C. 177$

*Habitat in Europa australi.*

argentea. 32. *P. pinnis dorsalibus unitis,*  
cauda bifida, naribus tu-  
bulosis. *Mus. Ad. Fr. 2.*  
p. 86. \*

$D. \frac{1}{2} \frac{2}{2}. P. 12. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{11}. C. 177$

*Habitat in America.*

*Macula nigra in pinna dorsali spinosa.*

Cabrilla. 33. *P. pinnis dorsalibus unitis,*  
cauda bifida, fasciis lon-  
gitudinalibus 4 sanguineis.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 87. \**

$D. \frac{1}{2} \frac{0}{4}. P. 16. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{10}. C. 177$

*β. Mus. Ad. Fr. 2. p. — Per-*  
ca lituris flavis violaceis-  
que variegata.

$D. \frac{1}{2} \frac{0}{4}. P. 14. V. 6. A. \frac{3}{10}. C. 165$

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Radula. 34. *P. pinnis dorsalibus unitis,*  
cauda bifida, corpore pun-  
ctis albis lineato.

*Amæn. acad. 1. p. 313. La-*  
brus immaculatus, pinnæ  
dorsalis radiis 10 spinosis.

$D. \frac{1}{2} \frac{1}{0}. P. 12. V. 6. A. \frac{3}{13}. C. 17.$

*Habitat in India.*

*Squam. crenulatae.*

formosa. 35. *P. pinnis dorsalibus unitis,*  
cauda lunata, capite lineis  
cæruleis.

$B. 4. D. \frac{1}{2} \frac{0}{3}. P. 16. V. \frac{1}{8}. A. \frac{3}{10}. C. 19$

*Catesb. car. 2. p. 6. t. 6. f.*

1. *Perca marina, capite*  
striato.

*Habitat in Carolina. D. Garden. Squirrelfisk.*

*Caput lineis liturisque cæruleis. Opercula denticulata.*

*P. dorsalis anterior abbreviata versus posteriorem.*

trifurca. 36 P. pinnis dorsalibus unitis,

cauda trifida.

D.  $\frac{11}{2}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 20.

*Habitat in Carolinæ mari. D. Garden.*

*Caput pulchre variegatum. Faux lutea. Opercula.*

*subtilissime denticulata. Corpus fasciis 7 cæruleis.*

*P. dorsalis radius 3 & 4 spinosus est auclus ramento  
setaceo longitudine ipsius spinæ.*

## 169. GASTEROSTEUS. Caput - - -

*Membr. branch. radiis III.*

*Arted.*

*Corpus ad caudam utrinque  
carinatum. Aculei distincti ante pin-  
nam dorsi. Pinnae  
ventrales pone pectora-  
les, sed supra sternum.*

aculeatus 1. G. spinis dorsalibus tribus.

*Art. gen. 52. syn. 80. spec.*

26. *Fn. svec. 336.*

D. 3, 12. P. 10. V.  $\frac{1}{2}$ . A.  $\frac{1}{9}$ . C. 12.

*Habitat in Europa.*

Ductor. 2. G. spinis dorsalibus qua-  
tuor. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*

88. \*

B. 7. D. 4, 27. P. 18. V. 6. A. 16. C. 19.

*Hasselq. itin. 336. Scomber*

*Ductor.*

D.  $\frac{4}{8}$ . P. 20. V. 5. A. 16. C. 16.

*Osbeck. iter 73. t. 12. f. 2.*

*Scomber Ductor.*

D.  $\frac{3}{8}$ . P. 19. V. 5. A. 16. C. 26.

- - *Act. stockhol. 1755. p. 71.*

*Idem.*

*Læfl. it. 103. Scomber fa-  
sciis quatuor cæruleo-  
argenteis, aculeis 4 ante  
pinnam dorsalem.*

D. 4, 27. P. 19. V. 6. A.  $\frac{2}{17}$ . C. - -

H h 5

Gron.



*Gron. zooph.* 309. *Scomber* dorso monopterygio, pin-  
nulis nullis; linea laterali  
recta mutica ad caudam di-  
latata.

*D.* 3, 27. *P.* 20. *V.*  $\frac{2}{3}$ . *A.* 17. *C.* --

*Raj. pisc.* 156. Pilote piscis.

*Brunn. it.* 325. *t.* 190. Loots  
mannekens.

*Habitat in Pelago, Satelles Squali, eique viam præten-  
tans.*

*Medius quasi inter Gasterosteos & Sombros; at con-  
venit cum illis spinis ante pinnam dorsalem distin-  
ctis & cum G. Pungitio caudæ lateribus carinatis,  
quamvis differat a Gasterosteis Membrana branchio-  
stega.*

occiden- 3. *G.* spinis dorsalibus septem,  
talis. spinisque duabus ante pin-  
nam analem.

*D.* 7, 11. *P.* 7. *V.* 6. *A.* 2,  $\frac{1}{7}$ . *C.* 16.

*Brown. jam.* 452. *t.* 46. *f.* 2.

Saurus argenteus, cauda  
longitudinaliter striata,  
striis prominentibus bre-  
vibus interrupta.

*Habitat in America. Mus. de Geer.*

ovatus. 4. *G.* spinis dorsalibus septem:  
prima recumbente, corpo-  
re ovato.

*B.* 6. *D.* 7, 20. *P.* 16. *V.* 6. *A.* 2,  $\frac{1}{7}$ . *C.* 20,

*Habitat in Asia.*

*Pisciculus ovato-oblongus, compressus, figura Chæto-  
dontis. Maxillæ, & labiorum dentes scabri. Spinæ  
in dorso 7 ante pinnam dorsalem, sed distinctæ & al-  
ternatim ad latera directæ; harum prima minima, 2da  
paulo longior. Spinæ 2 validæ ante pinnam ani. Dif-  
fert a Gasterosteis reliquis membr. branch. radiis 6,  
nec 3; caret scutello thoracis osseo, an itaque Labris  
annumerandus vel Gasterosteis? Spina prima dor-  
si antrorsum recumbens fixa, uti in Scombris quibus-  
dam.*

carolinus. 5. *G.* spinis dorsalibus octo,  
analibus tribus.

*D.* 8-26. *C.* 18. *V.* 5. *A.*  $\frac{3}{27}$ . *C.* 27.

*Habitat in Carolina. De Garden. Crevalle.*

Corpus oblongo-ovatum. Linea lateralis recta, ad cau-  
dam

*dam subcarinata. Pinna dorsalis analisque falcatae.*  
*Cauda bifurca.*

canadus. 6. G. spinis dorsalibus octo,  
 analibus nullis. B.7.D.8.33.P.2.V.7.A.26.C.20.  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*  
*Corpus oblongum. Pinna dorsalis posterior analisque fal-*  
*catae. Cauda subbiloba. Spinæ pinnam dorsalem*  
*priorem mentientes 7. f. 8.*

Saltatrix. 7. G. spinis dorsalibus octo  
 membrana connexis. B.7.D.8.26.P.16.V. $\frac{1}{8}$ .A.27.C.21.  
*Catesb. car. 2. p. 14. t. 14.*  
 Saltatrix.

*Habitat in Carolina. D. Garden. Schipjach.*  
*Corpus Percæ. Maxilla inferior dentium ordine uni-*  
*co; superior binis. Cauda bifurca. Pinnæ dorsalis*  
*prioris radii membrana tenuissima intertexti, qui in re-*  
*liquis speciebus separati; hæc species minus spinosa,*  
*præter radios dorsales, qui itidem debiles, in fossula*  
*recondendos.*

Pungitius. 8. G. spinis dorsalibus decem.  
*Art. gen. 52. syn. 80. spec.*  
*97. Fn. svec. 337. D. 10, 11. P. 10. V. 1. A. 11. C. --*  
*Habitat in Europa.*

volitans. 9. G. spinis dorsalibus tredecim,  
 cirris senis, pinnis  
 pectoralibus corpore  
 longioribus.

*Gron. mus. 2. n. 191. Perca*  
*dorso monopterygio, ca-*  
*pite cavernoso, maxilla*  
*superiore cirris 4, cauda*  
*subrotunda utrinque a-*  
*culeata.*

B. 7. D. 13. 12. P. 14. V. 6. A.  $\frac{1}{9}$ , C. 13.

*Will. icht. app. 1. t. 2. n. 3.*  
*Perca amboinensis nie-*  
*hoffi.*

*Seb. mus. 3. t. 28. f. 1. Cortus*  
*squamosus, rostro bifido.*

*Ruysch. thes. 1. p. 39. t. 2.*  
*f. 3.*

*Valent. amb. t. 210. n. 210.*

*Et t. 213. n. 213.*



*Habitat in Amboina*

*Radii dorsales 13. priores basi tantum membrana connexi sunt, & spinosi. P. pectorales corpore longiores volantes. Cauda supra & infra aculeis 3 minimis.*

Spina-  
chia.

10. G. spinis dorsalibus quindecim. *Art. gen. 52. syn.*

81. *Fn. svec. 338.*

D.15,6.P.10.V.0.A.7.C.12.

*Habitat in Europa australiore.*

Spinarel-  
la.

11. G. capitis postico spinis quaternis ferrulatis lateralibus longitudine abdominis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 74. t. 32.*

f. 5. *Pungitius pusillus.*

D.15.P.20.V.4.A.8.C.---

*Habitat in India.*

170. SCOMBER. *Caput compressum, læve.*

*Membr. branch. radiis VII.*

*Corpus læve linea laterali postice carinatum. Pinnæ spuriae sæpius versus caudam.*

\* *Pinnulis spuriiis distinctis.*

Scomber 1. S. pinnulis V. *Fn. svec. 339.*

*Art. gen. 30. syn. 48. spec.*

68. Scomber pinnulis 5 in extremo dorso, spina brevi ad anum.

D.12,12.P.20.V.6.A.13.C.---

*Gron. mus. 1. n. 81. Idem. D.11,11.P.18.V.6.A.12.C.---*

*Habitat in Oceano Atlantico victitans Medusis, ut congeneres.*

*Lucet in tenebris.*

Pelamis. 2. S. pinnulis inferioribus VII,

corpore lineis utrinque qua-

tuor nigris *Læfl. it. 102. D.15,11.P.27.V.6.A.14.C.---*

*Osbeck. iter. 67. Scomber*

pulcher s. Bonet.

D.15,10.P.28.V.7.A.14.C.26.

*Habitat in Pelago inter Tropicos.*

Thynnus 3. S. pinnulis utrinque VIII.

*Osbeck. iter* 69. Scomber.

albicans f. Albecor. D. 14, 12. P. 32. V. 6. A. 13. C. 30.

*Art. gen.* 31. *syn.* 49. Scom-

ber pinnulis 8. f. 9. in ex-

tremo dorso, sulco ad

pinnas ventrales.

D. 14, 14. P. 34. V. 6. A. 13. C. --

*Læst. epist.* Scomber pinnu-

lis 9, pinna dorsi priori

plicata, dentibus planis

lanceolatis, maxilla supe-

riore acuta.

D. 14, 13. P. 22. V. 6. A. 16. C. --

*Gron. zooph.* 305. Scomber

pinnulis utrinque 9, dorso

dipterygio, spina duplici

ad anum.

D. 6. P. -- V. -- A. 11. C. --

*Will. pisc. t. M. 5. f. 1.* Co-

retta alba pisonis.

*Brown. jam.* 451. Thynnus.

pinnulis superioribus 9, in-

ferioribus 8.

*Habitat inter Tropicos, in pelago.*

*Munera chara, Sociorum Garum pretiosa piscium Sanies  
ex intestinis piscium salitis; hodie Constantinopoli fre-  
quens; nobis exoletum supposito Encrasicolo.*

Cordyla 4. S. pinnulis X, linea laterali  
loricata.

*Gron. act. upf.* 1750. p. 36.

Scomber linea laterali

curva tabellis osseis lori-

cata, corpore lato &

tenui.

D. 7, 9, P. 15. V. 5. A. 2, 14. C. 20

*Gron. zooph.* 307. Scomber

compressus latus, linea la-

terali curva lævi, prope

caudam recta loricata.

*Marcgr. bras.* 172. Guara-

tereba.

*Raj. pisc.* 93. Trachurus

brasiliensis.

*Habitat in America.*



\* \* *Pinnulis spuriiis comatis,*

Glaucus. 5. S. pinnulis nullis, spina dorsali recumbente. *Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 89.*

*Osbeck. iter. 296. Scomber adscensionis.*

*D.7,25.P.20.V.5.A.25.C.20*

*Art. gen. 32. syn. 51. Scomber dorso dipterygio, officulo secundo pinnæ dorsalis altissimo.*

*D.7,26.P.18.V.5.A. $\frac{2}{27}$ .C.*

*Habitat ad inf. adscensionis.*

Trachurus 6. S. pinnulis unitis, spina dorsali recumbente, linea laterali loricata. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 90. \**

*Art. gen. 31. syn. 50. Scomber linea laterali aculeata, pinna ani officulorum 30.*

*D.8,34.P.20.V.6.A. $\frac{2}{30}$ .C.*

*Gron. zooph. 308. Scomber linea laterali curva omnino loricata, cauda subbifurca.*

*Kæmpf. jap. 1. t. 11. f. 5. Ara.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 82. Idem.*

*D.8,31.P.20.V.6.A.27.C.22*

*Amæn. acad. 4. p. 249. Scomber linea laterali squamis latis pinnata.*

*D.8,34.P.18.V.6.A. $\frac{2}{30}$ .C.11*

*Hasselqv. iter 363. Scomber Trachurus.*

*D.8,32.P.20.V.6.A.30.C.22*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Hippos. 7. S. pinnulis unitis, operculis postice macula nigra.

*B.7.D.7,22.P.22.V.6.A. $\frac{2}{16}$ .C.33*

*Habitat in Carolina. D. Gard.*

*Dentes unica serie : anticis 2 majoribus. Linea lateralis in medio valde declinata, postice carinata subspinosa. P. Dorsalis posterior rubra. Ventralis Analisq. luteæ. Spinæ ante Analem remotæ.*

Chrysurus. 8. S. pinnulis unitis luteis. ore edentulo.

*D.9,26.P.19.V.6.A. $\frac{2}{30}$ .C.22*

*D.8,29.P.16.V.5.A. $\frac{2}{30}$ .C.22*

*Ha-*

*Habitat in Carolina. D. Garden. Yellowtail.*  
*Spinnae ante analem spatia remotae.*

**Amia. 9.** S. pinnulis unitis, radio ultimo dorsalis posterioris longiore.

*Art. gen. 31. syn. 51. Scomber*  
 dorso dipterygio, officulo  
 ultimo pinnæ dorsalis secundæ prælongo.

D.5,34.P.20.V.6.A.24.C.--

*Habitat. - - - -*

**pelagicus. 10.** S. pinnulis pinnaque dorsali coadunatis in unum.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 72. t. 30.*

*f. 3. Scomber pinna dorsali unica.*

D.40.P.19.V.5.A.22.C.20.

*Habitat - - - -*

**171. MULLUS.** *Caput compressum, declive, squamis tectum.*

*Membr. branch. radiis III.*

*Corpus squamis magnis, facile deciduis.*

**barbatus. 1.** M. cirris geminis, corpore rubro. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*

91. \*

D.7,9.P.15.V.6.A.7.C.16.

*Art. gen. 43. syn. 71. Trigla*  
 capite glabro, cirris geminis in maxilla inferiore.

D.7,9.P.16.V.6.A.7.C.17.

*Gron. mus. 1. n. 99. idem.*

D.7,9.P.17.V. $\frac{1}{8}$ .A. $\frac{1}{7}$ .C.--

*Habitat in Mari Mediterraneo, & Occano septentrionali.*

*Desquamatus ruber est; nihil eo exspirante formosius, nihil Mullo sapidius, Romanorum itaque in eo summa gulae insania & Asotorum prodigalitas, teste Plinio, Seneca, Horatio, Juvenali, Martiali; embatur olim argenti puri pondere, ideoque non edit Mullum, qui eum capit; Caro maxime friabilis. Vide Senec. quæst.*

III. 17. 18.



Surmule- 2. *M. cirris geminis*, lineis luteis longitudinalibus. †

*Art. gen. 43. syn. 72. Trigla* capite glabro, lineis utrinque 4 luteis longitudinalibus.

*Habitat in M. Mediterraneo* ♂ ad Cornubiam.

*Varietas præcedentis secundum Gron. zooph. 286.*

imberbis. 3. *M. imberbis.*

*Art. gen. 43. syn. 72. Trigla* capite glabro, tota rubens, cirris carens.

D.6,<sup>7</sup>/<sub>10</sub>.P.12.V.6.A.<sup>2</sup>/<sub>10</sub>.C.20.

*Habitat in Melita.*

172. TRIGLA. *Caput* loricatum lineis scabris.

*Membr. branch. radiis VII.*

*Corpus: Digiti liberi ad pinnas pectorales.*

cataphracta. 1. *T. digitis geminis*, rostro furcato elongato, corpore loricato. *Mus. Ad. Fr. 2.*

p. 92 \*

B.7.D.27.P.11.V.6.A.20.C.10.

*Art. gen. 46. syn. 75. Trigla* cirris plurimis, corpore octagono.

D 26.P.12.V.6.A.19.C. --

*Gron. mus. 1. n. 98. Idem. B. 5.*

*Habitat in M. Mediterraneo: supero inferoque.*

*Pinnæ ventrales adnexæ pectoralibus. Cirri plures ad labium inferius. Os edentulum.*

Lyra. 2. *T. digitis ternis*, naribus tubulosis.

*Art. gen. 46. syn. 74. Trigla* rostro longo diacantho, naribus tubulosis.

D.10,18.P.12.V.<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.A. -- C. --

*Habitat in Mari Britannico.*

*Maxilla superior antice longius biloba: lobis protensis spinis 9. Spina ante oculos recurva, pone oculos alia brevior. Spina lateralis thoracis digitorum fere longitudine. Pinnæ pectorales vix digitis longiores.*

Gurnardus. 3. T. digitis ternis, dorso maculis nigris rubrisque. D. 9, 18. P. 10. V. 6. A. 19. C. 55.  
*Art. gen. 46. syn. 74. Trigla varia, rostro diacantho, aculeis geminis ad utrumque oculum.*  
*Gron. mus. 1. n. 101. Idem. D. 8, 18. P. 10. V. 6. A. 17. C. 15.*  
*Habitat in Oceano Britannico.*  
*Pinnæ pectorales pallide.*

Cuculus. 4. T. digitis ternis, linea laterali mutica. *Mus. A. Fr.*  
 2. p. 93. \* D. 9, 16. P. 10. V.  $\frac{1}{2}$ . A. 16. C. 13.  
*Art. gen. 45. syn. 74. Trigla tota rubens, rostro parum bicorni, operculis branchiarum striatis.*  
 D. 9, 17. P. 11. V. 6. A. 15. C. 13.  
*Habitat in Mari Mediterraneo, Pelago.*

Lucerna. 5. T. digitis ternis, rostro subbifido, linea laterali ad caudam bifida.  
*Art. gen. 45. syn. 73. Trigla rostro parum bifido, linea laterali ad caudam bifurca.*  
 D. 10, 17. P. 10. V. 6. A. 15. C. --  
*Gron. mus. 1. n. 100. Idem. D. 8, 16. P. 10. V. 6. A. 15. C. --*  
*Habitat in Oceano septentrionali.*  
*Sequentis varietas secundum Gronovium.*

Hirundo. 6. T. digitis ternis, linea laterali aculeata. *Mus. Ad. Fr.*  
 2. p. 93. \*  
*Art. gen. 44. syn. 73. Trigla capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pinnas pectorales.*  
 D. 9, 18. P. 10. V.  $\frac{1}{2}$ . A. 19. C. 12.  
*Fn. svec. 340. \* It. wgoth.*  
 p. 176. Idem. D. 7, 19. P. 9. V. 6. A. 18. C. 11.  
*Habitat in Oceano Atlantico.*  
*Pinnæ pectorales nigrae.*

asiatica. 7. T. digitis quaternis. B. 7. D. 4. 16. P. 18. V. 6. A. 17. C. 18.  
*Habitat in Oceano,*



Corpus leve, teretiusculum, argenteum. Nasus s. rostrum prominens, leve. Os intus scabrum. Opercula anteriora serrata. Pinnæ pectorales falcatae.

evolans. 8. T. digitis ternis, mucronibus tribus ferratis pinnis dorsalibus interpositis. B. 8. D. 8, 11. P. 13. V. 6. A. 11. C. 13. Brown. jam. 453. t. 47. f. 3. Trigla volitans minor. Habitat in Carolina.

Caput radiato-celatum: Rostrum emarginatum. Pinnæ Pectorales nigrae, longitudine dimidii corporis, sed latiores. Inter Pinnam dorsalem anteriorem & posteriorem, quasi rudimenta trium spinarum serrata. Spina 1 & 2 in priore & 1 in posteriore pinna dorsali, antico latere scabrae sunt. Cauda bifida.

volitans. 9. T. digitis vicens membrana palmatis.

Art. gen. 44. syn. 73. Trigla capite parum aculeato, pinna singulari ad pinnas pectorales.

D. 5, 8. P. 28. V. 5. A. 6. C. --

Gron. mus. 1. n. 102. Idem. D. 6, 8. P. 6. V. 5. A. 6. C. 18.

Brown. jam. 453. Trigla capite 4 spondylis acutis armato.

Seb. mus. 3. t. 28. f. 7.

Marcgr. bras. 163. Pirapebe.

Habitat in Mari Mediterraneo, Oceano. Pelago inter tropicos, in Asia, imprimis ad Cap. b. spei, saepe agitata evolans ex aqua.

## IV. ABDOMINALES.

*Pinnæ ventrales, pone Thoracem, in abdomine sitæ.*

73. COBITIS. *Caput: Oculi in suprema capitis parte.*

*Membr. branch. radiis IV-VI. O. percula inferne clausa.*

*Corpus fere æquale f. Cauda versus pinnam minus angustata.*

Anableps. 1. C. cirris 2, capite depresso, oculis prominulis. *Mus.*

*Ad. Fr. 2. p. 95. \**

*Art. gen. 25. Anableps.*

*Seb. mus. 3. p. 108. t. 34. f.*

*7. Anableps.*

*Gron. mus. 1. n. 32. t. 1. f. 1,*

*2, 3. Anableps.*

*B.6.D.7.P.22.V.7.A.9.C.--*

*Habitat Surinami ad littora maris.*

*Cirrus utrinque ad sinus oris, quasi tentaculum.*

Barbatula. 2. C. cirris 6, capite inermi compresso. *Mus. Ad. Fr. 2.*

*p. 95. \**

*Art. gen. 2. syn. 2. Cobitis*

*tota glabra maculosa, corpore subtereti.*

*D.8.P.12.V.7.A.6.C.--*

*Fn. svec. 341.*

*Gron. zooph. 202.*

*D.8.P.5.V.7.A.6.C.16.*

*Habitat in Europæ, Asiæ aquis dulcibus.*

Tænia. 3. C. cirris 6, spina suboculari. *Faun. svec. 342.*

*D.7.P.8.V.7.A.7.C.16.*

*Art. gen. 2. syn. 3. spec. 4.*

*Cobitis aculeo bifurco infra utrumque oculum.*

*D.9.P.7.V.7.A.8.C.18.*

*Gron. zooph. 200. Idem.*

*D.8.P.--V.--A.8.C.17.*

*mus. 1. n. 5. Idem.*

*D.7.P.--V.7.A.6.C.16.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus; inque cavernis subterraneis.*



fossilis.

4. *C. cirris* 8, spina supra-oculari. *Fn. svec.* 343.*Gron. act. upf.* 1742. p. 79. t. 3.*Cobitis* aculeo bifurco supra utrumque oculum.

B.3.D.7.P.9.V.6.A.7.C.16.

*Art. gen.* 2. *syn.* 3. *Cobitis* cærulescens, lineis utrinque 5 longitudinalibus.

D.7.P.11.V.5.A.5.C.16.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 76. *Idem.* D.6.P.11.V.6.A.6.C.15.*Habitat in Europa. Thermometron vivum.* E.N.C. 1687. p. 354. *obj.* 175.heterocli-  
ta.5. *C. capite imberbi*, pinna dorsali analique albo-punctata, caudali nigro-fasciata.

B.5.D.12.P.16.V.6.A.10.C.25.

*Habitat in Carolina.* D. Garden. Mudfisk.*Corpus teretiusculum*, palmare, squamis magnis levibus. *Caput planiusculum*, squamosum: labia denticulata. *Abdomen flavescens.* P. dorsalis pone æquilibrium & *Analisis opposita nigricantes*, irroratæ punctis hyalinis. P. *Caudæ rotundata maculis albiss* & *fasciis nigris margine diaphano.* Genus nondum certum.174. AMIA. *Caput osseum*, nudum, scabrum, futuris conspicuum.*Dentes in mandibulis palatoque*, acuti, conferti.*Cirri nasales duo.**Membr. branch. radiis XII.**Corpus squamosum*

calva.

1. *A. cauda macula nigra.*

B.42.P.15.V.7.A.10.C.20.

*Habitat in Carolinæ aquis dulcibus*, rarius esculentus. D. Garden. Mudfisk.*Corpus teretiusculum*, squamosum. *Linea lateralis recta.* *Gula ossiculis 2*, scutiformibus, e centro striatis. *Opercula obtusa, ossea.* *Caput depressum*, quasi excoriatum cranio nudo. P. *pectorales ventralibus non majores.* *Ventrales in medio abdominis*

Dor-

- Dorsalis longius extensa. Caudalis rotundata: macula nigra ad basin superiorem.

175. SILURUS. Caput nudum. Os cirris aliquot filiformibus tentaculatum.

Membr. branch. radiis IV-XIV.

Corpus: Radius pinnarum pectoralium aut dorsalis primus spinosus, retrodentatus.

Afotus. 1. S. pinna dorsali unica, cirris 4. B.16.D. $\frac{2}{5}$ .P. $\frac{1}{4}$ .V.13.A.82.C.16.

Habitat in Asia. Mus. ac. holmenfis.

Cirri duo supra os; duo infra. Dentes numerosi. Spina nulla rigida in pinna dorsi, at serrata in Pectoralibus, ut in congeneribus. P. ani longa, caudæ annexa.

Glanis. 2. S. pinna dorsali unica mutica, cirris 6. Faun. svec.

344.

It. scan. 61. Mal.

B.14.D.4.P. $\frac{1}{8}$ .V.12.A.88.C.17.

Aët. stockh. 1756. p. 34. t. 3.

Silurus.

B.16.D.4.P. $\frac{1}{7}$ .V.13.A.88.C.17.

Art. gen. 82. syn. 110. Silurus

cirris 4 in mento

D.4.P. $\frac{1}{8}$ .V.11.A.20.C.17.

Gron. mus. 1. n. 25. t. 6. f.

1. Silurus cirris 2 ad ma-

xillam superiorem, 4 in

mento.

B.14.D. $\frac{1}{3}$ .P. $\frac{1}{5}$ .V.11.A.90.C.15.

Habitat in Oriente, minus frequens in Europæ lacubus.

Maximus dulcium: judæis vetitus. Parit florente

Ligustro.

Cauda integra.

Ii 3

3. S.

cirri.

2. inermis.  
militaris.

4. Afotus.

Bagre.

Callichthys.

6. Glanis.

Felis.

Clarias.

Afota.

galeatus.

costatus.

carinatus.

fasciatus.

Cataphractus.

8. Mystus.

Aspredo.

Batrachas.

anguillaris.

Catus.

cous.

undecimalis.



Aspredo. 3. S. pinna dorsali unica, radiis  
5, cirris 8.

*Amæn. acad. 1. p. 311. t. 14.*

*f. 5. Aspredo.*

B.4.D.5.P. $\frac{1}{8}$ .V.6.A.55.C.111

*Seb. mus. 3. t. 29. f. 10. My-*  
stus cirris 8, appendice dor-  
si carens.

*Gron. zooph. 324, 326. Aspre-*  
do cirris 8, corpore lævi,  
pinna ani ad caudam bifur-  
cam extensa.

*Gron. mus. 1. n. 26. Aspre-*  
do.

B.4.D.5.P. $\frac{1}{8}$ .V.6.A.55.C.91

*Klein. miss. 5. p. 86. t. 4. f. 8.*

*Batrachus.*

*Habitat in Americæ fluviis.*

*Cirri laterales basi lati. Dorsum carinatum. Cauda*  
*bifurca.*

Mystus. 4. S. pinna dorsali unica, radiis  
6, cirris 8. *Mus. Ad. Fr. 2.*

*p. 96. \**

B.-D. $\frac{1}{5}$ .P. $\frac{1}{9}$ .V.6.A.57.C.191

*Hasselq. itin. 376. Silurus*

*Schilde niloticus.*

B.10.D. $\frac{1}{7}$ .P. $\frac{1}{12}$ .V.6.A.62.C.201

*Habitat in Nilo.*

*Cauda bifurca.*

anguilla- 5. S. pinna dorsali unica, radiis  
ris. 70, cirris 8. *Mus. Ad. Fr. 2.*

*p. 96. \**

B.-D.70.P. $\frac{1}{7}$ .V.6.A.55.C.171

*Hasselqv. iter. 371. Silurus*

*Charmuth niloticus. B.10.D.72.P. $\frac{1}{10}$ .V.6.A.59.C.211*

*Gron. zooph. 322. t. 8. f. 3, 4.*

*Clarias.*

B.9.D.69.P.8.V.7.A.50.C.201

*Russel. alep. 73. t. 12. f. 1.*

*Blackfisk.*

*Raj. pisc. 150. Lampetra indi-*  
*ca enneophthalmus.*

*Habitat in Nilo.*

*Cauda rotundata. Cirri 2 labii superioris, 4 inferioris,*  
*2 utrinque ad sinus oris.*

Batra-  
chus

6. S. pinna dorsali unica, radiis  
60, cirris 8. *Mus. Ad. Fr.*

*2. p. 97. \**

B.5.D.60.P. $\frac{1}{8}$ .V.6.A.48.C.141

*Ha-*

*Habitat in Asia, Africa.*

*Cauda integra.*

- undecim- 7. S. pinna dorsali unica, radiis  
malis. 11, cirris 8. *Mus. Ad. Fr.*  
2. p. 27. \* B.--D.  $\frac{1}{11}$ . P.  $\frac{1}{11}$ . V. 6. A. 11. C. 17.  
*Habitat Surinami.*  
*Cauda bifurca.*
- militaris. 8. S. pinna dorsali postice adi-  
posa, cirris 2 rigidis. B.--D.  $\frac{1}{7}$ , 0. P.  $\frac{1}{11}$ . V. 7. A. 20. C. 18.  
*Habitat in Asia. M. Ac. holmensf.*  
Oculi ad latera capitis. Cirri 2 ad os, compressi, rigi-  
di, offei. Linea lateralis recta. Dorsum ad pinnam  
dorsi assurgens.
- inermis. 9. S. pinna dorsali postica adi-  
posa, pinnis inermibus,  
cirris 2. D. 7, 0. P. 17. V. 7. A. 38. C.--  
*Habitat Surinami.*  
Caput depressum, latum, lubricum. Maxillæ scabræ.  
Cirri 2, quasi Tentacula breviora, ante nares. P.  
Dorsalis incipit prope caput: radio 1 vix spinoso ro-  
bustiore levi. P. Analis radii quatuor anteriores  
breviores. Cauda subtruncata, vix biloba.
- Felis. 10. S. pinna dorsali postica a-  
diposa, ani radiis 23, cirris  
6, cauda bifida. B. 5. D.  $\frac{1}{8}$ , 0. P.  $\frac{1}{11}$ . V. 6. A. 23. C. 31.  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*  
Cirri sub labio inferiore 4, supra sinus oris utrinque 1.  
Dorsum cærulescens. P. ventrales analisque rufescent-  
es. Cauda bifida. *Affinis S. Cato.*
- galeatus. 11. S. pinna dorsali postica adi-  
posa, ani radiis 24, cirris 6,  
cauda integra.  
*Seb. mus. 3. p. 85. t. 12. f.*  
7. *Myxus* cirris 6, cauda  
æquali. D.  $\frac{1}{7}$ , 0. P.  $\frac{1}{9}$ . V. 6. A. 24. C. 19.  
*Habitat in America australi.*

Siluros examinent, qui vivos habent, cum videntur multum affines Nanti-  
bus. Ova tunica obducta, sed embryone intra tunicam, verum ore extra  
tunicam hiante.



Caput *clypeo coriaceo duro*. Radius *spinofus dorsalium*  
*Pectoraliumque rigidus perstat*. Cauda *integra*.

- Catus. 12. S. pinna dorsali postica adiposa, ani radiis 20, cirris 8. B. 5. D.  $\frac{1}{6}$ , 0. P.  $\frac{1}{11}$ . V. 8. A. 20. C. 17.  
*Catesb. car. 2. p. 23. t. 23.*  
 Bagre 2 Marcgr. affinis.  
*Marcgr. bras: 173.* Bagre species 2.  
*Habitat in America, Asia.*  
*Ex Asia vidi pinnis ventr. radiis 6.*
- cous. 13. S. pinna dorsali postica adiposa, ani radiis 8, cirris 8, cauda bifurca.  
*Gron. zooph. 387. t. 8. f. 7.*  
 Mystus cirris 8 capite brevioribus, pinna dorsali secunda ovata. B. 1. D.  $\frac{1}{3}$ , 0. P. 6. V. 9. A. 8. C. --  
*Russel. alepp. 76. t. 13. f. 2.*  
 Mystus.  
*Habitat in Syria.*
- carinatus. 14. S. pinna dorsali postica adiposa, linea laterali spinosa, cirris 6 pinnatis. B. -- D. 6. P. 8. V. 8. A. 12. C. 24.  
*Habitat Surinami.*  
 Corpus cum Capite compressum. Cirri ad latus oris solitarii, latere inferiore pinnati; reliqui 4 sub labio inferiore, aequales, connexi, breves, subtus papillofi. Linea lateralis subserrata & carinata spinis, ut in *Scombris*. P. dorsalis anterior radio 1 antrosum sursum dentato. Pectoralium 1 utrinque contrarie dentato. Cauda bifurca.
- Clarias. 15. S. pinna dorsali postica adiposa, ani radiis 11, cirris 6.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. 98. \**  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 73.* Aspredo pinna dorsali postica adiposa. B. 9. D.  $\frac{1}{7}$ , 0. P.  $\frac{1}{16}$ . V. 7. A. 11. C. 17.  
*It. scan. 82.* Aspredo cirris longitudine corporis, pinnis dorsalibus duabus. B. -- D. 7, 0. P.  $\frac{1}{9}$ . V. 5. A. 10. C. 16.  
*Gron.*

*Gron. mus. 1. n. 83.* *Myxus*  
cirris 6 longissimis, pinna  
dorsi secunda longissima a  
priori ad caudam extensa.

B.4.D. $\frac{1}{7}$ ,O.P. $\frac{1}{10}$ .V. $\frac{1}{8}$ .A.11.C.19.

*Hasselqv. iter. 369.* *Silurus*

*Scheilan niloticus.*

B.6.D. $\frac{1}{7}$ ,O.P. $\frac{1}{9}$ .V.7.A.12.C.16.

*Habitat in Americæ, Africæ fluviis. In Nilo venena-*  
*tus radio dentato pectoralium.*

*Cauda bifurca.*

*fasciatus. 16.* S. pinna dorsali postica adi-  
posa, ani radiis 13, cirris 6.

*Seb. mus. 3. p. 84. t. 19. f. 6.*

*Myxus maculosus*, cirris 6  
longis, capite longo plano.

B.-D.7,O.P.11.V.6.A.13.C.17.

*Gron. zooph. 386.* *Myxus*  
cirris 6, maxilla inferiore  
breviore, rostro plagiopla-  
teo lato.

B.-D.7,O.P. $\frac{1}{10}$ .V.6.A.14.C.-

*Habitat in Brasilia, Surinami, cænis expetita.*

*Corpus nudum. Caput depressum, antice rotundatum,  $\frac{1}{3}$*   
*totius longitudinis. Dorsum utrinque fasciis albis ni-*  
*græ inductis. Abdomen album. Pinnæ omnes adspersæ*  
*punctis nigris. Dorsalis pone caput sita; Adiposa*  
*versus caudam.*

Bagre

17. S. pinna dorsali postica a-  
diposa, radio primo dorsa-  
lis pectoraliumque setaceo,  
cirris 4.

*Gron. zooph. 382.* *Myxus*  
cirris 4: lateralibus longis-  
simis, ossiculo dorsalis pe-  
ctoraliumque 1 filiformi  
longissimo.

B.4.D. $\frac{1}{8}$ ,O.P. $\frac{1}{12}$ .V.8.A.32.C.15.

*Will. pisc. t. H. 7. f. 6.*

*Raj. pisc. 82. n. 3.* *Bagre*  
tertia.

*Habitat in America meridionali.*

Afcita.

18. S. pinna dorsali postica adi-  
posa, ani radiis 18, cirris 6.



*Mus. Ad. Fr. 1. p. 79. t. 30.*

*f. 2. Ascita.*

*B.--D. $\frac{1}{8}$ , O.P. $\frac{1}{2}$ . V.6.A.18.C.18*

*Habitat in India. Ovis maturis, intumescente abdomine longitudinaliter dehiscit.*

costatus. 19. S. pinna dorsali postica ad-  
posita, squamis serie simpli-  
ci, cirris 6, cauda bifida.

*Gron. mus. 2. n. 177. t. 5. f. 1,*

*2. Myxus cirris 6 longis-  
simis, unico squamarum a-  
culeatarum ordine utrinque  
in lateribus.*

*B.--D. $\frac{1}{7}$ , O.P. $\frac{1}{2}$ . V.7.A.12.C.177*

*Habitat in Indiis.*

Callich- 20. S. pinna dorsali postica uni-  
thys. radiata, squamis ordine du-  
plici, cirris 4.

*Amæn. acad. 1. p. 317. t. 14. f.*

*1. Callichthys.*

*B.3.D. $\frac{1}{8}$ , 1.P. $\frac{1}{7}$ . V.6.A. $\frac{1}{7}$ .C.141*

*Gron. mus. 1. n. 70. Callich-  
thys cirris 4, lateribus du-  
plici squamarum ordine.*

*B.3.D. $\frac{2}{8}$ , 1.P. $\frac{1}{7}$ . V.7.A.7.C.141*

*Seb. mus. 3. t. 29. f. 13. Ple-  
costomus cirris 4 longis.*

*Habitat in Americæ rivulis.*

*Rivulis exsiccatis exit per terram aquas quæsiturus.*  
*Marçgr. bras. 151. Piscinas perforat & exit reli-  
quisque exitum parat. Dahlberg.*

cataphra- 21. S. pinna dorsali postica u-  
ctus. niradiata, squamis ordine  
simplici, cirris 6, cauda  
integra.

*Gron. mus. 1. n. 71. t. 3. f.*

*4, 5. Callichthys cirris 6,  
lateribus uno squamarum  
ordine.*

*B.6.D. $\frac{1}{5}$ , 1.P.--V.6.A.9.C.19.*

*Catesb. car. 3. p. 19. t. 19. Ca-  
taphractus americanus.*

*Habitat in America.*

176. TEUTHIS. *Caput antice subtruncatum.**Membr. branch. radiis V**Dentes simplici serie, æquales, rigidi, approximati.*

Hepatus. 1. T. spina utrinque caudali recumbente mobili.

*Brown. jam. 455. Teuthis fusca cæruleo nitens, aculeo simplici utrinque ad caudam.**Gron. zooph. 353. Hepatus mucrone reflexo utrinque prope caudam.* $D. \frac{9}{4}. P. 16. V. \frac{1}{5}. A. \frac{3}{28}. C. --$ *Seb. mus. 3. p. 104. t. 33. f. 3. Chætodon cærulescens, dorso nigro, cauda æquali ex albido nigroque varia.**Catesb. car. 2. p. 10. t. 1. f. 1. Turdus rhomboides.**Valent. ind. 3. f. 77, 383. 404.**Habitat in Carolina, Amboina.**Caput maxime declive. Dentes æquales, rigidi, unica serie. Pinna dorsalis radiis primis 8 spinosis. Ventrals 1 spinoso. Analis 3 spinosis. Ad utrumque latus caudæ Spina valida, subulata, mobilis, erigibilis, recumbens, in sulco latitans.*

javus.

2. T. cauda utrinque mutica. †

*Gron. zooph. 352. Hepatus cauda fronteque inermibus.* $D. \frac{11}{1}. P. 15. V. \frac{2}{5}. A. \frac{7}{18}. C. --$ *Valent. ind. 3. p. 339. f. 410.**Leervisch.**Habitat ad Javam.**Corpus maculis longitudinalibus cærulescentibus. Cauda lunata. Pinnarum ventralium radius primus 3 ultimus spinosus.*



**177. LORICARIA.** *Caput læve, depressum. Os edentulum, retractile.*

*Membr. branch. radiis VI.*

*Corpus cataphractum.*

cataphra- 1. *L. pinna dorsi unica, cirris*  
cta. *duobus. Mus. Ad. Fr. 1.*

*p. 79. t. 29. f. 1.*

*D.  $\frac{1}{8}$ . P.  $\frac{1}{7}$ . V.  $\frac{1}{3}$ . A.  $\frac{1}{3}$ . C. 12.*

*Gron. mus. 1. n. 68. t. 2. f.*

*1, 2. Plecostomus dorso monopterygio, officulo superiori caudæ bifurcæ setiformi.*

*D.  $\frac{1}{8}$ . P.  $\frac{1}{7}$ . V.  $\frac{1}{3}$ . A. 6. C. 12.*

*Seb. mus. 3. t. 29. f. 14.*

*B. Gron. mus. 1. n. 69. Plecostomus ore edentulo, officulo superiori caudæ bifurcæ longitudine corporis.*

*Habitat in America Meridionali.*

*Lobus superior caudæ radio supremo longissimo terminatur.*

**Plecosto-** 2. *L. pinnis dorsi duabus.*

*mus.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 55. t. 28.*

*f. 4. Acipenser cirris duobus.*

*D. 8, 1. P.  $\frac{1}{7}$ . V. 6. A. 5. C. 12.*

*Gron. mus. 1. n. 67. t. 3. f. 1,*

*2. Plecostomus dorso dipterygio, cirris duobus, cauda bifurca.*

*Seb. mus. 3. t. 29. f. 11.*

*Marcgr. bras. 166. Guacari.*

*Habitat in America australi.*

178. SALMO. *Caput læve. Dentes in maxillis lingua.*

*Membr. branch. radiis IV-X.*

*Corpus: Pinna dorsalis postica adiposa; Pinnæ ventrales multiradiatæ.*

\* TRUTTÆ corpore variegato.

Salar.

1. S. rostro ultra inferiorem maxillam prominente. *Art. gen. 11. syn. 22. spec. 48. Fn. svec. 345. B. 12. D. 15. P. 14. V. 10. A. 13. C. 19.*  
*Habitat in Oceano Europæ, parit in fluviis.*  
*Mas maxilla superiore adunca; fortiter fluvios adscendit; allicitur albo. Piscatura Aët. holm. 1751. p. 95.*

Eriox.

2. S. maculis cinereis, caudæ extremo æquali. *Art. gen. 12. syn. 23. spec. 50. Fn. spec. 346. B. 12. D. 14. P. 14. V. 10. A. 12. C. 20.*  
*Habitat cum præcedente.*

Trutta.

3. S. ocellis nigris iridibus brunneis, pinna pectorali punctis 6. *Faun. svec. 347. \* B. 12. D. 12. P. 13. V. 10. A. 9. C. 20.*  
*Art. gen. 12. syn. 14. Salmo latus, maculis rubris nigrisque, cauda æquali.*  
*Gron. mus. 2. n. 164. Salmo latus, cauda subrecta, maxillis æqualibus, maculis nigris annulo albido. D. 14. P. 12. V. 12. A. 10. C. 20.*  
*Habitat in fluviis Europæ.*

Fario.

4. S. maculis rubris, maxilla inferiore sublongiore. *Art. gen. 12. syn. 23. spec. 51. B. 13. D. 13. P. 10. V. 10. A. 10. C. 18.*  
*Fn. svec. 348. \* Idem. B. 10. D. 14. P. 14. V. 9. A. 11. C. 20.*  
*Habitat in Sveciæ, Helvetiæ fluviis.*



*Corpus maculis nigris rubrisque. Pinnae ventrales analisque margine albo.*

Hucho.

5. *S. oblongus*, dentium lineis duabus palati, maculis tantum modo nigris. *Art. gen. 12. syn. 25.*

*Kram. austr. 388.* Salmo dorso brunneo maculis nigris, lateribus ventreque albis.

*Habitat in Danubio.*

*D. 14. P. 16. V. 10. A. -- C. 20.*

lacustris.

6. *S. cauda bifurca*, maculis solum nigris, fulco longitudinali ventris. *Art. gen. syn. 25.*

*Gron. zooph. 362.* Salmo cauda subbifurca, maxillis æqualibus, lateribus & capite maculis minutis nigris crebris.

*Habitat in Helvetiæ, Norvegiæ aquis dulcibus.*

Carpio.

7. *S. pede minor*, dentium ordinibus quinque palati. *Art. gen. 13. syn. 24.*

*Habitat in Angliæ, Valesiæ fluviis.*

*Similis S. alpino, sed irides albi; Corpus argenteum lateribus albo maculatis, Abdomine minus rufo. Pinnae inferiores nigricantes, parumque rubentes. Ström. söndm. 304.*

alpinus.

8. *S. dorso nigro*, lateribus cæruleis, ventre fulvo. *Fn. svec. 349. \**

*It. wgoth. 257. Röeding.*

*B 10. D. 13. P. 14. V. 10. A. 12. C. 19.*

*Art. gen. 13. syn. 25. spec. 52.* Salmo vix pedalis, pinnis ventris rubris, maxilla inferiore paulo longiore.

*Will. pisc. 196. t. N. 1. F. 4.*

*Habitat in Lapponiæ, Angliæ alpibus solus, autumno  
petit littora frondibus umbrosa.*

*Caro rubra.*

valveli-  
nus.

9. *S. pedalis*, maxilla superiore longiore. *Art. gen. 13.*  
*syn. 26.*

*Habitat in Austria ad Lintz.*

almari-  
nus.

10. *S. dorso fulvo*: maculis luteis, cauda bifurcata. *Art.*  
*syn. 24.*

*Habitat Tridenti in fluviis frigidis saxosis.*

Imbla.

11. *S. lineis lateralibus sursum recurvis*, cauda bifurca.  
*Art. gen. 13. syn. 25.*

*Habitat in Helvetiæ, Italiæ lacubus.*

argenti-  
nus.

12. *S. tænia longitudinali argentea*, pinna ani longissima.

*Aët. petr. 1761. p. 404. Trutta dentata*, dorso plano, abdomine acuto prominente.

*Marcgr. bras. 170. Piabucu.*

*Habitat in Brasilia.*

\* \* *OSMERI* pinna dorsali anique oppositis.

Eperla-  
nus.

13. *S. capite diphano*, radiis pinnæ ani 17. *Faun. svec.*  
*350.*

*Art. gen. 10. syn. 21. spec.*  
*45.*

*D.11.P.11.V.8.A17.C.19.*

*Habitat in Europa, fluvios primo vere adscendens. No-*  
*ster fætidus prurit cum Salice rubra & Viola odorata.*  
*Ovarium unicum.*

Saurus.

14. *S. radiis pinnæ ani 10.*

*Art. gen. 10. syn. 22. Osmerus*

*radiis pinnæ ani 11. B.-D.12.P.13.V.8.A.10.C.-*

*Habitat in Europa.*



\* \* \* COREGONI Dentibus vix conspicuis.

- Lavaretus. 15. S. maxilla superiore longiore, radiis pinnæ dorfi 14.  
*Fn. svec. 352.*  
*Art. gen. 10. syn. 19. spec. 37.*  
 Coregonus maxilla superiore longiore, pinna dorfi officulorum 14. B.9.D.14.P.16.V.12.A.17.C.18.  
*Act. stockh. 1753. p. 195.*  
*Habitat in Europa.*
- Albula. 16. S. maxillis edentulis: inferiore longiore. *Fn. svec. 353.*  
*Art. gen. 9. syn. 18. spec. 40.*  
 Coregonus edentulus, maxilla inferiore longiore.  
 B.7.D.14.P.16.V.12.A.15.C.---  
*Habitat in Europa.*  
*Prurit ante Brumam.*
- Thymallus. 17. S. maxilla superiore longiore, pinna dorfi radiis 23.  
*Art. gen. 10. syn. 20. spec. 41.*  
 Coregonus maxilla superiore longiore, pinna dorfi officulorum 23.  
*Fn. svec. 354. Idem. \* B.10.D.23.P.16.V.12.A.14.C.19.*  
*Gron. mus. 2. n. 162. Idem.*  
 B.---D.21.P.15.V.10.A.15.C.---  
*Habitat in Europæ fluviis maritimis.*
- Oxyrinchus. 18. S. maxilla superiore longiore conica.  
*Art. gen. 10. syn. 21. Coregonus maxilla superiore longiore conica.* B.---D.13.P.17.V.12.A.14.C.---  
*Gron. mus. 1. n. 48. Idem.*  
 B.---D.14.P.13.V.10.A.15.C.---  
*Habitat in Oceano Atlantico.*
- Vimba. 19. S. pinna adiposa subferrata.  
*Faun. svec. 351.*  
*It. wgoth. p. 231. Vimba.* B.---D.12.P.16.V.10.A.14.C.---  
*Habitat in Wænero Sveciæ.*

\*\*\*\* CHARACINI Membr. branch. radiis tantum IV.

gibbosus. 20. S. dorso gibboso compresso,  
pinna ani radiis 50.

*Gron. mus. 1. n. 53. t. 1. f.*

4. Charax dorso admodum  
prominulo, pinna ani ra-  
diis 55.

*D.10.P.11.V.8.A.55.C.19.*

*Habitat Surinami.*

notatus. 21. S. macula utrinque nigra ver-  
sus opercula.

*B.4.D.11.P.16.V.7.A.23.C.24.*

*Habitat Surinami.*

*Corpus oblongum: macula nigra supra lineam lateralem.*

*Caput acutiusculum. P. adiposa parva. Cauda bifur-*  
*ca. Affinis bimaculato.*

bimacula- 22. S. corpore compresso bi-  
tus. maculato, pinna ani radiis  
32.

*Gron. mus. 1. n. 54. t. 1. f.*

5. Charax dorso læviter con-  
vexo, pinna ani radiis 31.

*D.10.P.13.V.8.A.31.C.19.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 78. t. 32.*

*f. 2. Albula pinna ani radiis*

*32.*

*B.4.D.10.P.13.V.8.A.32.C.19.*

*Art. spec. 44. Coregonoides*  
*amboinensis.*

*D.12.P.13.V.10.A.34.C.--*

*Seb. mus. 3. p. 106. t. 34. f. 3.*

*Tetragonopterus.*

*Habitat in America meridionali.*

immacu- 23. S. corpore immaculato, pin-  
latus. na ani radiis 12.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 78. Albu-*

*la pinna ani radiis 12.*

*D.11.P.14.V.11.A.12.C.20.*

*Habitat in America.*

♀ tens. 24. S. radiis dorsalibus analibus-  
que XII.

*B.12.D.12.P.14.V.3.A.12.C.24.*

*Catesb. car. 2. p. 2. t. 2. f. 2.*

*Saurus ex cinereo nigricans.*

*Habitat in Carolina. D. Garden. Whiting.*



Caput ovatum, acutiusculum. Dentes numerosi, exsertiti, mucronati, in maxillis, palato, lingua. P. analis opposita adiposæ. Cauda lunata.

cyprinoi- 25. S. pinnæ dorsalis radiis antides.  
cis elongato-setaceis. D.10.P.10.V.9.A.10.C.-

Gron. mus. 378. Charax maxilla superiore longiore, capite antice plagioplateo, dorso summo acuminato. D.10.P.15.V.10.A.11.C.222

Habitat Surinami.

Corpus niveum, facie Cyprini Rutili. Caput supra planum. Oculi prominuli. Cauda bifurca.

niloticus. 26. S. pinnis omnibus flavescen-  
tibus, corpore toto albo.

Mus. Ad. Fr. 2. p. 99. \* D.9.P.13.V.9.A.26.C.199

Habitat in Nilo.

Cauda bifurca.

pulveru- 27. S. pinnis subpulverulentis,  
lentus. linea laterali descendente.

Mus. Ad. Fr. 2. p. 99. \* D.11.P.16.V.8.A.26.C.188

Habitat in America.

rhom- 28. S. abdomine ferrato, pinna  
beus. anali caudalique basi mar-  
gineque nigris.

B.4 D.17 P.17.V.6.A.32.C.165

Habitat Surinami, præmordens pedes Anatum.

Corpus argenteum facie Chaetod. rhombeus. Labium inferius longius, obtusum. Dentes validi. Oculi rubri. Abdomen carinatum, serratum ut in Clupeis.

anostomus. 29. S. ore fimo.

Gron. mus. 2. n. 165. t. 7.

f. 2. Anostomus.

B.4 D.11 P.13 V.7.A.10.C.255

Habitat in Indiis.

179. FISTULARIA. *Caput*: Rostrum cylindricum,  
apice maxillosum.

*Membr. branch. radiis VII.*

*Corpus* - - -

tabacaria. 1. F. cauda bifida setifera. *Mus.*

*Ad. Fr. 1. p. 80. t. 26. f. 1.*

D.14.P.14.V.6.A.4.C.13.

*Gron. mus. 1. n. 31.* Solenostomus cauda bifurca in setam balænaceam abeunte.

D.8.P.15.V.6.A.12.C.12.

*Catesb. car. 2. t. 17. f. 2.* Petimbuaba. *Marcgr. bras.*

148.

*Raj. pisc. 110. n. 8.* Petimbuaba.

*Habitat in America.*

*Filum e divisura pinnae caudæ.*

chinenfis. 2. F. cauda rotundata mutica. †

*Gron. zooph. 366.* Solenostomus cauda rotundata integerrima: seta nulla.

D.26.P.16.V.6.A.24.C.11.

*Pet. gaz. t. 68. f. 1.* Acus chinenfis maxima, corpore compresso.

*Valent. ind. 3. f. 3, 23, 492.*

*Habitat in India orientali.*

180. ESOX. *Caput* supra planiusculum: Mandibula superiore plana brevior: inferiore punctata. *Dentes* in maxillis, lingua.

*Membr. branch. radiis VII-XII.*

*Corpus* elongatum.

Sphyræ 1. E. dorso dipterygio: antica

na. spinosa. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*

100. \*

D.5,10.P.12.V.6.A.10.C.17.



*Art. gen. 84. syn. 112. Sphy-*  
*ræna.*

*D.5,10 P.13.V.6.A.10.C.11*

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

osseus.

2. *E. maxilla superiore longiore,*  
*squamis ossæis. Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 101. \**

*D.6.P.11.V.6.A.5.C.12.*

*Art. gen. 14. syn. 27. Efox*  
*maxilla superiore longiore,*  
*cauda quadrata.*

*D.7.P.11.V.6.A.7.C.12.*

*Habitat in America septentrionali, Asia.*

*Mandibula inferior brevior, desinens ante oculos. Cor-*  
*poris squamæ ossææ rhombeæ: in ordine dorsali ro-*  
*tundæ retusæ. Pinnarum omnium radius anticus du-*  
*plici serie dentatus. Pinna dorsalis posterior, quam*  
*pinna ani.*

*Conf. Catesb. car. 2. t. 30.*

*Acus maxima squa-*  
*mosa viridis.*

*D.11.P.11.V.6.A.17.C.16.*

*Maxilla inferior longior. Pinna dorsi 3 ani ex-*  
*actæ oppositæ. Squamæ tenues distinctæ, nec*  
*ossææ imbricatæ. An distincta species? Habitat*  
*in fluviis Carolina. Misit D. Garden.*

Vulpes.

3. *E. pinna in medio dorsi,*  
*membrana branchiostega tri-*  
*radiata.*

*D.14.P.14.V.8.A.10.C.17.*

*Catesb. car. 2. t. 1. f. 2. Vulpes*  
*bahamensis.*

*Habitat in America.*

Synodus.

4. *E. pinna in medio dorsi,*  
*membrana branchiostega 5.*  
*radiata.*

*Gron. mus. 2. n. 151. t. 7. f. 1.*

*Synodus.*

*B.5.D.11.P.12.V.8.A.6.C.8.*

*Habitat in America.*

*Similitudo summa cum E. Vulpe.*

Lucius.

5. *E. rostro depresso subæquali.*  
*Faun. svec. 355.*

*Art. gen. 10. syn. 26. spec.*  
*53. Efox rostro plagiopla-*  
*teo.*

*D.21.P.15.V.11.A.18.C.19.*

*Gron. mus. 1. n. 28. Idem. D.18.P.11.V.9.A.15.C.--*  
*Habitat in Europa.*  
*Voracissimus exhaurit piscinas; ab anatibus feritur.*

Belone. 6. E. rostro utraque maxilla subulato.

*Art. gen. 10. syn. 27. Elox*  
*rostro cuspidato gracili sub-*  
*tereti spithamali.*

*Fn. svec. 356. Idem.*

*D.16.P.13 V.7.A.20.C.--*

*Gron. mus. 1. n. 30. Idem.*

*B.14.D.16.P.13.V7.A.21.C.23.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Ossa noctu lucent viridia.*

Hepsetus. 7. E. linea laterali argentea.

*Amæn. acad. 1. p. 321. Argen-*  
*tina pinna dorsali pinnæ a-*  
*ni opposita.*

*D.14.P.12.V.6.A.15.C.14.*

*Marcgr. bras. 159. Piquitinga.*

*Habitat in America.*

brasiliensis. 8. E. maxilla inferiore longissima, corpore serpentino.

*Mus. Ad. Fr. 2. p. 102. \* D.12.P.10.V.6.A.17.C.16*

*Marcgr. bras. 168. Timucu.*

*Brown. jam. 443. t. 45. f. 2.*

*Elox maxilla inferiore pro-*  
*ducta.*

*Gron. zooph. 363. Elox ma-*  
*xilla inferiore tereti cuspi-*  
*data longissima, superiore*  
*brevissima.*

*B.14.D.13.P.10.V.6.A.10.C.15.*

*Grew. mus. 87. t. 7. Under*  
*Swordfisk.*

*Habitat in India utraque.*

*Cauda bifurca.*

gymnocephalus. 9. E. maxillis æqualibus, operculis obtusissimis, capite denudato.

*D.13.P.10.V.7.A.26.C.19.*

*Habitat in India.*

*Magnitudine Amnodytis erat qui nobis visus.*



181. ELOPS. *Caput læve. Dentium scabrities in maxillarum margine, palato.*

*Membr. branch. radiis XXX; præterea exterius in medio armata dentibus 5.*

Saurus. 1. E. cauda supra infraque armata.  
 B.30.D. $\frac{4}{24}$ .P.17.V.14.A. $\frac{3}{18}$ .C.30.  
*Sloan. jam. 2. p. 284. t. 251.*  
*f. 1. Saurus maximus.*  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*  
*Conf. Brown. jam. 452: 2.*  
*Corpus longum, a Salmone diversum Pinnae Adiposæ defectu. Caput magnum, læve, splendens, compressum, supra planiusculum. Oculi cute capitis ad partem testis. Scabrities maxillarum inferiorum longior. Membr. branch. 30, sed in medio extra hanc Membranula branch. alia, minima, e dentibus 5 brevioribus. P. dorsalis in medio. Ventrals paulo anteriores. Analis propior p. caudæ. Cauda profunde bifida; ante pinnam tam supra, quam infra armata Squama ossea s. Spina lanceolata horizontali.*

182. ARGENTINA. *Caput: Dentes in maxillis, lingua.*

*Membr. branch. radiis VIII.*

*Corpus ano caudæ vicino.*

*Pinnae ventrales multiradiatae.*

Sphyræna. 1. A. pinna ani radiis XV. *Art. gen. 8. syn. 17.* D.10.P.14.V.11.A.9.C.--  
*Gron. mus. 1. n. 24. Argentina.* D.10.P.--V.--A.10.C.--  
*mus. 2. n. 152. Argentina.* D.13.P.14.V.6.A.24.C.--  
*Habitat in Mari infero.*  
*Vesicula aërea utrinque conica, velut argento foliato resplendeus, unde margaritæ artificiales. Raj. pisc. 108.*

carolina. 2. A. pinna anali radiis XV.

B. 28. D. 25. P. 16. V. 12. A. 15. C. 31.

*Catesb. car. 2. p. 24. t. 24. Ha-*  
rengus minor bahamensis.

*Habitat in Carolinæ aquis dulcibus. D. Garden.*

Opercula futura longitudinali. Linea lateralis recta.

Cauda bifurca.

183. ATHERINA. Caput maxilla superiore planiuscula.

Membr. branch. radiis VI.

Corpus fascia laterali argentea.

Hepsetus. 1. A. pinna ani radiis fere duodecim.

D. 8, 12. P. 13. V.  $\frac{1}{8}$ . A. 16. C. 17.

*Mus. Ad. Fr. 2. p. 103. Atherina.*

*Gron. mus. 1. n. 66. Atherina.*

D. 6, 12. P. 13. V. 6. A. 10. C. 17.

*Hasselq. iter. 382. Atherina*

Hepsetus.

D. 8, 9. P. 12. V. 6. A.  $\frac{1}{3}$ . C. 20.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Menidia. 2. A. pinna ani radiis viginti quatuor.

B. 6. D. 5, 10. P. 13. V. 6. A.  $\frac{1}{4}$ . C. 22.

*Brown. jam. 441. t. 45. f. 3.*

Menidia corpore subpellucido.

*Gron. zooph. 350. Argentina*  
linea lata argentea in lateribus.

*Habitat in Carolinæ aquis dulcibus, pruriens mense aprilis. D. Garden. Silverfisk.*

Corpus parvum, pellucidum: Squamæ in ambitu punctis plurimis nigris. Dentes in labiis plurimi, in mandibulis & lingua nulli. Linea lateralis argentea. Cauda bifida.



- 184. MUGIL.** *Caput*: Labia membranacea: inferius introrsum carinatum. Dentes nulli. Denticulus inflexus supra finis oris.  
*Membr. branch. radiis VII. curvis;*  
*Opercula lævia, rotundata.*  
*Corpus albicans.*

**Cephalus 1.** *M. pinna dorsali anteriore quinqueneradiata. Mus. Ad.*

*Fr. 2. p. 104. \**

*D. 5,  $\frac{1}{9}$ , P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 12.*

*Art. gen. 32. syn. 52. spec. 71.*

*Mugil.*

*D. 5,  $\frac{1}{11}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{13}$ . C. -*

*Hasselq. itin. 385. Mugil Cephalus.*

*D. 5, 11. P. 13. V. 6. A. 10. C. -*

*Gron. zooph. 397. Mugil.*

*D. 4,  $\frac{2}{9}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{11}$ . C. 15.*

*Habitat in Oceano Europæo, fluvios subiens.*

*Botargo italorum ex hujus ovis.*

**Albula. 2.** *M. pinna dorsali anteriore quadriradiata.*

*D. 4, 9. P. 17. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 20.*

*Catesb. car. 2. p. 6. t. 6. Albula bahamensis.*

*Brown. jam. 450. Mugil argenteus minor, pinna anteriore dorsi radiis IV.*

*Habitat in America. D. Garden.*

*Simillimus M. Cephalo,*

- 185. EXOCOETUS.** *Caput squamosum. Os edentulum: maxillis utroque latere connexis.*

*Membr. branch. radiis X.*

*Corpus albicans. Abdomen angulatum. Pinne pectorales maximæ, volatiles, radiis antice carinatis.*

**volitans. 1.** *E. abdomine utrinque carinato.*

*Amæn. acad. 1, p. 321. D. 14. P. 15. V. 6. A. 13. C. 15.*

*Art.*

*Art. gen. 8. syn. 18. spec. 35.*

Exocoetus.

D.13.B.17.V.6.A11.C.15.

*Gron. mus. 1. n. 27. Exocoetus.*

D.13.P.17.V.7.A.--C.--

*Habitat in alto Pelago, Europæo & Americano, a Coryphænis exagitatus ad sclopeti jactum ex aquis evolans gregarius, præda fit Pelecano Aquilo & Diomedæa exulanti; an Selaw Israelitarum, Mosis num. XI: 13, jubente Auctore Naturæ coryphænas pulsas ad littus, uti statuit Rudbeck. fil.?*

evolans. 2. E. abdomine tereti. †

*Gron. zooph. 358. Exocoetus pinnis ventralibus brevissimis, abdominis carinis nullis.*

*Pis. bras. 61. Pirabebe.*

*Habitat in Oceano Hispanico.*

*Differt in paucis ab E volitante, modo ea sufficient.*

186. POLYNEMUS. Caput compressum, undique squamosum: Rostro obtusissimo, prominente.

*Membr. branch. radiis VII. f. V.*

*Corpus Digitis liberis ad pinnas pectorales.*

quinquarius. 1. P. digitis quinque corpore longioribus.

*Gron. mus. 1. n. 74. Polynemus officulis filiformibus utrinque 5 ad pinnas pectorales.*

B.5.D.7,16.P.16.V. $\frac{1}{8}$ .A. $\frac{2}{30}$ .C.17.

*Seb. mus. 3. t. 27. f. 2. Pentanemus.*

*Habitat in America.*

virginicus. 2. P. digitis septem, cauda integra.

B.7.D.7, $\frac{1}{3}$ .P.15.V. $\frac{1}{8}$ .A. $\frac{2}{18}$ .C.15.

*Habitat in America.*

*Opercula serrata. Radius primus dorsalis prioris brevissimus, Pinna caudæ lata, acuta.*



paradi-  
seus.3. *P. digitis septem, cauda bi-*  
*fida.**Edw. av. 208. t. 208. Paradi-*  
*sea piscis.**Habitat in India.**Genus a Trigla distinctum pinnis ventralibus, non in*  
*pectore, sed abdomine sitis; nec digiti articulati, ut in*  
*Triglis.*187. **MORMYRUS.** *Caput læve. Dentes plures,*  
*emarginati.**Apertura branchiarum linearis*  
*absque operculo.**Membr. branch. radio I.**Corpus squamosum.*cyprinoi-  
des.1. *M. cauda bifida acuta. Mus.**Ad. Fr. 109. \***D.27.P.9.V.6.A.32.C.19.**Habitat in Nilo.*Anguil-  
loides.2. *M. cauda bifida obtusa. Mus.**Ad. Fr. 110. \***D.26.P.10.V.6.A.41.C.19.**Hasselq. it. 398. Mormyrus**Caschive.**D.20.P.10.V.6.A.19.C.24.**Habitat in Nilo.*188. **CLUPEA.** *Caput maxillarum superiorum my-*  
*stacibus ferratis.**Membr. branch. radiis VIII: Bran-*  
*chiæ interne setaceæ.**Corpus: Abdominis carina ferrata.**Pinnæ ventrales sæpe novem-*  
*radiatæ.*Haren-  
gus.1. *C. immaculata, maxilla in-*  
*feriore longiore. Fn. svec.**357.**D.18.P.18.V.9.A.17.C.18.**Art. gen. 7. syn. 14. spec. 37.**Clupea maxilla inferiore*

longiore , maculis nigris  
carens.

D.18.P.18.V.9.A.17 C.18.

*Fn. svec.* 315. idem.

*Gron. mus.* 1. n. 21. Idem. D.19.P.15.V.8.A.16.C.--

*Habitat in M. Europæis. Europæis borealibus piscis.*

*Pellitur a Cetis : Balænis glacialibus aut Phylset, micropi-  
bus, qui conjunctis viribus, singulari sono cogunt Haleces  
intrare sinus maris, ut fere suffocentur. Strom. sondm.  
299.*

*Variat admodum magnitudine a loco ; unde bothnici bal-  
thieis minores , quorum piscaturam describit Gisl. act.  
holm. 1748. p. 105,*

prattus 2. C. pinna dorsali radiis XIII.

*Mus. Ad. Fr.* 2. p. 105. \*

*Faun. svec.* 358.

D.17.P.16.V.6.A.19.C.--

*Art. gen.* 7. *syn.* 17. *spec.*

33. Clupea quadruncialis ,  
maxilla inferiore longiore ,  
ventre acutissimo.

D.17.P.17.V.7.A.19.C.--

*Habitat in Oceano Europæo.*

lofa. 3. C. lateribus nigro maculatis ,  
rostro bifido. *Mus. Ad. Fr.*

2. p. 105.

D.19.P.15.V.9.A.21.C.19.

*Art. gen.* 7. *syn.* 15. *spec.* 34.

Clupea apice maxilla supe-  
rioris bifido , maculis nigris  
utrinque.

D.19.P.15.V.9.A.22.C.19.

*Gron. mus.* 1. n. 23. Idem.

D.18.P.--V.8.A.20.C.--

*Hasselqv. itin.* 388. Idem.

D.19.P.15.V.--A.18.C.26.

*Habitat in Oceano Europæo.*

ncrasi- 4. C. maxilla superiore longiore.

colus. *Art. gen.* 7. *syn.* 17. Clupea  
maxilla superiore longiore.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*E culina expulit Garum veterum.*

theri: 5. C. linea laterali argentea.

noides. B.12.D.12.P.14.V.8.A.32.C.18.

*Habitat Surinam.*

*Corpus compressum. Mandibula inferior brevior. Li-  
nea lateralis est plaga lata, argentea ut in Atherinis.  
Finnæ ventrales parvæ.*



Thrissa. 6. C. pinna ani radiis 28, dorsalis radio postremo setaceo longo.

Brown. jam. 443. Clupea minor, radio ultimo pinnæ dorsalis longissimo.

Amæn. acad. 5. p. 251. Clupea corpore ovato.

B.5.D.14.P.13.V.8.A.28.C.211

Osbeck. itin. 257. Clupea

Thrissa.

B.7.D.16.P.14.V.7.A.24.C.244

Habitat in Mari indico.

Pinnæ ventrales sunt parvæ.

Conf. Gardeni e Carolina missa.

D.16.P.16.V.9.A.34.C.255

fima. 7. C. pinnis flavis; ventralibus minutissimis.

B.6.D.17.P. $\frac{1}{17}$ .V. $\frac{1}{8}$ .A.53.C.188

Acl. petrop. 1761. Gasteropelecus.

Habitat in Asia. Mus. acad. holmens.

Os. finum: maxilla superiore brevissima, apice truncata. Corpus argenteum. Abdomen carinato-serratum. Læcuna inter oculos. Pinnæ flavæ: Ventrales adeo parvæ, ut vix conspicuæ.

Sternicla. 8. C. pinnis ventralibus nullis. B.2.D.11.P.9.V.0.A.34.C.188

Gron. mus. 2. n. 155. t. 7.

f. 5. Gasteropelecus.

D.12.P.9.V.0.A.33.C.222

Habitat Surinami.

Corpus latissimum, abdomine gibboso carinatum.

Myxus. 9. C. corpore ensiformi, pinna ani caudæ coadunata.

Mus. Ad. Fr. 2. p. 106. D.12.P.18.V.6.A.84.C.111

Osbeck. itin. 256. Clupea

Myxus.

B.10.D.13.P.17.V.7.A.86.C.111

Amæn. acad. 5. p. 252, t. 1.

f. 12. Myxus corpore ensiformi.

D.12.P.17.V.6.A.84.C.111

Habitat in Mari Indico.

Pinna ani excurrit in pinnam caudæ integram; forte gignere sub diverso comprehendi posset?

tropica. 10. C. cauda cuneiformi. Os-

beck. itin. 300.

B.D.26.P.6.7.V.6.A.26.C.200

Ha-

*Habitat ad insulam Adscensionis.*

Corpus album, compressum, latum, ferratum. Linea lateralis recta, dorso propior. Oculi prope rictum. Opercula squamosa. Caput declive. Maxilla inferior longior. Kiētus magnus. Dentes unius ordinis. Cauda cuneiformis. P. dorsi a medio dorsi ad caudam. P. ani longitudine dorsalis.

inensis.

11. C. radio extimo membranæ branchioſtegæ poſtice truncato,

D.16.P.16.V.8.A.16.C.--

*Habitat in China.*

*Similis Clup. Harengo, ſed latior. Os edentulum.*

Opercula infima membr. branchioſt, tegentia valde truncata ſ. potius radium extimum membr. branchioſtegæ conſtituentia.

# 189. CYPRINUS. Caput ore edentulo ; Os naſale biſulcum.

*Membr. branch. radiis III.*

*Corpus læve, albens. Pinnæ ventrales ſæpe novemradiatæ.*

\* *Barbati ſ. ad os cirroſi.*

- Barbus. 1. C. pinna ani radiis 7, cirris 4, pinnæ dorsi radio ſecundo utrinque ſerrato.

*Muſ. Ad. Fr. 2. p. 107. D.<sub>11</sub><sup>2</sup>.P.16.V.9.A.7.C.16.*

*Art. gen. 4. ſyn. 8. Cyprinus maxilla ſuperiore longiore, cirris 4, pinna ani offi-  
culorum 7.*

*Gron. muſ. 1. n. 20. Idem. D.<sub>11</sub><sup>2</sup>.P.16.V.9.A.7.C.16.*

*muſ. 2. p. 3. Idem. D.10.P17.V.9.A.8.C.17.*

*Habitat in Europa aſtrali.*

*Ova choleram cauſſant. Tim. caſ. 104.*

*Cirri utrinq. 2 ad os. Cauda biſurca.*

- Carpio. 2. C. pinna ani radiis 9, cirris 4, pinnæ dorsalis radio ſecundo poſtice ſerrato, *Fn. ſvec. 359.*

*D.<sub>11</sub><sup>2</sup>.P.16.V.9.A.9.C.19. Art.*



*Art. gen. 4. syn. 3. spec.*

25. *Cyprinus cirris 4, of-  
ficulo tertio pinnarum dor-*

*fi anique uncinulis armato. D.24.P.16.V.9.A.9.C.19.*

*Gron. mus. 1. n. 19. Idem.*

*D.23.P.17.V.8.A.8.C.--*

*Habitat in Europa. Nobilis piscis sæpius in piscinis  
educatus, circa a. 1600. primum in Angliam introdu-*

*ctus.*

*Cirri utring. 2 ad os.*

**Gobio.** 3. *C. pinna ani radiis 11, cir-  
ris 2. Mus. Ad. Fr. 2. p.*

*107. \**

*D.10.P.16.V.9.A.11.C.19.*

*Art. gen. 4. syn. 11. spec.*

13. *Cyprinus quincuncia-  
lis maculosus, maxilla su-  
periore longiore, cirris duo-  
bus ad os.*

*D.12.P.17.V.11.A.11.C.19.*

*Gron mus. 2. n. 149. Idem?*

*D.8.P.14.V.6.A.7.C.--*

*Habitat in Anglia & adjacentibus.*

*Cirrus utring. 1 ad os. Cauda bifurca.*

**Trinca.** 4. *C. pinna ani radiis 25, cauda  
integra, corpore mucoso,*

*cirris 2. Fn. svec. 363.*

*D.10.P.16.V.9.A.25.C.24.*

*Art. gen. 4. syn 5. spec. 27.*

*Cyprinus mucosus nigre-  
scens, extremitate caudæ  
æquali.*

*D.12.P.17.V.11.A.11.C.19.*

*Habitat in Europæ lacubus, stagnis, ubi creditur Caras-  
sios a lernæis repurgare; icteri magnes.*

*Cirrus utrinque 1 brevis ad os. Gronov.*

*\* \* Pinna caudæ indivisa.*

**Carassius.** 5. *C. pinna ani radiis 10, cau-  
dæ integra, linea laterali  
recta. Faun. svec. 364.*

*D.20.P.15.V.8.A.9.C.21.*

*Art. gen. 4. syn. 5. spec. 29.*

*Cyprinus pinna dorsi of-  
ficulis 20, linea laterali  
recta.*

*D.20.P.15.V.9.A.10.C.--*

*Gron. mus. 1. n. 11. Idem.*

*D.20.P.11.V.9.A.10.C.23.*

*Ad. Upsal. 1741. p. 75. n.*

55. *Cyprinus Hamburger. D.20.P.14.V.9.A.9.C.22.*

*Ha-*

*Habitat in Europæ stagnis. Facillime in piscinis educatur, a Lernæa cyprinacea vexatur. Radius 2 p. dorsi anique postice aculeatus duplici serie.*

Cephalus. 6. C. pinna ani radiis XI, caudæ integra, corpore subcylindrico.

*Mus. Ad. Fr. p. 77. t. 30.*

Cyprinus pinna ani radiis  
II, cauda rotundata.

D.II.P.16.V.9.A.II.C.17.

*Art. gen. 5. syn. 7. Cyprinus oblongus macrolepidotus, pinna anni ossiculis II.*

D.--P.--V.--A.II.C.--

*Gron. mus. I. n. 12. Idem.*

D.II.P.--V.9.A.II.C.--

*mus. 2. p. 3. Idem.*

*Habitat in Danubio, Rheno.*

\* \* \* *Pinna caudæ trifida.*

auratus. 7. C. pinna ani gemina, caudæ transversa bifurca. *Faun. svec. 2. p. 125. t. 2.*

*L. Act. stockh. 1740. p. 403.*

*t. I. f. 1-8. Idem.*

D. $\frac{2}{18}$ .P.16.V.9.A.8,8.C.37.

*Baster. act. harlem. 7. p. 215.*

*t. 2, 4, 6. Piscis aureus.*

*Gron. mus. I. n. 15. Idem.*

D.8.P.II.V.7.A.--C.20.

*mus. 2. n. 150. Cypri-*

*nus pinna ani simplici, cauda trifurca.*

D.18.P.IV.V.8.A.8.C.44.

*Edw. av. t. 209.*

*Pet. gaz. t. 78. f. 7.*

*Habitat in Chinæ, Japoniæ fluviis. Piscis colitur in vasis murrhinis ob admirandum aureum fulgorem, alendus pane, lemna, pisciculis; cavendus a Seminibus Bidentis tripartitæ, quæ adherent faucibus & occidunt, uti meos a Rich. Guy. missos.*

*Pinnae Analis radius 2 postice serratus; Caudalis in spontaneo triloba, transversa, basi subtus retusa.*

*Variat in Cultis maximopere radiis pinnarum numero & figura diversis.*

\* \* \* \* *Pinna caudæ bifida.*

niloticus. 8. C. pinna ani radiis 7, dorsali 18. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 108.*

D.18.P.17.V.9.A.7.C.19.

*Haf-*



*Hasseltq. iter.* 393. n. 94.

*Cyprinus rufescens.*

D.18.P. $\frac{1}{7}$ .V.9.A.7.C.24.

*Habitat in Nilo.*

Gonorynchus. 9. C. pinna ani radiis 8, corpore cylindrico, cauda bifida.

*Gron. Zooph.* 199. t. 10. f. 2.

Gonorynchus.

D.12.P.10.V.9.A8.C.18

*Habitat ad Cap. b. spei.*

Phoxinus. 10. C. pinna ani radiis 8, macula fusca ad caudam, corpore pellucido.

D.8.P.15.V.8.A.8.C.12.

*Art. syn.* 12. *Cyprinus tridactylus* varius oblongus teretiusculus, pinna ani ossiculorum 8.

*Habitat in Europa.*

Aphya. 11. C. pinna ani radiis 9, iridibus rubris, corpore pellucido. *Fn. svec.* 374. \*

D.10.P.12.V.7.A.9.C.19.

*It. Wgot.* 232. *Cyprinus minimus.*

D.11.P.8.V.8.A.9.C.19.

*Art. gen.* 4. *syn.* 13. *spec.* 30.

*Cyprinus biuncialis*, iridibus rubris, pinna ani ossiculorum 9.

D.---P.---V.---A.9.C.---

*Habitat in Europæ rivulis.*

*Minimus Piscis, in locis diversis diversæ magnitudinis, an speciei?*

Leuciscus. 12. C. pinna ani radiis 10, dorsali 9.

D.9.P.---V.---A.10.C.19.

*Art. syn.* 9. *Cyprinus novem digitorum*, rutilo longior & angustior, pinna ani radiorum decem.

*Habitat in Europa media.*

Dobula. 13. C. pinna ani dorsali que radiis 10.

D.10.P.15.V.9.A.10.C.19.

*Art. syn.* 10. *Cyprinus pedalis gracilis oblongus* craf-

fuscus, dorso crasso, pinna ani officulorum 9.

*Habitat in Europa media.*

- Grislagi- 14. C. pinna ani radiis XI, pin-  
ne. nis albertibus. *Fn. svec. 367.*  
*Aët. upf. 1744. p. 35. t. 3.*  
*Art. gen. 5. Cyprinus oblon-*  
*gus, iride argentea, pinnis*  
*albertibus.*  
*Gron. mus. 2. n. 148. Cypri-*  
*nus idem.* D.11.P.11.V.9.A.11.C.19.  
*Art. syn. 5. spec. 12. Cyprinus*  
*oblongus, figura rutili, pin-*  
*na ani officulorum 10.* D.10.P.16.V.9.A.11.C.19.  
*Habitat in Europæ lacubus.*
- Idbarus. 15. C. pinna ani radiis 12, pin-  
nis ventralibus sanguineis. D.10.P.16.V.9.A.12.C.19.  
*Habitat in Sveciæ lacubus.*
- Rutilus. 16. C. pinna ani radiis 12 rubi-  
cunda. *Fn. svec. 372.*  
*Art. gen. 3. syn. 10. spec.*  
*10. Cyprinus iride pinnis*  
*ventris ac ani plerumque*  
*rubentibus.* D.13.P.15.V.9.A.12.C.17.  
*Gron. mus. 1. n. 8. Idem.* D.12.P.16.V.9.A.13.C.19.  
*Aët. upf. 1741. p. 74. n. 51.*  
*Idem.* D.10.P.11.V.10.A.15.C.19.  
*Aët. upf. 1741. n. 52. Rex van*  
*Ruy.* D.10.P.12.V.9.A.15.C.22.  
*Habitat in Europæ lacubus, prurit cum Caltha palustri.*  
*Pinnæ ventrales obtusæ.*
- Idus. 17. C. pinna ani radiis 13 rubra  
*Fn. svec. 362.* D.10.P.18.V.10.A.13.C.19.  
*Art. gen. 5. syn. 14. spec. 6.*  
*Cyprinus iride sublutea,*  
*pinnis ventralibus anique*  
*rubris.* D.11.P.16.V.10.A.13.C.19.  
*Gron. mus. 1. p. 3. n. 13. Idem.* D.10.P.20.V.9.A.13.C.24.  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*  
*Pinnæ ventrales acutæ.*



Orfus.

18. C. pinna ani radiis 13.

*Art. syn. 6. Cyprinus Orfus dictus.**Raj. pisc. 118. Rutilus latior**f. Rubellio fluviatilis.*

D.10.P.19.V.9.A.13.C...

*Meyer. thier. 2. t. 94. Orf.**Habitat in Rheno, Angliæ fluviis, lacubus.*

Erythroptthalmus.

19. C. pinna ani radiis 15, pinnis rubris. *Fn. svec. 366.**Art. gen. 3. syn. 4. spec. 9. Cyprinus iride pinnis omnibus caudaque rubris.*

D.11.P.16.V.10.A.14.C.19.

*Habitat in Europa septentrionali.*

Jeses.

20. C. pinna ani radiis 14, rostro rotundato.

D.--P.--V.--A.--C.--

*Art. syn. 7. Cyprinus cubitalis, pinna ani ossiculorum 14.**Habitat in Germania.*

Nasus.

21. C. pinna ani radiis 14, rostro prominente. *Art. gen.**5. syn. 6.**Gron. mus. 2. n. 147. Idem.*

D.11.P.7.V.9.A.12.C.25.

*Mars. dan. 4. t. 3. f. 1. Nasus.**Raj. pisc. 119. Nasus alberti.**Habitat in Rheno fluvio.**Cauda bifurca.*

Aspius.

22. C. pinna ani radiis 16, maxilla inferiore longiore incurva. *Fn. svec. 361.**Art. gen. 6. syn. 14. spec. 14.**Cyprinus maxilla inferiore longiore cum apice elevato, pinna ani ossiculorum*

15.

D.11.P.18.V.10.A.16.C.19.

*Habitat in Sveciæ lacubus.*

americanus.

23. C. pinna ani radiis XVIII.

B.3.D.9.P.16.V.9.A.18.C.27.

*Habitat in Carolina. D. Garden.**Corpus Rutili, cæruleo-argenteum. Linea lateralis admodum arcuata versus abdomen. Cauda bifida.*

- Alburnus. 24. C. pinna ani radiis 20. *Fn. svec. 377.*  
*Art. gen. 6. syn. 10. spec. 17.*  
 Cyprin. quincuncialis, pinna ani officulorum 20. *D.10.P.14.V.9.A.21.C.--*  
*Gron. mus. 1. n. 10. Idem. D.9.P.--V.9.A.22.C.--*  
*Act. upf. 1741. p. 75. n. 58.*  
 Koning van asterling. *D.8.P.14.V.8.A.18.C.20.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus; Danubio.*
- Vimba. 25. C. pinna ani radiis 24, rostro nasiformi. *Fn. svec. 368.*  
*Art. gen. 6. syn. 14. spec. 18.*  
 Cyprinus rostro nasiformi, dorso acuminato, pinna ani officulorum 24. *D.11.P.16.V.10.A.24.C.19.*  
*Habitat in Sveciæ lacubus.*  
*Abdomen intus nigrum. Kram.*
- Dentex. 26. C. pinna ani radiis 26, ore dentibus undique molaribus. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 108. \**  
*D.10.P.14.V.9.A.26.C.19.*  
*Hasselqv. iter. 395. Salmo dentex. D.10.P.15.V.10.A.24.C.25.*  
*Habitat in Nilo.*  
*Ob dentes singularis, Sparis similis, sed facies & membr. branchiostega omnino Cyprini; pinnam adiposam non vidi.*
- Brama. 27. C. pinna ani radiis 27, pinnis fuscis. *Fn. svec. 360.*  
*Art. gen. 6. syn. 4. spec. 22.* Cyprinus pinnis omnibus nigrescentibus, pinna ani officulorum 27. *D.12.P.17.V.9.A.27.C.19.*  
*Gron. mus. 1. n. 14. Idem. D.11.P.--V.10.A.27.C.--*  
*Habitat in Europæ lacubus.*
- cultratus. 28. C. pinna ani radiis 30, linea laterali declinata, ventre acutissimo. *It. scan. 82. t. 2.*  
*Fn. svec. 370.* *D.8.P.16.V.8.A.30.C.19.*  
*Habitat in M. Baltico.*



Bjærkna. 29. C. pinna ani radiis 35. *Fn.*

*svec.* 371.

D.II.P.15.V.9.A.35.C.19.

*Art. gen.* 3. *syn.* 13. *spec.* 20.

Cyprinus quincuncialis, pin-

na ani officulorum 25.

D.II.P.15.V.9.A.25.C.19.

*Habitat in Sveciæ lacubus.*

Farenus. 30. C. pinna ani radiis 37, iridi-

bus flavis. *Art. spec.* 23. *Fn.*

*svec.* 369.

D.II.P.18.V.10.A.37.C.19.

*Habitat in Sveciæ Lacu Mælero.*

Ballerus. 31. C. pinna ani radiis 40. *Fn.*

*svec.* 365.

*Art. gen.* 3. *syn.* 12. *spec.* 23.

Cyprinus admodum latus

& tenuis, pinna ani officu-

lorum 40.

D.II.P.16.V.10.A.40.C.19.

*Habitat in Europæ lacubus.*




---

Ea quæ scimus, sunt pars minima  
eorum, quæ ignoramus.

---





































